

ganadas por el agua que forma charcas de pequeñas dimensiones donde proliferan algunas plantas acuáticas. Es en una de estas charcas donde el día 1_e

charcas donde el día 1º de febrero de 1986, los autores observaron por primera vez en diez años de periódicas salidas a campo por la zona, un ejemplar de *Phalaropus lobatus* (Linné). Es un ave muy confiada. Pudimos observarla desde la orilla de la charca a unos 6 metros. Presentaba —como es lógico para la época— plumaje invernal, en el que predomina el color blanco, con las partes superiores gris azuladas, líneas oscuras que atraviesa y se prolonga por detrás del ojo, pico delgado y negro. Es muy activo, picoteando de continuo en el agua a un lado y al otro, mientras nada.

De la bibliografía consultada, surge que es ave pelágica y se la encuentra en altamar en el Pacífico frente a las costas de Perú y Chile, desde octubre hasta abril. Hay citas de presencia accidental en la Patagonia.

A nuestro criterio, se trata de una presencia meramente accidental, y podemos agregar que en los días previos a su observación se desataba, originada en el Pacífico, una

fuerte tormenta, probable motivo del extravío de esta ave.

Agradecimiento:

A Daniel Gorgone, por la revisión de este escrito.

Bibliografía

- DABBENE, R. 1972. (Aves de Caza (Recopilación de artículos publicados en la revista La Diosa Cazadora —1927/38)—.
- GOODALL, J.D., A.W. JOHNSON y Dr. R.A. PHILIPPI, Las aves de Chile, sus conocimientos y sus costumbres. Tomo Segundo, 1951.
- OLROG, Cl. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27. 1979.
----- Las aves argentinas. "Una nueva guía de Campo". Administración de Parques Nacionales, 1984.
- TUCK, G. y H. HEINZEL. A field guide to the seabirds of Britain and the world. 1978.

Anibal Casas
Mariano Gelain
Bariloche

** ** **

NUEVA DISTRIBUCION PARA EL CHORLITO DE COLLAR

Revisando la bibliografía que poseemos sobre la distribución de esta especie *Charadrius collaris*, hemos encontrado en ella, que a pesar de que el Dr. J.R. Navas (1970), en su trabajo "Nuevos registros de Aves para la Patagonia", cita dos capturas realizadas en la provincia de Río Negro, en obras sucesivas es integrada a su distribución con grandes altibajos, razón ésta por la que citamos la distribución señalada en las distintas obras revisadas por nosotros.

DISTRIBUCION: desde México hasta la provincia de Buenos Aires, es señalada por; Deautiet y Steullet 1935-1946:567-569; Phi-

lippi, Johnson y Goodall 1951 (tomo II): 214; Zotta 1944: 55; J. Cuello, E. Gerzenstein 1962: 71 y Olrog 1959: 113, quien en 1979: 21 la señala hasta Río Negro, en 1984: 276 la señala hasta el sur de Buenos Aires y el norte de Río Negro. Gore y Gepp 1978: 121 y T. Narosky 1978: 57 la señalan desde México hasta Buenos Aires; Nores e Yzurieta 1980: 102 dan la misma distribución. Nores, Yzurieta y Miatello, 1983. Lista y Distribución de las Aves de Córdoba. Bol. Acad. Nac. Cienc.: *Charadrius collaris*: Desde el norte hasta Neuquén y Río Negro. Nores e Yzurieta, 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte II. Hist. Nat. 2

(17): 151-152: citan un ejemplar para Neuquén.

Quienes escriben la presente han visto con cierta regularidad al Chorlito de Collar en la costa Este del Lago Nahuel Huapi sobre el desemboque del río Ñirihuau (ver A. Gelain Bol. "Nuestras Aves", año II n.4: 26), entre los meses de octubre y febrero de los años, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986. Con estos registros se confirma la presencia de esta especie como visitante estival para la región Occidental de Río Negro.

Bibliografía

Cuello J. y Gerzenstein E. 1962. Las Aves del Uruguay, Lista sistemática, Distribución y Notas, Com. Zool., del Museo de Hist. Nat. de Montevideo, Vol. VI, N.93.
Deautier, Steullet 1935-1946, Catálogo sistemático de las Aves de la República Argentina. Obra cincuentenario del Museo de la Plata. Buenos Aires.

Gore y Gepp 1978, Aves del Uruguay, Mosca Hnos. Montevideo, Uruguay.

Narosky, T. 1978, Aves Argentinas, Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense, Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Navas, J.R. 1970. Nuevos registros de aves para la Patagonia, Neotrópica, 16 (49): 11-16.

Nores e Yzurieta, 1980. Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y Centro de Argentina, Se. Estado de Agr. y Gan. Direc. de Caza, pesca y actividades acuáticas de la prov. de Córdoba.

Olrug C. 1959. Las Aves Argentinas una guía de campo, Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.

----- 1979. Nueva lista de la Avifauna Argentina, Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.

----- 1984. Las Aves Argentinas. Una Nueva guía de Campo, Administración de Parques Nacionales.

Philippi, Johnson y Goodall 1951. Tomo II, Aves de Chile. Ed. Platt Buenos Aires.

Zotta A.R. 1935-1944. Lista sistemática de las aves Argentinas, Revista el Hornero, Buenos Aires.

Mariano Gelain
Anibal Casas
S.C. de Bariloche

** * *

PRESENCIA DEL PINGUINO REY EN EL LITORAL ATLANTICO BONAERENSE

El 20 de Julio de 1986 en playas de Aguas Verdes, localidad del Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires, fue encontrado por lugareños un Pingüino Rey *Aptenodytes patagonica*, especie rara de frecuentar estas latitudes, ya que su hábitat natural se restringe a los mares de la zona Sud y Antártica Argentina. Se

considera al mismo un individuo juvenil, por presentar una talla de 67 cm. y un peso de 15 kg., llegando en su madurez a alcanzar de 1 a 1.20 mt. de altura y entre 20 y 30 kg.. de peso.

Al ser rescatado presentaba una extraña herida bajo el ala izquierda, motivo por el cual fue trasladado a las