

NUESTRAS AVES AMENAZADAS

CANINDE (*Ara Caninde*)

Este hermoso guacamayo que también ha sido conocido como "kanindé" o "guaá-hovíh" (guaraní), "arakang" y "guacamayo azul y amarillo" es, con sus 74 o 75 cm. de longitud, uno de los loros más bellos del mundo y a la vez una de las aves más espectaculares de la región Neotropical.

Su posición sistemática fue muy controvertida y aunque aquí lo consideramos, siguiendo a Olrog (1979) y a Nores e Yzurieta (inf. inéd.), específicamente distinto, durante mucho tiempo para varios autores el canindé y el guacamayo celeste (*Ara ararauna*) constituían la misma especie compartiendo en consecuencia los mismo nombres vulgares.

La diferencia principal radicaría en la gola azul-turquí de la garganta que presenta el canindé y que es negra en la otra especie y no tan extendida. Además *Ara ararauna* presentaría una corona verde bien marcada y negras las hileras de plumas de la cara, que es contrastadamente blanca, en lugar de azules como en el canindé, en el resto del plumaje ambas especies se parecen siendo lo dorsal, incluso la cola azul-celeste, igual que el subcaudal, presentando lo ventral amarillo. El pico es grande y de color negro. La cola es muy larga y por abajo amarilla. Ambas especies son muy comercializadas como aves ornamentales y mascotas por lo que soportan una constante presión de captura. El resultado es que más sabemos de ellas en cautiverio que en libertad. Inclusive su presencia en nuestro país es bas-

tante problemática y discutida. Holmberg (1985) comenta que se la ha hallado en el Chaco "de donde figuró en el jardín Zoológico" (de Bs. As), cita que repiten posteriormente Steullet y Deautier (1935-1946) entre otros autores. Pereyra (1950) lo cita para Misiones pero sin dar detalles concretos siendo posible que en realidad se refiera a *Ara ararauna*.

Zotta (1937-1942) le asigna como distribución Misiones, Formosa y Chaco sin aportar tampoco ninguna referencia concreta. El mismo Olrog en su primera lista de la avifauna argentina (1963) consideró que *Ara caninde* por tradición ha sido citada para nuestra avifauna pero que no existe ningún dato concreto al respecto. En su segundo listado (1979) vuelve a repetir que no hay datos concretos de su existencia en Argentina, pero que recientemente fue redescubierto en el sudoeste de Bolivia, en la zona de Yacuiba junto a nuestra frontera. Según Nores e Yzurieta (inf. inéd.) Olrog tenía una fotografía de un ejemplar procedente de esa región.

No obstante lo que dice Olrog, en 1952 Gunnar Hoy (1969) había observado seis guacamayos amarillos en la quebrada del río Carapari, en el norte de Salta. Este registro constituiría la única evidencia concreta de la presencia de este magnífico loro en nuestro territorio, el que no pudo ser relocalizado a pesar de numerosas búsquedas efectuadas en tal sentido, lo que hace presumirlo extinto en nuestro país, si es que no se trataba en realidad de una especie accidental para la Argentina.

Fuera de nuestro país se lo conoce para Bolivia donde estaría restringido en la actualidad a

los departamentos del Beni y Santa Cruz. En Brasil, según Sick (1985) su presencia no ha sido comprobada. En Paraguay si bien no tenemos referencias actuales, en la época de Azara parece que existía siendo este país su "terra typica".

No sabemos mucho de las costumbres de esta especie pero por su gran similitud con *Ara ararauna*, parece frecuentar también zonas abiertas tipo sabana con isletas de selva o bien los bordes de selva donde nidificarían en árboles grandes, huecos, poniendo 2 huevos.

Como ya señalamos ambos guacamayos son muy comercializados como "Pets" o mascota por lo que se teme seriamente por el futuro de esta especie de distribución en la actualidad bastante restringida y población pequeña. Lanning en 1982 estimó que la misma oscilaría entre los 500 y 1000 ejemplares, cifras por demás elocuentes que explican claramente la urgente necesidad de acabar con su captura y exportación ilegal e iniciar un programa de protección efectivo que incluya el establecimiento de reservas naturales e incluso su cría en cautiverio y su posible reintroducción en sus ambientes naturales..

La especie figura en el Red. Data Book como especie de Status INDETERMINADO aunque se la considera EN PELIGRO en el orden nacional y figura en el Apéndice II de la C.I.T.E.S. En 1979 sólo se conocía un ejemplar cautivo en un Zoo de los E.E.U.U. y otro que había muerto recientemente en un zoológico alemán, aunque se sabe que existe en bajo número en colecciones privadas. Entre 1977 y 1980 ingresaron en los EE.UU. 41 canindés de los cuales 40 procedían de Bolivia. Una presión comercial de esta clase podría acabar por completo en pocos años más con las poblaciones silvestres de esta especie.

En la Argentina se debe proseguir con el relevamiento ornitológico intensivo del norte de Salta y el este de Jujuy, incluyendo los Parques Nacionales Baritú (Salta) y Calilegua (Jujuy) para comprobar su posible supervivencia en nuestro país, antes que pongamos definitivamente al canindé en la lista de nuestros coloridos pero tristes recuerdos.

Juan Carlos Chebez

BIBLIOGRAFIA

- BERTONI, A. de W. 1939 Catálogos Sistemáticos de los Vertebrados del Paraguay. Rev. Soc. Cient. del Paraguay IV (4): 24 Asunción.
- DABBENE, R. 1920 El "Canindé" de Azara es el *Ara ararauna* (Linneo). El Hornero 2:56, Bs. As.
- DABBENE, R. 1921 Algunas palabras más sobre el cambio de nombre del *Ara caninde*. El Hornero 2:225, Bs. As.
- HOLMBERG E.L. 1985 La Fauna Argentina. Segundo Censo Nacional: 513, Bs. As.
- HOY, Gunnar 1969 Addendas a la Avifauna Salteña. El Hornero 11:53-56, Bs. As.
- NORES, M. y D. Yzurieta Inf. Inéd. Distribución y Situación Actual de Grandes Psitácidos en Sudamérica Central. Memor. II Congr. Iberoam. de Ornitología, México, 1981.
- OLROG, C. 1963 Lista y Distribución de las Aves Argentinas. Opera Lilloana IX, Fund. M. Lillo, 377 págs, Tucumán.
- OLROG, C. 1968 Las Aves Sudamericanas. Una guía de campo Tomo I: 247 Tucumán.
- OLROG, C. 1979 Nueva Lista de la Avifauna Argentina. Opera Lilloana XXVII, Fund. M. Lillo, 324 págs, Tucumán.
- OLROG, C. 1984 Las Aves Argentinas, una nueva Guía de Campo. INCAFO 352 págs, Madrid.
- PEREYRA, J. 1950 Las aves del territorio de Misiones. Anal Mus. N. Huapi II: 25, Bs. As.
- SICK, Helmut 1985 Ornitología Brasileira. Vol. 1 Edit. Univ. de Brasilia: 303, Brasilia.
- STEULLET, A.B. y E.A. DEAUTIER, 1935-1946 Catálogo Sistemático de las Aves de la República Argentina. Obra del Cinc. del Museo de La Plata T.1 (1º entrega): 727, Bs. As.
- ZOTTA, A. 1937-1942 Lista Sistemática de las Aves Argentinas. El Hornero VI: 537, Bs. As.

PATO MORADO (*Netta erythrophthalma* *erythrophthalma*)

Este escaso anátido pariente cercano de nuestro conocido Pato Picazo o Crestón (*Netta peposaca*) es también conocido como Pato Castaño y se distingue por su coloración negra con reflejos morados o púrpúreos en la cabe-

za, cuello y pecho del macho siendo el resto de lo dorsal pardo-grisáceo y el abdomen pardusco. Las alas también son pardas con una angosta línea blanca en las secundarias que sólo se ve en vuelo.

El pico en el macho es azul con punta negra en tanto que en la hembra es negruzco. La hembra se distingue por las mejillas rojizas con una mancha blanca por detrás del pico y en la garganta, y una medialuna del mismo color por detrás del ojo hasta el cuello. El dorso es pardo oscuro y lo ventral pardo claro. Las alas al igual que el macho presentan la línea blanca característica. La longitud de la especie es de unos 49 cm.

En la Argentina la especie sólo se conoce en base a dos registros, uno efectuado en Jujuy en la zona de Abra Pampa que permitió su incorporación para nuestra avifauna (Olrog, 1949), y el segundo fue efectuado en la laguna Los Nacimientos y el río Cazadero Grande, en la provincia de Catamarca, en 1978 por Rodolfo Miatello (Olrog, 1979). Fuera de nuestro país se lo conocí para Chile (un registro de Arica), Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, representando un curioso caso de distribución discontinua. La especie reaparece también en el continente africano representada por la subespecie *Netta erythrophthalma brunnea*. Sobre sus hábitos no es mucho lo que se sabe excepto que anda en parejas o pequeñas bandadas al igual que su congener, frecuentando lagunas donde se alimenta de granos, semillas, plantas acuáticas, crustáceos y moluscos.

El nido lo construye con pastos sobre el agua, constando la puesta de 6 a 13 huevos de color crema que miden de 53 a 58 mm de largo y 41 a 46 mm de ancho. En la Argentina no se conocen datos sobre su nidificación y bioecología pareciendo preferir, en base a los dos registros conocidos, los ríos y lagunas punefios y altoandinos.

En apariencia se trata de una especie escasa en todas partes aunque todavía resulta observable en Venezuela, Colombia, Perú y el Lago Feia cerca de Río de Janeiro, Brasil. La desaparición progresiva de buena parte de su área de

distribución y su paulatino enrarecimiento numérico llevaron a incorporar esta especie en la categoría de status INDETERMINADO en el Red Data Book. Las causas de ese retroceso no han podido aún ser establecidas con claridad. En la Argentina se la considera por la escasez de registros especie RARA.

Esta subespecie estuvo representada hasta fines de la década de 1960 en la colección de anátidos de The Wildfowl Trust en Slimbridge, Inglaterra, no conociéndose otros registros de ejemplares cautivos en el mundo.

En la Argentina sólo conocemos dos registros de los cuales el primero fue efectuado por Olrog el 2 de Junio de 1949 en la laguna Runtuyoc, unos 8 Km al norte de Abra Pampa en la provincia de Jujuy, se trataba de 2 parejas que nadaban a unos 70 metros del autor. La prospección ornitológica prolija de las lagunas punefias y prepunefias en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, podrían ayudarnos a arrojar alguna luz más acerca de este enigmático pato.

Juan Carlos Chebez

BIBLIOGRAFIA

- DE LA PEÑA, Martín 1986 Guía de Aves Argentina. Tomo I, 100 págs.
- I.V.C.N. 1979 The Red Data Book. Vol. II, Morges, Suiza.
- OLROG, C. 1949 Notas Ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). Acta Zool. Lilloana VIII: 209-217, Tucumán.
- OLROG, C. 1963 Lista y Distribución de las Aves Argentinas. Opera Lilloana IX, Fund. M. Lillo, 377 págs. Tucumán.
- OLROG, C. 1968 Las Aves Sudamericanas. Una guía de campo. Tomo I: 247, Tucumán.
- OLROG, C. 1979. Nueva Lista de la Avifauna Argentina. Opera Lilloana XXVII, Fund. M. Lillo, 324 pág, Tucumán.
- OLROG, C. 1984 Las Aves Argentinas, una nueva guía de campo. Incafo, 352 págs. Madrid.
- SICK, Helmut 1985 Ornitología Brasileira. Vol. 1 Edit. Univ. de Brasilia: 303, Brasilia.