

Chicago, Press Edition.

Contino, F. 1980. Aves del Noroeste argentino. Univ. Nac. de Salta.

De la Peña, M.R. 1985. Aves argentinas, tomo II. Univ. Nac. del Litoral.

Narosky, T. 1978. Aves argentinas, guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense. Asoc. Ornít. del Plata. Bs. As..

Nores, M. y D. Yzurieta 1982. Nuevas localidades para aves argentinas - Parte III. Historia Natural, vol. 2 nº 17. Corrientes.

Nores, M.; D. Yzurieta y R. Miatello 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cs. Córdoba. Tomo 56: 11-114. Córdoba.

Olrog, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana. 27: 1-324. Tucumán.

Olrog, C.C. 1984. Las aves argentinas, una nueva guía de campo. Adm. de Parques Nacionales.

*Agradezco mucho al Sr. Samuel Narosky, quien amablemente ha corregido esta nota*

**Eduardo H. Haene**

Grupo Estrategia Nac. de Areas Naturales  
Fund. Vida Silvestre Argentina

## **Fregata Magnificens en Punta Rasa**

El día 14 de diciembre de 1986 en compañía de Haydée Teggi visitamos el área del Cabo San Antonio. Allí junto al guarda fauna de la FVSA, Esteban Bremmer y su esposa Patricia, observamos desde alrededor de las 10 hs. hasta el anochecer, un grupo de 7 Fregatas, *Fregata magnificens*, jóvenes, con la cabeza y pecho blancos. Se mantuvieron prácticamente inmóviles, con las alas extendidas en continuo planeo y sin variar la distancia entre los individuos ni de éstos a la tierra. Al atardecer se incorporó uno más, sumando entonces ocho. Al día siguiente ya no estaban en el área. Según Bremmer, es ocasional la presencia de ejemplares aislados, al parecer siempre juveniles de Fragatas, llamando la atención en este caso el número inusual sin antecedentes para

la Argentina y el comportamiento estático que no le conocíamos de nuestras observaciones en la costa de Brasil.

**Tito Narosky**

## **Nidificación otoño-invernal del lechuzón orejado**

El 25 de Mayo de 1986, se halló el nido de este estrígido, en la localidad de Bernal (Bs. As.) en una zona de sauzales (*Salix sp.*) y lirios (*Iris pseudacorus*) en la ribera platense. Estaba ubicado en la trifurcación del tronco de un sauce a 43 cm. del agua. Sobre un lecho de detritos colocaron ramas de sauce y hojas de lirio. Medía 21 cm. de diámetro externo, 18 cm. de diámetro interno y 1 cm. de profundidad.

Contenía un huevo casi esférico, blanco, sin incubar, de 46.9 x 40.6 mm.

En la Reserva de Costanera S (Cap. Fed.) Diego Gallegos Luque (com. pers.) halló el 29 de mayo un nido con 3 pichones; el mismo se encontraba ubicado en el suelo en un monte con predominio de aliso de río (*Tessaria intergrifolia*). Esta información fue luego corroborada por nosotros.

Finalmente, el 17 de agosto observamos en Bernal dos parejas con pichones de diversas edades.

Son escasos los datos bibliográficos sobre nidificación otoñal e invernal de esta especie en nuestro país. Fraga (1984) halló pichones en los meses de julio y octubre y hace referencia a Pereyra, quien observó pichones nacidos a fines de junio, y otro visto en agosto.

### **Bibliografía**

Fraga, RM, 119844. Nidificación otoño-invernal de rapaces, El Hornero XII (3) 193-195.

Pereyra J.A., 1937. Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la Gobernación de La Pampa. Mem. jardín Zool. La Plata, 7: 197-326.

1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la Prov. Bs. As. Mem. jardín Zool. la Plata, 9: 1-304

**Pedro Bledinger - Eduardo De Lucca  
Miguel Saggese**