

sa. Esta especie ha sido citada para el Parque Nacional El Palmar recientemente (Navas, 1982), siendo esa la primera cita de la especie para la Pcia. de Entre Ríos.

Melanerpes cactorum: en la zona habita todo tipo de montes y es muy común. La distribución de este carpintero llega hasta Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis (Olrog, 1979).

Melanerpes candidus: habita montes abiertos. Es más bien escaso. Está citado hasta la Pcia. de Entre Ríos y norte de Buenos Aires (Olrog, 1979), pero debido a que en esta última es accidental o de presencia extremadamente rara (Narosky, 1978), creo conveniente dar a conocer este registro.

Saltator similis: en la región habita montes de espinillo y a menudo se lo encuentra en el suelo. Es común. La distribución de este pepitero es hasta el norte de Entre Ríos (Olrog, 1979), (Navas, 1982). En el Museo Argentino de Ciencias Naturales hay ejemplares procedentes de Villa Constitución, Islas del Paraná, Pcia. de Santa Fe.

Callonetta leucophrys: abundante en campos inundados y bañados. La distribución de este anátido es hasta Santa Fe y norte de Buenos Aires (Olrog, 1979). Se lo observó desde marzo a julio.

En esta región también se registran especies en el límite austral de su distribución en la Pcia. de Entre Ríos, ya que su dispersión se prolonga hacia el sur por el oeste del país, debido a la falta de hábitat en la mayor parte de la Pcia. de Buenos Aires (sólo en la región sur). Dichas especies son: **Drymornis bridgesi**, **Pseudo-seisura lophotes**, **Columba maculosa**. Todas comunes.

Agradezco la colaboración del Dr. Jorge Navas, Jefe de la Sección Ornitología del M.A.C.N. en la corrección de esta nota.

Bibliografía

- Olrog, C.C., 1979. Nueva lista de avifauna argentina. Opera Lilloana XXVII, Tucumán.
- Narosky, T., 1978. Aves argentinas. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Navas, J., 1982. Introducción a la avifauna del P.N. El Palmar. Anales de Parques Nacionales. Tomo XV. Buenos Aires.

Registro del Cormorán Real en la costa bonaerense


El 29 de junio de 1987 fue hallado en una playa cercana a la localidad de Costa Bonita un ejemplar, muerto recientemente y en perfecto estado de conservación, del Cormorán Real, **Phalacrocorax albiventris**.

Esta especie que nidifica en las costas de Malvinas, Tierra del Fuego y Patagonia hasta Chubut (Olrog, 1979) parece llegar, en sus desplazamientos invernales y

Tito Narosky, Miguel A. Fiameni y
Alejandro G. Di Giácomo

en forma parcial hasta la costa bonaerense, Río de la Plata y Uruguay. Son escasas las citas documentadas al respecto y no se han encontrado registros recientes sobre su presencia en la provincia de Buenos Aires.

Doello Jurado (1917) observó varios individuos en Punta Lara, en mayo y junio de 1913. Menciona además un juvenil capturado vivo en Río Santiago (La Plata),



Cormorán Real (*Phalacrocorax albiventer*)

Dibujo: Adrián S. Di Giácomo

que le enviara su amigo J. Najeras, y que se conserva en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Según Daguerre (1922) a Rosas, pdo. de Las Flores, "ejemplares de esta especie llegan todos los inviernos", agrega además que "son poco precavidos y se dejan capturar fácilmente". Pereyra (1923 y 1938) la considera una especie escasa, que suele llegar hasta el Delta y Río Luján, habiendo capturado un macho en Zelaya en octubre de 1922.

De los ejemplares depositados en las colecciones del MACN, que gentilmente nos permitiera consultar el Dr. Jorge Navas, 8 fueron colectados en localidades de la provincia de Buenos Aires, a saber: "Los Ingleses", Ajó (por E. Gibson, sin fecha); Mar del Plata; Río Santiago, La Plata (ejemplar mencionado por Doello Jurado); Loma Perico, Las Flores (2 ejemplares capturados por Daguerre) y Quequén (3, uno de ellos coleccionado en el mes de enero). En todos los casos en que

se mencionan las fechas, las mismas corresponden a meses otoño-invernales (abril, mayo, junio y julio) y la más reciente data de 1933.

Basándose seguramente en estos registros, varios autores mencionan al Cormorán Real como visitante invernal en la provincia de Buenos Aires (Marelli, 1924; Ringuélet y Aramburu, 1957; Olrog 1963 y obras posteriores; Narosky, 1978).

En cuanto a su presencia en el Uruguay es considerado por Escalante (1970) como un visitante regular, en número limitado, lo que nos hace suponer que el desplazamiento hacia el norte lo hace más bien a cierta distancia de la costa argentina. Apoyan esta suposición la observación de Beck, en Murphy (1936), de pequeñas bandadas a la altura de Mar del Plata, y el hecho de que Vaz-Ferreira y Gerzenstein (1961) lo registren durante todos los inviernos desde 1948 hasta 1959 en grupos de hasta 15 individuos en Isla de Lobos, Uruguay.

Al parecer no existen datos publicados, en los últimos 55 años, sobre hallazgos del Cormorán Real en la costa bonaerense y rionegrina, se puede deducir entonces que su presencia al norte del área de cría en Chubut, es tan sólo accidental para la Argentina.

Para más información sobre el lugar de hallazgo ver los trabajos de Narosky y Fiameni, 1986 y 1987.

Bibliografía

- Daguerre, J. 1922. Lista de aves coleccionadas y observadas en Rosas F.C.S. El Hornero 2 (4): 259-271. Bs. As.
- Doello Jurado, M. 1917. Sobre aves de Puerto Deseado (Patagonia). El Hornero 1 (1): 8-16. Bs. As.
- Escalante, R. 1970. Aves marinas del Río de la Plata y aguas vecinas del Océano Atlántico. Barreiro y Ramos S.A. Montevideo.
- Marelli, C. 1924. Elenco Sistemático de la Fauna de la Provincia de Buenos Aires. Mem.

Ministerio de Obras Públicas. Bs. As.

- Murphy, R.C. 1936. Oceanic birds of South America. Vols. 1 y 2. Amer. Mus. Nat. Hist. New York.

- Narosky, T. 1978. Aves Argentinas. Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense. Asoc. Ornit. del Plata. Bs. As.

- Narosky, S. y M.A. Fiameni. 1986. Aves pelágicas en Costa Bonita, Buenos Aires, Argentina. El Hornero 12(4): 281-285. Bs. As.

———. 1987. Aves de Costa Bonita. Nuestras Aves. Nº 12: 16-17. Bs. As.

- Olrog, C.C. 1963. Lista y Distribución de las Aves Argentinas. Op. Lilloana IX. Tucumán.

———. 1979. Nueva lista de la avifauna

argentina. Op. Lilloana XXVII. Tucumán.

- Pereyra, J. 1923. Las aves de la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. El Hornero 3 (2): 159-174. Bs. As.

———. 1938. Aves de la Zona Ribereña Nordeste de la provincia de Buenos Aires. Mem. Jard. Zool. Tomo IX. La Plata.

- Ringuelet, R. y R. Aramburu. 1957. Enumeración Sistemática de los Vertebrados de la provincia de Buenos Aires. Min. Asuntos Agrarios. La Plata.

- Vaz-Ferreira, R. y E. Gerzenstein. 1961. Aves nuevas o poco conocidas de la Rep. Oriental del Uruguay. Com. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo, 5 (92): 1-65.

Registro extralimital de Jabirú para la provincia de Mendoza

E. Richard y C. Laredo



Durante el mes de enero de 1982 y como parte de un programa de exploración y relevamiento de fauna en espejos de agua dulce (naturales y artificiales) a cargo del Grupo de Actividades Subacuáticas del Acuario Municipal de Mendoza (Programa de Investigación A.M.M. Nº 12), se vi-

sitó el dique El Carrizal ubicado en el Distrito Carrizal, Departamento Rivadavia de la Provincia de Mendoza.

En la ocasión, el día 14 de enero en horas de la tarde pudo observarse un grupo de cuatro ejemplares de *Jabiru mycteria* (Ciconiidae) junto a la orilla Este del embalse. Al acercarnos al grupo con la finalidad de fotografiarlos, tres de ellos levantaron vuelo en tanto que el cuarto permaneció cerca del agua donde pudimos realizar una toma fotográfica y verificar que el animal se hallaba herido.

La localidad registrada en la presente dista aproximadamente 600 km del área de distribución más cercana donde ocurre la especie: Bañados del Río Dulce, NE de la Provincia de Córdoba (Nores et al., 1983). Esta distancia como así también la falta de antecedentes que documentan la presencia de la especie en Mendoza (ver Roig, 1965) nos llevan a suponer que nuestra observación correspondería a un registro extralimital de la distribución frecuente o normal de *Jabiru mycteria*. El embalse El Carrizal recibe su aporte