



FRUTERO NEGRO EN BERNAL

Carlos Schmidutz y Carlos Aguilán

El 29 de octubre de 1988, durante una recorrida en la localidad de Bernal (pdo. Quilmes), Buenos Aires, se observó un ejemplar de frutero negro (*Tachyphonus rufus*) volando a bastante altura y notándose claramente las tapadas alares blancas en contraste con el negro violáceo del cuerpo. Al posarse era muy visible, también por el contraste, la mancha blanca de los hombros. La zona de observación era un monte con predominio de especies exóticas en un terreno bajo cercano al Río de la Plata.

Según Olrog (1979 y 1984) y Narosky (1979) la especie llega al Delta de Buenos Aires. Klimaitis y Moschione (1987) sólo citan una hem-

bra observada a fines de marzo de ese año en Punta Lara.

Bibliografía

- KLIMAITIS J. y MOSCHIONE F. 1987. Aves de la Reserva marginal de Punta Lara y sus alrededores. Min. Econ. Prov. Buenos Aires, 143 pp.
 NAROSKY T. 1978. Aves argentinas - guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense. Asoc. Ornit. del Plata. B. Aires.
 OLROG C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lill. 27. Tucumán.
 ___. 1984. Las aves argentinas, una nueva guía de campo. Adm. Parques Nacionales. Buenos Aires.



NUEVAS OBSERVACIONES SOBRE EL VERDERON

G. G. Roitman y N. H. Montaldo




Ilustración: Aldo Chiappe

ron vistos dos ejemplares adultos y en la restante varios adultos y un juvenil, que presentaba el plumaje rayado característico.

El verderón fue citado por primera vez en la Argentina en la localidad de Villa Gesell, donde es abundante (Montaldo 1979). Nuevos aportes fueron efectuados por Armani (1983), Montaldo y Claver (1986) y por Narosky e Yzurieta (1987).

Las presentes observaciones confirman que esta especie exótica se encuentra en expansión en nuestro país.

Bibliografía

- ARMANI, C. G. 1983. Le Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) nouveau Fringille sud-américain?. L'oiseau et R.F.O. 53: 294-296.
 MONTALDO, N. H. 1979. Presencia de *Chloris chloris* en la Argentina. Hornero 12: 57-58.
 MONTALDO, N. H., y J. A. CLAVER. 1986. Guía de las aves silvestres de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Rev. Facultad Agronomía 7:191-216.
 NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornit. del Plata. B. Aires.

Durante dos visitas realizadas el 18/12/88 y el 12/02/89 a la reserva de Ribera Norte, partido de San Isidro, y a sus alrededores, se observaron individuos del verderón común (*Carduelis chloris*). En la primera oportunidad fue-