

sitácidos que he observado en Palermo. Anteriormente registré *Myiopsitta monachus*, *Nandayus nenday* y *Pyrhura frontalis* (primer registro personal: 3 de abril de 1988).

*San Luis 2844 - 7º "A"
(1186) Capital Federal

N. de R.: En los últimos años se han repetido coincidentemente los registros de especies de sitácidos subtropicales para los alrededores de la Capital Federal, pero la importancia biogeográfica de tales hallazgos parece ser rela-

tiva. Casi con seguridad, la presencia de estas especies en la región es una consecuencia indirecta del activo comercio, tanto legal como ilegal, que de ellas se hace. Junto a los riesgos que implica al promover el saqueo de las poblaciones naturales, el tráfico de fauna acarrea ahora la introducción de especies exóticas, hecho cuyas consecuencias son difíciles de prever. De todas formas, tanto la especie aquí tratada como otras que se han mencionado deben ser encontradas nidificando exitosamente, antes de considerarse nuevos integrantes de la avifauna regional.



NUEVOS REGISTROS Y LOCALIDADES PARA EL AGUILUCHO LANGOSTERO

Aníbal F. Parera *

Las referencias para el aguilucho langostero, *Buteo swainsoni*, en la Argentina son escasas y puntuales, aún cuando el incremento en el número de observadores de campo se vio reflejado en un notable aumento de registros para la especie. Los datos con que se cuenta resultan todavía insuficientes para establecer a ciencia cierta la dispersión geográfica estival que en nuestro país adopta la rapaz a la llegada de su migración del hemisferio norte, así como sus probables rutas migratorias.

Un primer intento de clarificación de la situación, lo constituye el trabajo de compilación de avistajes realizado por CIPA Sección Argentina (1987).

En el mismo no se mencionan registros para la provincia de Corrientes, y solo uno se establece para Entre Ríos, en la localidad de Gualeguaychú (un ejemplar observado por Flavio Moschione).

En la primera provincia, la especie había sido señalada por Contreras (1981), sin mencionar citas o localidades. El mismo autor (com. pers.) cuenta con un registro personal de un ejemplar en el depto. Capital en 1987.

Para Entre Ríos, *B. swainsoni* fue listado por Freiberg (1943), quien tampoco menciona citas ni localidades, en su trabajo realizado en base al material del Museo de Entre Ríos. Serié y Smyth (1923) mencionan la especie entre las aves capturadas por Holland en Sta. Elena, confundiendo la localidad de captura de este autor (Estancia Santa Elena, pcia. de Bs. As.) con la ciudad de Santa Elena, sobre la costa entrerriana del Paraná, en el depto. La Paz (Narosky y Di Giacomo, en preparación).

De modo que sólo la localidad de Gualeguaychú es la conocida hasta el momento.

Ambas provincias entran en la distribución señalada por Olrog (1979), Nores *et al.* (1983) y Narosky e Yzurieta (1987).

La presente nota agrega cuatro localidades para la pcia. de Entre Ríos, una para Corrientes, y un dato sobre una bandada observada en Capital Federal.

Entre Ríos

—Pto. Alvear (depto. Diamante): El 18 de diciembre de 1988 fueron observados ejemplares dispersos en gran cantidad por los campos aledaños al pueblo. Mayormente adultos. Todos volando a diferentes alturas, menos un juvenil que permaneció posado (probablemente durante horas) sobre una tala (*Celtis*) al costado de un camino poco transitado. Dos días después se reunieron más de un centenar de ejemplares sobre las barrancas del río Paraná, donde realizaban vuelos rasantes sobre las copas de los árboles, tocando las ramas exteriores de los mismos. Un ejemplar levantó un insecto (probablemente una chicharra, *Tibicen* sp.), y varios llevaban telas de arañas colgando de sus patas. Algunas parejas efectuaban acrobacias aéreas, caídas bruscas dibujando espirales en el aire. Todos los ejemplares eran adultos.

—La Juanita (depto. Diamante): El 21 de diciembre del mismo año, dos ejemplares adultos volando en círculos a baja altura sobre el río Paraná.

—Ciudad de Paraná (depto. Paraná): El 22 del mismo mes se observaron cinco ejemplares,

los que pasaron volando en círculos en dirección S-N sobre el parque Urquiza de la ciudad. —Ruta 18 km 180 (depto. Villaguay): El 6 de febrero de 1989 se observaron aproximadamente 10 ejemplares en compañía de Mariano Masariche. Todos juveniles, al parecer de distintas edades. La mayoría deteniéndose en el aire a metros del suelo, lanzándose en ocasiones hasta el piso. No se los vio recoger presas.

Corrientes

—Curuzú Cuatiá (depto. Curuzú Cuatiá): El 8 de octubre de 1987, a las 17.30 hs. pasaron 15 ejemplares juveniles volando en círculos, en dirección S-N, a considerable altura.

Capital Federal

—Parque Natural Costanera Sur: El 19 de noviembre de 1988 pasaron ejemplares adultos agrupados en tres bandadas desde las 14.50 hs. hasta las 16.50 hs. La última, de probablemente unos cien ejemplares, fue observada momentos más tarde en Olivos por Sofía Heinonen y Juan Carlos Chebez (com. pers.). Las dos primeras bandadas eran de aproximadamente 15 ejemplares cada una, por momentos entremezclándose con una de cigüeñas (*Ciconia*).

Los registros quedaron documentados fotográficamente en los casos de Pto. Alvear y Costanera Sur.

Agradecimiento: Al Dr. Julio Rafael Contreras y al Sr. Juan Carlos Chebez, por los datos proporcionados.

Bibliografía:

- CIPA Sección Argentina. 1987. La presencia actual del aguilucho langostero en la Argentina. *Nuevas Aves* 13: 13-16.
- CONTRERAS, J. R. 1981. Lista preliminar de la avifauna correntina. I. No Passeriformes. *Historia Natural* 2: 21-28.
- CHEBEZ, J. C. y M. RINAS. 1988. Aguilucho langostero en Misiones. *Nuestras Aves* 17: 11-12.
- Asoc. Ornit. del Plata. Bs. As.
- FREIBERG, M. 1943. Enumeración sistemática de las aves de Entre Ríos. *Memorias del Museo de Entre Ríos. Zool.* 21: 1-110.
- NAROSKY, T. y A. DI GIACOMO (en preparación). *Manual de la Avifauna Bonaerense*.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. *Asoc. Ornit. del Plata. Bs. As.*
- NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. *Bol. Acad. Nac. de Ciencias.* 56: 1-114.
- OLROG, C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Op. Lilloana* 27, Tucumán.
- SERIE, P. y C. H. SMYTH. 1923. Notas sobre aves de Santa Elena, Entre Ríos. *Hornero* 3:37-45

* Tonelero 6848
(1408) Capital Federal



EL AGUILUCHO LANGOSTERO EN EL S Y SE DE BUENOS AIRES

Rolf Delhey y Alberto Scrolli *

El límite sur de la distribución del aguilucho langostero (*Buteo swainsoni*) en la Argentina se señala para la provincia de Río Negro (Olrog 1979; de la Peña, 1985). Sin embargo, las observaciones más australes indicadas en la reciente recopilación de Canevari (CIPA - Sección Argentina, 1987) corresponden a la zona entre Tres Arroyos y Bahía Blanca, pcia. de Bs. As.

Nuestras observaciones en las temporadas 1987/88 y 1988/89 muestran que esta rapaz migratoria del Hemisferio Norte es bastante frecuente en el sur y sudeste bonaerense, al menos durante las temporadas indicadas. Las notas presentadas a continuación incluyen

también algunas observaciones sobre el comportamiento de la especie.

3 dic. 1987: 11 hs., Ruta Nac. 3; 5 km al E del aeropuerto de Bahía Blanca, pdo. de Bahía Blanca, tiempo nublado y caluroso: aproximadamente 80 individuos, planeando a diferentes alturas, algunos halconeando y tirándose en picada sobre un campo de cereal cosechado; otros asentados en los postes de luz y de alambrados.

28 dic. 1987: Mediodía, Ruta 228, aproximadamente a 15 km al E de Tres Arroyos, pdo. de Tres Arroyos: 21 individuos planeando y cazando, aprovechando la quema de pastos en el borde de la ruta. Poco más tarde observa-