

mos un individuo solitario sobre un poste de luz cerca de Cascallares.

30 dic. 1987: 10 hs., Ruta 51, aproximadamente a 15 km de Bahía Blanca hacia el NE, pdo. de Bahía Blanca, soleado: siete aguiluchos langosteros planeando, en compañía de varios chimangos (*Milvago chimango*).

7 feb. 1988: Mediodía, Ruta 228, km 78 (entre Energía y Tres Arroyos), pdo. San Cayetano, soleado: ocho aguiluchos langosteros planeando, a veces halconeando.

18 feb. 1988: Mediodía, ciudad de Bahía Blanca, pdo. de Bahía Blanca, nublado: Una bandada de aproximadamente 30 individuos, precediendo a un frente de tormenta, desplazándose en dirección NE y planeando en círculos a diferentes alturas.

22 feb. 1988: Por la mañana, Ruta 3, aproximadamente a 40 km al E de Bahía Blanca, pdo. Cnel. L. Rosales: se observan cuatro aguiluchos posados en postes de alambrado, separados entre sí por varios cientos de metros. Debido a las circunstancias del tránsito sólo uno pudo ser identificado con certeza como *B. swainsoni*.

5 ene. 1989: Mediodía, campos cerca de Bordenave (partido de Puán), llovizna: por lo menos 180 aguiluchos langosteros, sobre postes de alambrado. Al pasar con el vehículo levantan vuelo a desgano para volver pronto a su asiento. Según información del Ing. Agr. Mario Vigna (INTA Bordenave), en ese período se registró un severo ataque de tucuras en los campos de la zona.

Al atardecer del mismo día, en las afueras de Bahía Blanca: diez individuos planeando sobre un monte de eucaliptos.

24 feb. 1989: Atardecer, Ruta 3, 30 km al E de Bahía Blanca, pdo. Cnel. L. Rosales: un individuo posado en un poste de alambrado, flanqueado por dos chimangos en los postes más próximos.

26 feb. 1989: Atardecer, ruta de acceso al balneario Pehuén-Co, pdo. Cnel. L. Rosales: un aguilucho langostero sobre poste de alambrado.

Bibliografía

CIPA Sección Argentina. 1987. La presencia actual del aguilucho langostero en la Argentina. Nuestras Aves 13: 13-16.

DE LA PEÑA, M. 1985. Guía de aves argentinas. T II. Falconiformes. Santa Fe.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27: 1-324.

* CAPRIM-CONICET
Casilla de Correo 145
3400 Corrientes

Addenda:

Nuestra consocia Thora O'Dwyer nos informa por su parte, sobre la observación de individuos de *Buteo swainsoni* en la Estancia Maorí, Pieres, pdo. de Lobería, Buenos Aires, en diciembre de 1981 y en enero de 1984. Menciona además haber encontrado un ejemplar muerto en 1981 en la misma zona.



EL NORTE DE CHILE A VUELO DE PAJARO

Tito Narosky *

En una reciente recorrida por la zona central y norte de Chile (Regiones I a V) tuve oportunidad de hacer observaciones sobre un total de 120 especies de aves. Algunos de los registros pueden significar aportes ornitogeográficos o conservacionistas, en tanto otros quizá resulten de interés para el naturalista argentino que visite el país vecino. Las especies mencionadas se han seleccionado entonces según los siguientes criterios: aves no comunes en el país trasandino; aves presentes en la Argentina pero de difícil observación, y aves endémicas o no presentes en nuestro país. Los registros para Chile que se incluyen corresponden a los citados por Araya y Millie (1986). Se agrega además en mayúsculas el estado de

conservación de la especie propuesto para Chile (Glade 1987).

Spheniscus humboldti. 7 feb. 1989. Parque Nacional Pan de Azúcar, III Región. Se hallaron ejemplares muertos en la playa - 25 feb. 89. Caldera, III Región. Tres ejemplares nadando en el mar. VULNERABLE.

Sula variegata. 5 feb. 89. Pichidangui, IV Región - 6 feb. 89. La Serena, IV Región. Es común en las costas marinas. INADECUADAMENTE CONOCIDA.

Pelecanus thagus. 4 feb. 89. Reñaca, V Región - 6 feb. 89. La Serena - 7 feb. 89. P. N. Pan de Azúcar - 10 feb. 89. Huacachi, II Región - 11 feb. 89. Arica, I Región - 24 feb. 89. Antofagasta, II Región. Muy abundante y confiada en las

costas, aún en puertos de pescadores.

Phalacrocorax gaimardi. 28 feb. 89. Con Con, V Región. Unos 20 ejemplares en una roca en el mar. INADECUADAMENTE CONOCIDA.

Ardea cocoi. 26 feb. 89. La Serena. Un ejemplar - 27 feb. 89. Conchalí, IV Región. Idem. RARA.

Phoenicoparrus jamesi (+). 20 feb. 89. Toco-nao, II Región. En el salar de Atacama, decenas de ejemplares de la especie, donde predominan sobre *P. andinus* y *Phoenicopterus chilensis*. La mayoría subadultos - 25 feb. 89. Laguna Colorada, II Región. Dos ejemplares. VULNERABLE.

Anas puna. 17 feb. 89. Lago Chungará, I Región (4500 m s.n.m.).

Buteo poecilochrous. 15 feb. 89. Putre, I Región - 21 feb. 89. Socaire, II Región. Atribuyo a esta especie sendos aguiluchos grandes vistos en dos localidades de altura (ambas a unos 3600 m s.n.m.), aunque no con seguridad, debido a la difícil separación de *B. polysoma*. Sería el segundo registro para Chile. INADECUADAMENTE CONOCIDA.

Pandion haliaetus. 8 feb. 89. Iquique, I Región. Un inmaduro y un adulto - 23 de feb. 89. Juan López, II Región. Un ejemplar. VULNERABLE.

Fulica gigantea. 17 feb. 89. Lago Chungará. Abundante, con jóvenes. VULNERABLE.

Fulica cornuta (+). 21 feb. 89. Laguna Meñique, II Región (4100 m s.n.m.). Grupo numeroso. VULNERABLE.

Aphriza virgata. 4 feb. 89. Reñaca. 6 ejemplares, junto a 8 *Arenaria interpres*.

Calidris pusilla (+). 10 feb. 89. Toconao. 10 ejemplares, en pequeños islotes y bordes del agua, en el salar de Atacama. Sería el tercer registro para Chile. No figura en ninguna categoría en el citado trabajo de Glade (1987).

Numenius phaeopus. 5 feb. 89. Pichicuy, IV Región - 7 feb. 89. P. N. Pan de Azúcar - 11 feb. 89. Arica - 24 feb. 89. Antofagasta - 26 feb. 89. La Serena - 27 feb. 89. Tongoy, IV Región. Especie abundante en las costas marinas y estuarios, donde pueden verse bandadas de decenas de individuos.

Catoptrophorus semipalmatus. 26 feb. 89. La Serena. Un ejemplar junto a varios *N. phaeopus* - 27 feb. 89. Tongoy. 5 ejemplares en el estuario del río Soco. Considerado escaso por Araya y Millie (1986), no ha sido asignado a ninguna categoría de conservación (Glade 1987).

Phalaropus tricolor. 17 feb. 89. P. N. Lauca, I Región. Unos 20 ejemplares nadando - 17 feb. 89. Lago Chungará. Varios.

Larus belcheri. 7 feb. 89. Chañaral, III Región - 14 feb. 89. Arica - 24 feb. 89. Antofagasta. Basándose en diferencias de coloración y

proporciones, Devillers (1977) considera como especies diferentes a las formas del Atlántico y el Pacífico.

Larus serranus (+). 21 feb. 89. Lagunas Miscanti y Meñique, II Región. RARA.

Larus modestus. 7 feb. 89. P. N. Pan de Azúcar y Antofagasta - 24 feb. 89. Antofagasta - 26 feb. 89. La Serena. VULNERABLE.

Sterna sandvicensis. 27 feb. 89. Tongoy. Un ejemplar en el estuario del río Soco. Sería el segundo registro para Chile. No ha sido tratado en el trabajo de Glade (1987).

Sterna elegans. 24 feb. 89. Antofagasta y La Serena. Varios - 27 feb. 89. Tongoy. 10 ejemplares. Especie similar a *S. maxima*, aunque de menor tamaño.

Larosterna inca. 28 feb. 89. Con Con. Observado volando, en tres ocasiones. VULNERABLE.

Zenaida asiatica. 11 feb. 89. Arica. Abundante en la ciudad. Nido en construcción en una plaza.

Columbina cruziana. 11 feb. 89. Arica. Junto a la precedente, son las especies más frecuentes en la ciudad.

Metriopelia ceciliae. 15 feb. 89. Putre. Bandada a 3600 m s.n.m.

Crotophaga sulcirostris. 14 feb. 89. Arica. Una bandada en el valle de Lluta.

Cinclodes nigrofumosus. 4 feb. 89. Reñaca - 7 feb. 89. P. N. Pan de Azúcar - 11 feb. 89. Arica. Común aunque solitario entre las piedras bañadas por el mar a lo largo de las costas.


Muscisaxicola juninensis (+). 17 feb. 89. P. N. Lauca (4300 m s.n.m.). Un ejemplar - 21 feb. 89. Laguna Meñique. Entre otras dormilonas.

Hirundo andecola. 15 feb. 89. Putre.

Mimus thenca. 27 feb. 89. Los Vilos, IV Región. Endémica de Chile.

Conirostrum cinereum. 14 y 16 feb. 89. Arica. Común en el valle de Lluta. Recuerda a nuestro *C. speciosum*.

Sicalis uropygialis. 16 feb. 89. Putre. Bandadi-



Playero Trinador
Numenius phaeopus

tas en pedregales puneños a 3100 m s.n.m., junto a *Phrygilus plebejus*.

Phrygilus erythronotus. 17 feb. 89. P. N. Lauca. Recuerda a *Diuca diuca*.

Xenospingus concolor. 10 feb. 89. Iquique. En una zona con predominio de equisetáceas en las costas del río Tiliriche, camino a Arica, una pareja de esta especie.

Sturnella bellicosa. 14 feb. 89. Arica (valle de Lluta). Parecido a *S. loyca*.

(+) Observación realizada en compañía del capacitado guardafauna Ernesto Cerda Candía (CONAF).

Agradecimientos

Al Dr. Alfonso Glade, Jefe de la Sección Fauna Silvestre de la Corporación Nacional Forestal de Chile, por el amable apoyo recibido durante el presente viaje, y a todo el personal de

CONAF de las distintas regiones recorridas. Además, a mi esposa Raquel, por su invaluable compañía y colaboración.

Bibliografía

ARAYA, M. B. y MILLIE H., G. 1986. Guía de campo de las aves de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 389 pp.

DEVILLERS, P. 1977. Observations at a breeding colony of *Larus (belcheri) atlanticus*. Gerfaut 67: 22-43.

GLADE, A. (ed.). 1987. Libro Rojo de los vertebrados terrestres de Chile. Actas Simp. "Estado de Conservación de la Fauna de Vertebrados Terrestres de Chile". CONAF, Santiago de Chile. 65 pp.

* Hipólito Yrigoyen 4200
(1824) Lanús, Buenos Aires



PRESENCIA REGULAR DE *EUSCARTHMUS MELORYPHUS* EN EL NE DE BUENOS AIRES

Norberto H. Montaldo *

La presencia de *Euscarthmus meloryphus* en Buenos Aires era desconocida hasta hace poco tiempo, cuando Narosky (1978) la mencionó como rara para el NE bonaerense. Sin embargo, observaciones realizadas a lo largo de varios años (tabla 1) demuestran que una población considerable de este tiránido llega cada primavera a la provincia, donde seguramente nidifica.

La falta de otros registros concretos de la especie(1) puede atribuirse a su pequeño tamaño, coloración poco llamativa, y principalmente, a que habita en la parte baja de la

vegetación densa y enmarañada pero, pese a estos inconvenientes que dificultan su observación, posee una voz potente y característica, descrita por varios autores (v.g. Meyer de Schauensee y Phelps 1978; Sick 1985; Narosky y Yzurieta 1987) cuyo conocimiento resulta indispensable para detectarla a campo.

Bibliografía

MEYER de S., R. y W. H. PHELPS Jr. 1978. A guide to the birds of Venezuela. Princeton Univ. Press, Princeton, New Jersey.

NAROSKY, T. 1978. Aves argentinas. Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense. Asoc. Ornit. del Plata, Bs. Aires.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornit. del Plata, Bs. Aires.

SICK, H. 1985. Ornitología brasileira. Uma introdução. Vol. II. Edit. Universidade de Brasilia.

(1) Encontrándose esta nota en prensa F. Moschione citó un individuo para Punta Lara (Garganchillo 1989: 10-16).

* Cátedra de Botánica
Facultad de Agronomía (U.B.A.)
Av. San Martín 4453
(1417) Buenos Aires

Tabla 1

Localidad	Partido o jurisdicción	Fecha	Frecuencia observada
Lima	Zárate	04 dic. 1981	común
Lima	Zárate	18 nov. 1982	común
Lima	Zárate	25 nov. 1982	abundante
Lima	Zárate	29 nov. 1982	común
Lima	Zárate	04 oct. 1983	común
Lima	Zárate	05 nov. 1983	común
Lima	Zárate	08 abr. 1984	escasa
Costanera Sur	Capital Federal	04 oct. 1986	1 individuo
Punta Lara	Ensenada	29 dic. 1987	1 individuo
Punta Lara	Ensenada	26 oct. 1988	común