

## LA SUPUESTA ESPECIALIZACIÓN TROFICA DEL ESPARVERO COMÚN *ACCIPITER BICOLOR CHILENSIS*

Aníbal E. Casas \*

Según comenta Housse (1937), la presa preferida en la dieta de la rapaz del título es el zorzal patagónico *Turdus falklandii*, siguiéndole en importancia las aves de corral, aves acuáticas menores (*Porphyriops melanops*, *Rallus sanguinolentus*), palomas (*Columba araucana*, *Zenaida auriculata*) y perdices—según la zona— y también passeres (*Zonotrichia capensis*, *Diuca diuca*). Como alternativa y siempre según el mismo autor, en primavera busca nidos para tomar pichones. Destaca que no se encontraron restos de mamíferos en ejemplares capturados y describe perfectamente la metodología de caza, la que se ha podido comprobar y se detalla más adelante. Sobre la alimentación del esparvero común, Goodall et al. (1951) señalan para Chile la predilección y dependencia del mismo por la paloma araucana (*Columba araucana*), a quien incluso acompañaría en sus movimientos estacionales hacia el norte. Actualmente esta paloma es muy escasa en su distribución norte (IV a la VI Región), en tanto sus poblaciones son vulnerables entre la VII y XI Región (CONAF 1987). Posiblemente la disminución de la paloma la hace hoy día una presa más rara en la alimentación de este accipítrido.

Humphrey et al. (1970) dan cuenta para Tierra del Fuego de un macho que en su estómago tenía restos del furnárido *Aphrastura spinicauda* y de un adulto que comía una torcaza (*Zenaida auriculata*).

Por último, Clark (1986) incluye para la dieta de este esparvero lauchas, lo que contradice a los autores nombrados.

**Observaciones personales:** El 12 nov. 1978 un ejemplar adulto capturó un zorzal que voló de su nido, sito entre ramas de retama (*Bulnesia retamo*), al que acechaba desde un pino (*Pinus* sp.) en proximidades de la Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, depto. Bariloche, Río Negro. Se constató además que comió la cabeza del ave.

En tres oportunidades (Mallín Ahogado, depto. Bariloche, Río Negro, el 12 oct. 1984; Esquel, Departamento Futaleufú, Chubut, 22 mar. 1986 e Isla Victoria, Parque Nacional Nahuel Huapi,

8 dic. 1986) se observó a este predador capturar zorzales utilizando caza al acecho. *A. b. chilensis* elige como percha árboles en la periferia del bosque o en claros con herbáceas cortas o ralas, sitios que frecuentan los zorzales para obtener a su vez insectos y otros invertebrados.

El 15 jun. 1989 se observó en pleno centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche a un juvenil de *A. b. chilensis* fallar en su intento por atrapar una paloma doméstica (*Columba livia*), integrante de una bandada que pasaba cerca de su percha, un alto árbol exótico (*Sequoia dendron giganteum*).

Patricia Fierro (com. pers.) observó, también en San Carlos de Bariloche, al esparvero común perseguir sin éxito a gorriones (*Passer domesticus*).

En síntesis, *A. b. chilensis* es ave ornitófaga y, aunque no hay evidencia sólida de especialización, es el zorzal patagónico el principal integrante de su dieta. La captura de roedores podría ser un hecho poco común.

### Bibliografía

CLARK, R. 1986. Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, una guía de campo. Lit. of Latin America. Buenos Aires.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1987. Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile. Impresiones Comerciales. Santiago de Chile.

GOODALL, J., A. JOHNSON y R. PHILIPPI. 1951. Las aves de Chile, su conocimiento y sus costumbres. Tomo II. Platt Est. Gráf. Buenos Aires.

HOUSSE, R. 1937. El Peuquito *Accipiter chilensis* (Philippi y Landbeck). Rev. Chilena de Hist. Natural, 134-140.

HUMPHREY, P., D. BRIDGES, P. REYNOLDS y R. PETERSON. 1970. *Birds of Isla Grande* (Tierra del Fuego). Prelim. Smiths. Manual. University of Kansas.

\* Casilla de Correo 658  
8400. San C. de Bariloche  
Pcia. de Río Negro