



## ARATINGA LEUCOPHTHALMA EN CONCORDIA, ENTRE RIOS

Faustino J. Torrano \*

Como parte de un relevamiento de avifauna local el 16 oct. 1988 recorriamos una selva en galería existente en Concordia, Entre Ríos (31°22' LS-58° 07' LO) sobre la margen derecha del río Uruguay, en el Parque San Carlos ubicado 5 km al NE del centro urbano, detectando en esa oportunidad un psitácido que no figuraba en nuestros registros locales.

El 23 oct. 1988, con la expresa finalidad de ratificar la presencia del ave no identificada, volvimos al lugar. En esta ocasión el bullicio de loros denunció su presencia orientando nuestra atención hacia un sector donde hallamos asentada una numerosa bandada, estimando su número entre 60 y 80 individuos difíciles de contar en conjunto por lo denso del follaje. Todos ellos se dedicaban a comer frutos de mora (*Morus* sp.), árbol que abunda en este bosque.

La observación se realizó una mañana despejada, utilizando binoculares 10 x 50, con las aves distantes entre 20 y 50 m, por espacio de 120 minutos entre las horas 10 y 12.

El 26 oct. 1988 se repitió la observación en el mismo sector obteniendo similares resultados.

Los loros hallados corresponden a la especie *Aratinga leucophthalma* y la descripción es la siguiente: color predominante, verde. Longitud estimada 29 cm. Pico alto, córneo. Corona verde oscuro, cara emplumada, pericocular amarillo. Dorso verde pasto. Alas más oscuras con hombro rojo vivo, tapadas amarillas que se hacen visibles con las alas entreabiertas. Cuello verde con pocas y pequeñas pintas rojas distribuidas sin orden, aunque en algunos individuos estos puntos tienden a formar collar. Ventral verde pálido con rojo en el encuentro de las piernas con el abdomen, no siempre visible. Patas color gris claro. Cola larga, escalonada, verde en el dorso y bronceada ventralmente.

Comportamiento: Desconfiados, y aunque hay alimento en niveles inferiores, ocupan estratos medios y altos dedicándose a comer frutos de

mora (*Morus* sp.). Huyen ante la presencia del observador antes que otras especies. Su vuelo es potente y todos gritan al remontar; minutos más tarde van retornando paulatinamente al mismo lugar.

Al retirarnos de la selva en galería las aves permanecían en la actividad descripta. La presencia de estos loros coincidió con la abundante disponibilidad del alimento citado que era compartido con un centenar de *Columba picazuro*, una decena de *Columba maculosa* y menor cantidad de otras especies.

El presente hallazgo de *Aratinga leucophthalma* en Concordia sería el tercero para la provincia de Entre Ríos. Friedmann (1926) cazó un macho adulto en "San Joaquín, Entre Ríos". Luego la menciona Freiberg (1943), basándose en un ejemplar de arroyo Hondo, La Paz, obtenida en 1926. La especie no ha sido registrada hasta hoy en el Parque Nacional El Palmar (Navas 1982, Baliño 1984, Biolé y Baliño 1985).

### BIBLIOGRAFIA

- BALIÑO, J. J. 1984. Aves del Parque Nacional El Palmar, lista sistemática y otras contribuciones a su conocimiento. Revista del M.A.C.N., Zoología 13.
- BIOLÉ, F. J. y J.J. BALIÑO. 1985. Análisis preliminar del estado de la avifauna del Parque Nacional El Palmar. Administración de Parques Nacionales.
- FREIBERG, M. 1943. Enumeración sistemática de las aves de Entre Ríos. Mem. Mus. E. Ríos (Zool.) 21:1-110.
- FRIEDMANN, H. 1927. Notes on some Argentine Birds. Bull. Mus. Comp. Zool. 68:139-236.
- NAVAS, J.R. 1982. Introducción a la avifauna del Parque Nacional El Palmar. Anales de Parques Nacionales 15:35-64.

\*Sarmiento 1176  
3200 Concordia  
Entre Ríos



## OBSERVACION DEL TITIRI EN OTAMENDI, BUENOS AIRES

Eduardo Haene y Daniel Blanco \*

El 8 de noviembre de 1986, en compañía de Diego Kostic, observamos un ejemplar del titirí

(*Syndactyla rufosuperciliata*) recorriendo troncos y follaje en el bosque húmedo que bordea

el Paraná de las Palmas, a la altura de Otamendi, partido de Campana. En este lugar las comunidades vegetales más típicas son el sauzal, el seibal, el alisal, el matorral ribereño y diversos pajonales con algunas especies arbóreas de la selva marginal (Cabrera y Zardini 1978). Numerosas enredaderas y espifitas, como *Tillandsia usneoides*, recubren los árboles y le dan un aspecto tupido a la vegetación. Hay numerosos ejemplares vegetales de antiguas quintas y plantaciones abandonadas.

Con el asesoramiento de Tito Narosky hemos encontrado algunas menciones de la especie para la provincia de Buenos Aires: La Plata (Ihering e Ihering 1907); Barracas al Sur, 8 nov. 1901 (Hartert y Venturi 1909); Islas del río Luján, diciembre de 1923 (Pereyra 1927), mencionándose luego esta misma cita como Cruz Colorada, Río Paraná (Pereyra, 1937/38 y 1951). Colectado por A. Pozzi, existe en el MACN otro ejemplar de La Plata, sin fecha, y en la colección Gavio figura un espécimen del Ao. Correa, Delta del Paraná, 21 nov. 1939, que se supone de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo en prep.). No tenemos conocimientos de observaciones publicadas con posterioridad. No obstante, el 1º de mayo de 1985, P. Blendinguer, H. Rodríguez Moulin y L. Segura (com. pers.) observaron un ejemplar de esta especie en la localidad de Otamendi, en el mismo ambiente descripto para nuestra cita. Cabe destacar que las características de este

monte marginal, descriptas al comienzo de la nota, coinciden con lo apuntado por Pereyra (1937/38) sobre el hábitat de la especie en la región: "Hay que buscarlos en los lugares más boscosos de nuestro delta, donde no es muy común, pero se suelen ver ejemplares". Agradecemos a Santiago Krapovickas, y muy especialmente a Tito Narosky por su valioso asesoramiento y consejos.

#### BIBLIOGRAFIA

- CABRERA, A.L. y E.H. ZARDINI. 1978. Manual de la flora de los alrededores de Buenos Aires. Ed. ACME, 755 págs., Bs. As.  
HARTERT, E. y S. VENTURI, 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. Novit. Zool. 16: 159-267.  
IHERING H. von e IHERING R. von 1907. Catalogos de Fauna Brasileira editados pelo Museu Paulista, vol I: As aves do Brazil. Sao Paulo.  
NAROSKY, T. y A. DIGIACOMO. Manual de la Avifauna Bonaerense (En Prep.)  
PEREYRA, J.A., 1927. Segunda lista de las aves de la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. El Hornero 4 (1): 23-34.  
PEREYRA, J.A., 1937-1938. Aves de la zona nordeste de la provincia de Buenos Aires. Men. Jarín Zool. 9, La Plata,  
PEREYRA, J.A., 1951. Avifauna argentina (Contribución a la ornitología). El Hornero 9 (3): 291-347.

\*25 de Mayo 749, 2º piso "6" (1002) Capital Federal



## ZORZALITO MIGRADOR (*Catharus ustulatus*) EN ENTRE RIOS

Aníbal F. Parera\*

El zorzalito migrador (*Catharus ustulatus*) llega hasta nuestro país como migrador desde el hemisferio norte, para establecerse durante los meses de octubre a marzo en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán (Olrog 1979). Nores et al. (1983) agregan además la provincia de Córdoba, mencionando haberlo observado en la localidad de "La Isla", cercana a la ciudad capital. El ambiente que ocupa el ave durante estos meses lo constituyen los bosques y selvas serranas hasta los 2500 m sobre el nivel del mar (Olrog 1979).

El 7 de enero de 1989 me hallaba realizando una salida de campo en la localidad conocida como Pto. Núñez, ubicada sobre el río Paraná unos 8 km aguas arriba de la ciudad de Paraná (hacia el este de la misma), cuando aproximadamente a las diez de la mañana pude observar durante unos minutos los movimientos de un ejemplar de la especie en cuestión.

El animal, que por su comportamiento impresionaba como juvenil, se desplazaba mediante cortos vuelos por las ramas medias del bosque que crece sobre una de las numerosas

quebradas que se recortan en la barranca del río. Estas pequeñas quebradas encauzan arroyos temporarios que dirigen el agua de lluvia hacia el río, y suelen resguardar suficiente humedad como para sustentar una abundante vegetación. La altura de las barrancas en la zona es de aproximadamente 40 m, por lo que el hallazgo se realizó a no más de 60 m sobre el nivel del mar.

Considero probable que la presencia del ave en el lugar sea accidental, y que el ejemplar haya sido desviado de su curso migratorio por algún temporal.

#### BIBLIOGRAFÍA

- NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina, Bol. Acad. Nac. de Ciencias 56: 1-114.  
OLROG, C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27. Tucumán.

\*Tonelero 6848

(1408) Capital Federal