

el Paraná de las Palmas, a la altura de Otamendi, partido de Campana. En este lugar las comunidades vegetales más típicas son el sauzal, el seibal, el alisal, el matorral ribereño y diversos pajonales con algunas especies arbóreas de la selva marginal (Cabrera y Zardini 1978). Numerosas enredaderas y espifitas, como *Tillandsia usneoides*, recubren los árboles y le dan un aspecto tupido a la vegetación. Hay numerosos ejemplares vegetales de antiguas quintas y plantaciones abandonadas.

Con el asesoramiento de Tito Narosky hemos encontrado algunas menciones de la especie para la provincia de Buenos Aires: La Plata (Ihering e Ihering 1907); Barracas al Sur, 8 nov. 1901 (Hartert y Venturi 1909); Islas del río Luján, diciembre de 1923 (Pereyra 1927), mencionándose luego esta misma cita como Cruz Colorada, Río Paraná (Pereyra, 1937/38 y 1951). Colectado por A. Pozzi, existe en el MACN otro ejemplar de La Plata, sin fecha, y en la colección Gavio figura un espécimen del Ao. Correa, Delta del Paraná, 21 nov. 1939, que se supone de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo en prep.). No tenemos conocimientos de observaciones publicadas con posterioridad. No obstante, el 1º de mayo de 1985, P. Blendinguer, H. Rodríguez Moulin y L. Segura (com. pers.) observaron un ejemplar de esta especie en la localidad de Otamendi, en el mismo ambiente descripto para nuestra cita. Cabe destacar que las características de este

monte marginal, descriptas al comienzo de la nota, coinciden con lo apuntado por Pereyra (1937/38) sobre el hábitat de la especie en la región: "Hay que buscarlos en los lugares más boscosos de nuestro delta, donde no es muy común, pero se suelen ver ejemplares". Agradecemos a Santiago Krapovickas, y muy especialmente a Tito Narosky por su valioso asesoramiento y consejos.

#### BIBLIOGRAFIA

- CABRERA, A.L. y E.H. ZARDINI. 1978. Manual de la flora de los alrededores de Buenos Aires. Ed. ACME, 755 págs., Bs. As.  
 HARTERT, E. y S. VENTURI, 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. Novit. Zool. 16: 159-267.  
 IHERING H. von e IHERING R. von 1907. Catalogos de Fauna Brazileira editados pelo Museu Paulista, vol I: As aves do Brazil. Sao Paulo.  
 NAROSKY, T. y A. DIGIACOMO. Manual de la Avifauna Bonaerense (En Prep.)  
 PEREYRA, J.A., 1927. Segunda lista de las aves de la región ribereña de la provincia de Buenos Aires. El Hornero 4 (1): 23-34.  
 PEREYRA, J.A., 1937-1938. Aves de la zona nordeste de la provincia de Buenos Aires. Men. Jarín Zool. 9, La Plata,  
 PEREYRA, J.A., 1951. Avifauna argentina (Contribución a la ornitología). El Hornero 9 (3): 291-347.

\*25 de Mayo 749, 2º piso "6" (1002) Capital Federal



## ZORZALITO MIGRADOR (*Catharus ustulatus*) EN ENTRE RIOS

Aníbal F. Parera\*

El zorzalito migrador (*Catharus ustulatus*) llega hasta nuestro país como migrador desde el hemisferio norte, para establecerse durante los meses de octubre a marzo en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán (Olrog 1979). Nores et al. (1983) agregan además la provincia de Córdoba, mencionando haberlo observado en la localidad de "La Isla", cercana a la ciudad capital. El ambiente que ocupa el ave durante estos meses lo constituyen los bosques y selvas serranas hasta los 2500 m sobre el nivel del mar (Olrog 1979).

El 7 de enero de 1989 me hallaba realizando una salida de campo en la localidad conocida como Pto. Núñez, ubicada sobre el río Paraná unos 8 km aguas arriba de la ciudad de Paraná (hacia el este de la misma), cuando aproximadamente a las diez de la mañana pude observar durante unos minutos los movimientos de un ejemplar de la especie en cuestión.

El animal, que por su comportamiento impresionaba como juvenil, se desplazaba mediante cortos vuelos por las ramas medias del bosque que crece sobre una de las numerosas

quebradas que se recortan en la barranca del río. Estas pequeñas quebradas encauzan arroyos temporarios que dirigen el agua de lluvia hacia el río, y suelen resguardar suficiente humedad como para sustentar una abundante vegetación. La altura de las barrancas en la zona es de aproximadamente 40 m, por lo que el hallazgo se realizó a no más de 60 m sobre el nivel del mar.

Considero probable que la presencia del ave en el lugar sea accidental, y que el ejemplar haya sido desviado de su curso migratorio por algún temporal.

#### BIBLIOGRAFÍA

- NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina, Bol. Acad. Nac. de Ciencias 56: 1-114.  
 OLROG, C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27. Tucumán.

\*Tonelero 6848

(1408) Capital Federal