

***Elanus leucurus* - Milano blanco**
P. Girard, Manchalá, Tucumán, 24 Nov. 1930, 3 huevos.

***Polyborus plancus* - Carancho**
1) S. Shipton, Concepción, Tucumán, 2 Oct. 1909, 1 huevo. 2) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 15 Ago. 1928, 3 huevos: 59,6 x 45,1; 56,7 x 47,7 y 57,8 x 45,8 mm. 3) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 10 Ago. 1931, 3 huevos. 4) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 15 Ago. 1931, 3 huevos. 5) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 10 Oct. 1931, 2 nidos con 3 huevos. 6) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 4 Oct. 1933, 3 huevos.

***Falco sparverius* - Halconcito común**
M. Lillo, Suncho Corral, Santiago del Estero, 15 Oct. 1908, 2 huevos.

***Otus choliba* - Alicuco común**
M. Lillo, Leales, Tucumán, 22 Mar. 1922, 4 huevos.

***Bubo virginianus* - Ñacurutú**
1) P. Girard, Simoca, Tucumán, 5 Jul. 1933, 2 huevos. 2) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 27 Set. 1944, 1 pichón. 3) J. Esteban, Monte Lindo, Formosa, 29 Nov. 1944, 1 pichón.

***Pulsatrix perspicillata* - Urucureá grande**
S. Pierotti, Río del Valle, Salta, 12 Dic. 1955, 1 Pichón.

***Glaucidium brasilianum* - Caburé chico**
M. Lillo, Tucumán, 17 Nov. 1917, 1 huevo: 26,4 x 20,2 mm.

***Strix rufipes* - Lechuza bataraz**
A. Kovacs, El Bolsón, Río Negro, 15 Ene. 1962, 1 pichón.

Agradezco a Juana B. de Herrera, Estela Alabarce y María M. Lucero por su colaboración y por permitir al autor trabajar con las colecciones del Instituto Miguell Lillo ■

BIBLIOGRAFÍA

DE LA PEÑA, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Imprenta Lux, Santa Fe.
HARTERT, E. y S. VENTURI. 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. Novit. Zool. 16: 159-267.

PEREYRA, J. A. 1937. Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la gobernación de La Pampa. Mem. Jard. Zool. La Plata 7: 197-326.

-. 1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. Mem. Jard. Zool. La Plata 9: 1-304.

*Recibida marzo 1990.

** Bv. Sarmiento 698-(5900) Villa María, Córdoba.



NUEVA LOCALIDAD PARA *LIMNORNIS CURVIROSTRIS* Marcos Babarskas*

La presencia de la pajonalera pico curvo, *Limnornis curvirostris*, ha sido señalada por diversos autores para localidades del este de nuestro país y en especial de la provincia de Buenos Aires. Al parecer, es factor común de todos los registros, al menos bonaerenses, que los mismos estén restringidos a la ribera o cercanías del Río de la Plata. Tal es el caso de: Sclater y Salvin (1868)-Conchitas-; Durnford (1877)-Belgrano-; Lynch Arribáizaga (1878)-Baradero-; Sclater (1890)-Río Luján-; Ihering e Ihering (1907)-Los Talas; Hartert y Venturi (1909)-Punta Lara y Barracas al Sur-; Hussey (1916)-La Plata-; Pereyra (1923)-San Isidro-; Pereyra (1934)-Escobar-; Pereyra (1937)-Gral. Lavalle-; Pereyra (1938)-Zona Delta -;

Esteban (1951) - Capital Federal, Quilmes y Río Santiago-; Carman, en Narosky *et al.* (1983)-Atalaya-; Earnshaw en Narosky *et al.* (1983)-Gral Lavalle y Magdalena-. También es ribereña la distribución hallada en listas o guías que incluyen la provincia de Buenos Aires.

En la revista El Hornero 6 (1), figura entre las aves ingresadas al Museo Argentino de Ciencias Naturales, un ejemplar presuntamente coleccionado por Daguerre en Rosas, partido de Las Flores, lejos de área ribereña. Los autores de trabajos generales no lo han considerado; además, según Narosky y Di Giacomo (en preparación), dicho ejemplar no ha sido hallado en el MACN.

La localidad de mi hallazgo es Chascomús,

provincia de Buenos Aires, situada a unos 75 km del Río de la Plata, siendo el registro más alejado de la zona costera, si excluimos el citado de Daguerre. La especie fue vista los días 19 y 21 de julio de 1989, en un campo bajo con predominancia de junco (*Scirpus*) y espadaña (*Zizaniopsis*). En mis observaciones tuve ocasión de ver al mismo tiempo, *L. curvirostris* y *Cranioleuca sulphurifera* comparando voz, coloración, tamaño y comportamiento y llegando a la conclusión de que se trataba de aquella especie sin lugar a dudas.

Agradezco al Sr. Tito Narosky por la gran colaboración prestada para la realización de esta nota ■

BIBLIOGRAFÍA

ANONIMO. 1935. Aves ingresadas al Museo. Hornero 6:123-125.

DURNFORD, H. 1877. Notes on the Birds of the Province of Buenos Aires. Ibis 1877:166-203

ESTEBAN, J.G. 1951. "Furnariinae" de la República Argentina. Acta Zool. Lilloana 12:377-441

HARTERT, E. y S. VENTURI. 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. Nov. Zool. 16:159-267

HUSSEY, R.L. 1916. Notes on some spring birds of La Plata. Auk 33:384-399.

IHERING, H.V. y R.V. IHERING, 1907. Catalogos da fauna brazileira, vol. 1 Museu Paulista, Sao Paulo, Brasil.

LYNCH ARRIBALZAGA, E. 1878. Rápida ojeada sobre la fauna del Baradero. Natural. Argent. 1:242-248.

NAROSKY, S. y A. DIGIACOMO. (En prep.). Manual de la Avifauna Bonaerense.

NAROSKY, S., R. FRAGA y M. DE LA PEÑA, 1983. Nidificación de las Aves Argentinas,

(Dendrocolptidae y Furnarii dae). Asoc. Ornit. del Plata, B. Aires.

PEREYRA, J.A. 1923. Lista de las aves colectadas. Hornero 3:161-174.

-. 1934. El nido del Federal *Amblyramphus holosericeus*. Hornero 5:384-386.

-. 1937. Viaje al paraíso de nuestras aves acuáticas. Hornero 6:466-476.

-. 1938. Aves de la Zona Ribereña Nordeste de la Provincia de Buenos Aires. Mem. Jard. Zool. La Plata 9: 1-305.

SCLATER, P.L. 1890. Catalogue of the birds in the British Museum Vol. 15, London.

SCLATER, P.L. y O. SLAVIN, 1868. List of birds collected at Conchitas, Argentine Republic, by Mr. William H. Hudson. Proc. Zool. Soc. London, 1868: 137-146.

** Onsari 1330, 1875 Wilde, Buenos Aires, Argentina.



NUEVOS REGISTROS DE

ACCIPITER POLIOGASTER EN MISIONES*

* Juan Carlos Chebez (**) y Alejandro Giraudó (***)

La primera mención para territorio argentino de esta especie es la de Bertoni (1904) quien lo clasifica como *Accipiter mirandollei* (Schl.) y comenta: "Cacé una pareja, la única que he visto, en Puerto Bertoni (Paraguay); sus modales y vuelo me parecieron de *Astur* como su aspecto general. A uno le vi venir de la costa argentina". La localidad de Puerto Bertoni se halla sobre el Alto Paraná, frente a Puerto Península en el departamento misionero de Iguazú y ligeramente al sur de Puerto Iguazú. En un trabajo posterior Bertoni (1907) reconoce a *Accipiter pectoralis* y *Accipiter mirandollei* como sinónimos de *Accipiter poliogaster* después de capturar en el mismo sitio (Pto. Bertoni) las tres formas, opinión que repite en un trabajo posterior indicando para Argentina a *Accipiter*

pectoralis, como hembras o machos jóvenes de *Accipiter poliogaster* (Bertoni 1913). Pero el primer ejemplar de procedencia argentina confirmada es el macho capturado por F.M. Rodríguez en agosto de 1912 en Santa Ana (Dabbene 1913 y 1918). Posteriormente, recién Gial (1951) comunica dos ejemplares más de Bajo Uruguay (40 km al este del Paraná y 31 km al este de Pto. Bemberg -o Pto. Libertad- respectivamente). Asigna uno de ellos a *Accipiter pectoralis* (Drapiez 1838). Partridge (1961) vuelve a estudiar dichos ejemplares concluyendo que los azores hasta entonces clasificados como *Accipiter pectoralis* corresponden en realidad a juveniles de *Accipiter poliogaster*, tal como sostuviera Bertoni (1913), y por lo tanto debe considerarse el nombre de