

OLROG, C. 1985. Status of wetforest raptors in northern Argentina. Conservation Studies on Raptors. ICBP Tech. Publ. N° 5: 191-204, Cambridge, Gran Bretaña.

PARTRIDGE, W. H. 1961. *Accipiter pectoralis*, a synonym of *Accipiter poliogaster*. Condor 63: 505-506.

(*) Recibida dic. 1989.

(**) Administración de Parques Nacionales. Santa Fe 690 - (1065) Capital Federal.

(***) Rincón 1868 - Barrio Gral. Paz, (5000) Córdoba.



AGUILA SOLITARIA EN JUJUY *

Edith A. Schaab**

El águila solitaria (*Harpyhaliaetus solitarius*) se distribuye desde el oeste de Méjico hasta el NO de la Argentina (Blake 1977). Las citas de esta especie para nuestro país corresponden a la provincia de Salta: Hoy (1969) la cita por primera vez en Orán; posteriormente fue observada por Contino en la localidad de Rivadavia, en 1974 (Olrog 1979).

La presencia del águila solitaria en el Parque Nacional Calilegua sumaría la provincia de Jujuy a la distribución de la especie en la Argentina. El 30 de junio de 1989, al mediodía, se observó un ejemplar de *Harpyhaliaetus solitarius* volando bajo sobre el río Aguas Negras, a unos 3 km de su confluencia con el San Lorenzo (600 snm). El ambiente está constituido por selvas de transición. El ave aleteaba pesadamente y su plumaje negro brillaba con iridiscencia cobriza. Las alas eran anchas y redondeadas. La cola en abanico era notablemente corta con respecto al cuerpo y estaba cruzada por una faja blanca y ápice delgado del mismo color. Emitía un silbido de tres sílabas, dos cortas y la última prolongada. La observación fue realizada en compañía de

Mariana Madueño, Monika Reti y Valeria Vergara.

Internacionalmente se le asigna a la especie el estatus de Insuficientemente Conocida (Maybourg 1986) ■

BIBLIOGRAFÍA

BLAKE, E. R. 1977. Manual of Neotropical Birds. Vol. 1. The University of Chicago Press.

HOY, G. 1969. *Harpyhaliaetus solitarius*, un águila nueva para la Argentina. Neotropica 25(48).

MAYBOURG, B. 1986. Threatened and Near Threatened Diurnal Birds of Prey of the World.

OLROG, C.C. 1979. Nueva Lista de la Avifauna Argentina. Opera Lilloana 27, Tucumán.

* Recibida nov. 1989.

** Godoy Cruz 3208.

(1425) Cap. Fed.

N. de R.: Bettinelli (en prep) tiene también registros de esta especie en la misma localidad.



PRESENCIA EN LA ESCONDIDA (CHACO) DEL MILANO CHICO *

Enrique E. Utgés**

La localidad de La Escondida (depto. General Donovan) se encuentra a 4 km de la ruta N° 16, y a 65 km de Resistencia, en la provincia del Chaco. El clima es algo menos húmedo que a la vera del Paraná.

El 4 de abril de 1976, en horas de la mañana, se observó un ejemplar del milano chico

(*Gampsonyx swainsoni*), posado a unos 10 m de altura en un urunday, situado al costado de un camino que atraviesa una laguna. El árbol en el que estaba, junto a otro cercano, eran los únicos remanentes del bosque original, pues la zona está muy modificada.

El ave fue abatida e ingresada a las colec-

ciones del Museo de Historia Natural de San Rafael (Mendoza). Era un macho, y su tubo digestivo estaba totalmente vacío.

Medidas. Ala desplegada: 220 mm. Envergadura: 540 mm. Largo total 220 mm.

Partes desnudas. Iris: rojo. Pico: negro mate con pequeña cera grisácea. Patas: amarillo anaranjado ■

* Recibida oct. 1989.

** H. Yrigoyen 4050
(3503) Barranqueras, Chaco.

N. de R.: Si bien los datos que comunica nuestro consocio Utgés pueden resultar de interés dada la relativa escasez de la especie, consideramos que debe evitarse la captura con fines de identificación de aves que como ésta tienen rasgos notorios que permiten su reconocimiento en vida.



RECUPERACION DE UN AGUILUCHO LANGOSTERO ANILLADO EN RIO NEGRO*

Daniel Paz**

Río Negro se ha considerado como el límite austral de distribución del aguilucho langostero, *Buteo swainsoni* (Olrog 1979). Dado el interés que despierta en la actualidad el esclarecimiento de la ruta migratoria de esta rapaz, doy a conocer un registro que puede aportar nueva información.

El 29 de marzo de 1987, mientras recorría el área cercana a la Reserva de lobos marinos de Punta Bermeja (41°8'S; 63°4'W) en la costa atlántica rionegrina, a 30 km de la desembocadura del río Negro, encontré dentro de un tanque australiano, enterradas en el barro, las patas ya descarnadas de un ave rapaz. Tenían un anillo metálico con el número 987-45936 y otro de plástico azul con la inscripción "zl" en bajo relieve blanco.

Tras enviar los datos al Bird Banding Laboratory, dependiente del U.S. Fish and Wildlife Service y del Canadian Wildlife Service,

se me informó que pertenecían a un aguilucho langostero, anillado por el Dr. Josef Schmutz en el nido, en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, el 6 de agosto de 1986. El mismo Schmutz (in litt.) me confirmó luego la información.

El material se encuentra depositado en la Subdirección de Fauna de la provincia de Río Negro.

Agradezco la corrección del manuscrito a Nicolás Oporto y Cecilia Vinci ■

BIBLIOGRAFÍA

Olrog, C. C. 1979.
Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27. Tucumán.

* Recibida ene. 1990.

** Belgrano 544 - (8500) Viedma, Río Negro.

COMENTARIO BIBLIOGRAFICO

LA SELVA MISIONERA —I— Texto: Juan Carlos Chébez. Ilustraciones: Marcelo Betinelli - 36 pág.

La Selva Misionera —II— Texto: Juan Carlos Chébez. Ilustraciones: Aldo Chiappe - 48 pág.

En 1988 apareció el primer fascículo de "La selva misionera", y dos años después, en 1990, el segundo. El objetivo fue complementar los afiches educacionales que sobre el mismo tema editara la Fundación Vida Silvestre Argentina, formando de ese modo un con-

junto de elementos didácticos, con una sola finalidad. La forma de distribución se realiza a través de las escuelas de Misiones y su área de influencia, tan faltas de material informativo adecuado. Por otro lado, están destinados a una población que imperiosamente debe interpretar los procesos ecológicos, ya que es a ella más que a nadie a la que, al quitarle la selva, la incluyen en un proceso de pauperización irreversible, al carcomer las entrañas de una provincia de incommensurable riqueza biótica.

"La selva misionera" I y II, es complementa-