



NUEVAS AVES PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES*

Por Hernán G. Fernández **

En diversas salidas de campo observé varias especies aún no mencionadas para la provincia (Olrog 1979, Narosky e Yzurieta 1987), y que detallo a continuación:

Picumnus cirratus - Carpintero común.

El 11 de octubre de 1989 observé en la localidad de Ramallo, en el partido homónimo, a una hembra de esta especie que tamboreaba con supico sobre pequeños talas (*Celtis tala*) y barbas de chivo (*Caesalpinia gilliesii*) en los bosques de la barranca. Al día siguiente hallé un macho en idéntico hábitat, trepando arbustos de *Sesbania punicea*.

Todirostrum margaritaeiventer - Titirijí ojo dorado.

El 12 de octubre y el 9 de noviembre

de 1989 registré en la localidad citada, a un ejemplar de esta especie en la barranca boscosa. Se desplazaba capturando insectos en la parte inferior del follaje de los árboles, a no más de cuatro metros de altura, mientras emitía un canto fuerte y característico.

Saltator similis - Pepitero verdoso.

Observé un ejemplar de esta especie en el Refugio Educativo Rivera Norte, en el partido de San Isidro, los días 14 y 28 de mayo, 4 de junio y 3 de julio de 1988. Se movía entre ceibos (*Erythrina crista-galli*) y sauces (*Salix sp.*). La frecuencia relativamente baja con que esta ave es comercializada para jaula me hace pensar que es improbable que el observado fuera un individuo escapado. Esta presunción es reforza-

da por el hecho de que las citas más australes son las de Abadie (1988) para Ceibas (Entre Ríos) y Villa Constitución (Santa Fe), no lejos de la frontera con Buenos Aires.

BIBLIOGRAFIA

ABADIE, E. 1988. Observaciones sobre aves del sur de Entre Ríos. *Nuestras Aves* 15: 9-10.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay, Asoc. Orn. del Plata, Buenos Aires.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27, Tucumán.

* Recibida diciembre 1989.

** San Lorenzo 3201, 1651 San Andrés, Buenos Aires.



NOTAS SOBRE LA NIDIFICACION DE LA PAVA DE MONTE (*PENELOPE OBSCURA*)*

Por Sergio A. Salvador **

En general es poco lo que se conoce sobre la nidificación del género *Penelope* (Delacour y Amadon 1973), no encontrándose datos en esta obra sobre *P. obscura*, ni en los trabajos de Dabbene (1972) y Escalante (1983).

Venturi (en Hartert y Venturi 1909), menciona haber hallado tres nidos en Chaco, que estaban en el extremo de largas ramas de quebracho colorado, a más de 10 m de altura, pero no pudo obtener los huevos. Posteriormente Césari y Domínguez Alonso (1975), comentan que en el Delta bonaerense la especie construye nidos perfectamente escondidos en madre selvas, a 3 m de altura y su forma recuerda a una palangana, teniendo 60 cm de diámetro externo.

En la colección oológica del Instituto Miguel Lillo hay dos nidadas de esta especie. La primera, de 3 huevos (uno roto) fue coleccionada por S. Pierotti en San Pedro de Colalao (1800 metros sobre el nivel del mar) Tucumán, en diciembre de 1957; el nido estaba en un aliso (*Alnus*) a 8 m de altura. Los huevos son de forma algo alargada y color blanco crema; tienen la cáscara rugosa pero no tanto como los de *Ortalis canicollis*; miden 69,0 x 55,7 y

73,3 x 53,5 mm. La segunda nidada consta de un solo huevo, con una inscripción que dice: "Pava de monte (7-10-63)", sin datos de localidad ni colector. Este huevo es de forma y color similares a los anteriores y mide 79,3 x 49,4 mm.

Claes Olrog (*in litt*, 1985) rescata información sobre 3 nidos hallados en el noroeste:

1) Encontrado por C. Olrog y O. Budin en las cercanías del río de las Piedras, a 20 km al oeste de Orán, Salta, el 12 de diciembre de 1949. El nido, al parecer con huevos, estaba en la ramificación de una gruesa rama, a 4 m de altura. Un individuo salió rápidamente del mismo tirándose al suelo, arrastrando consigo varias plumas y ramitas.

2) Hallado por S. Pierotti en Trancas, Tucumán, el 26 de octubre de 1954. El nido estaba oculto en una planta de caraguatá en un aliso (*Alnus*). Contenía 2 huevos.

3) Hallado por C. Olrog y F. Contino en el Cerro de Santa Bárbara (2000 m sobre el nivel del mar), Jujuy, el 23 de noviembre de 1968. El nido estaba ubicado entre un grueso tronco de aliso (*Alnus*) y una mata de caraguatá, muy

bien oculto a 5 m de altura. Contenía 2 huevos.

Agradezco al extinto Dr. Claes C. Olrog por su valiosa información. A Juana B. de Herrera, Estela Alabarce y María M. Lucero por su colaboración y por permitir al autor trabajar con las colecciones del Inst. Miguel Lillo.

BIBLIOGRAFIA

CESARI, C. y P. DOMINGUEZ ALONSO. 1975 Presencia en el delta bonaerense de la pava de monte común *Penelope obscura*, *obscura*, Temminck. *Hornero* 11: 307-08.

DABBENE, R. 1972. Las aves de caza. (Recop. de los artículos en la Rev. La Diosa Cazadora por el Dr. R. Magnelli Ferrari). Edit. Albatros, B. Aires.

DELACOUR, J. y D. AMADON. 1973. Cuckoos and related birds. *Amer. Mus. Nat. Hist.*, New York.

ESCALANTE, R. 1983. Catálogo de las aves uruguayas. 3ª parte. Galliformes y Gruiformes. Intendencia Municipal de Montevideo.

HARTERT, E. y S. VENTURI. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novit. Zool.* 16: 159-267.

* Recibida marzo 1990.

** Bv. Sarmiento 698- (5900) Villa María, Córdoba.