

escuché frecuentemente, e incluso los atraje mediante grabaciones. La especie también es conocida para el este del Paraguay y otros observadores de aves me comentaron haberla visto en el P. N. do Iguazu (Brasil).

**Campylorhynchus turdinus.** **Ratona Grande.** El 27 de noviembre de 1988 vi y grabé una pareja de esta especie, en un palmar abierto de *Copernicia alba* en la Seccional Puesto Algarrobo del P. N. Pilcomayo, Formosa. Respondieron vigorosamente al "playback" con su voz inconfundible. Una copia de esta grabación fue entregada a la A.O.P. La especie es conocida por lo menos hasta el NE del Paraguay.

**Thraupis palmarum.** **Celes-tino Oliváceo.** Ocasionalmente vi a este frutero en los alrededores del Hotel Cataratas en Foz de Iguazú, Brasil, y el 20 de julio de 1989 John Mc Donald vio un individuo en la copa de los árboles bajo las pasarelas del Hotel Internacional (lado argentino). John está muy familiarizado con esta ave común y de amplia distribución, por lo que considero la identificación absolutamente confiable.

\*Recibida nov. 1990.

\*\* 91 South Road, East Kingston, NH 03827, EE.UU.


\*\*\*

Esta interesante contribución menciona por primera vez para la Argentina a la familia *Oxyruncidae*, integrada por esta única especie: *Oxyruncus cristatus* (Swainson 1821), a la que se conoce en Brasil con los nombres de "Araponguinha" -es decir Araponga (*Procnias nudicollis*) pequeño -"chibante",

en tanto que en inglés se la denomina Sharpbill lo que equivale a picoagudo. Precisamente ese es uno de los caracteres que facilitan su identificación. Esta familia se ubica modernamente luego de los Cotingidae, pero algunos autores la consideraron una subfamilia de los Tyrannidae. Sick (1985) incluye la especie entre los Cotingidae, por lo que sé que su ubicación taxonómica requiere mayores estudios. En el Brasil era conocida la especie por cuatro poblaciones disjuntas: una vecina a las Guayanas, otra en la boca del Amazonas, otra en el nordeste y la del sudeste, con registros para los Estados de São Paulo, Paraná y Sta. Catarina, desconociéndose en Rio Grande do Sul. También fue citada para el Este de Paraguay. En consecuencia era esperable su aparición en el norte misionero.

*Campylorhynchus turdinus unicolor* Lafresnaye 1846, es un troglodítico que se conocía previamente para, la Argentina por una observación de Pablo Canevari (Contreras, 1986, Historia Natural 6 (8): 75-76) efectuada también en el P. N. Pilcomayo, en la provincia de Formosa. El registro de D. Finch sería en consecuencia el segundo para el país y confirma así su presencia. La "ratona grande" ya había sido incluida en nuestra avifauna por Dabbene (1910, Ornitología Argentina, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 18: 355) para Córdoba en base a un ejemplar de esa dudosa procedencia, con el viejo nombre de *Heleodytes unicolor* (Lafresnaye 1846).

Si bien Zotta (1944) y Olrog (1959) repitieron el registro más tarde, fue eliminado en otros listados (Olrog 1963 y 1979), seguramente por considerarlo erróneo. Recién con la información de Canevari y Finch, la especie puede incluirse en forma segura para nuestro



Picoagudo *Oxyruncus cristatus*  
Fuente: "Fundamentals of Ornithology"

país. En Paraguay cuenta con varios registros (Zotta, 1940, Hornero 7: 364 y Contreras 1986). La especie es pardo grisácea con lo ventral más claro salpicado de manchas oscuras, la ceja es clara y ancha, y la garganta blancuzca. La corona también está moteada de oscuro.

*Thraupis palmarum* (Wied 1821) se distingue de su congénere *Thraupis sayaca* por su coloración general gris olivácea, las alas bicoloreadas gris oliváceas con las primarias negras y el espejo alar blanco que a veces muestra. Además el pico es más oscuro. Su distribución conocida abarcaba la mayor parte del Brasil y el este del Paraguay. En Iguazú su presencia era esperable dado que Bertoni (1919, Hornero 1: 258) la había detectado en agosto de 1917 en Pto. Bertoni, localidad paraguaya muy cercana a Iguazú. En Brasil se lo conoce como "Sanhaçu coqueiro".

J.C.Ch.



## NUEVA LOCALIDAD PARA LA CORBATITA ALA BLANCA, *SPOROPHILA LEUCOPTERA* (VIEILLOT)\*

Por Steve Loughheed\*\*

Tres ejemplares machos adultos fueron anillados con anillos metálicos del Instituto Miguel Lillo y liberados inmediatamente el 9 de noviembre de 1987 en Alpachiri (27°20'S; 65°45'W), a 17 km al oeste de la ciudad de concepción, en el sur de la provincia de Tucumán.

La captura se realizó en pajonales cercanos al bosque de transición ubicado a 650 m de altura en los pedemontes de los cordones monta-

ñosos del Aconquija.

Esta localidad aumenta notablemente hacia el oeste la distribución de esta especie, dada por Olrog (1979) para sabanas en Formosa, Chaco y norte de Santa Fe, y por Darrieu (1984) para Corrientes. Lucero (1983) no la menciona en su lista de Tucumán.

### BIBLIOGRAFIA

DARRIEU, C. A. 1984. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. II. Dos nuevos registros de *Sporophila* para la provincia.

Neotrópica 30: 161-162.

OLROG, C.C. 1979. Nueva lista de la Avifauna Argentina. Op. Lilloana. 27. Tucumán

LUCERO, M.M. 1983. Lista y distribución de las aves y mamíferos de la provincia de Tucumán. Miscelánea 75. Fund. M. Lillo. Tucumán

\* Recibida enero 1990.

\*\* Department of Zoology, University of Western Ontario, London, Ontario, Canadá N6A 5B7.