



## NUEVAS AVES PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES\*

Por Hernán G. Fernández \*\*

En diversas salidas de campo observé varias especies aún no mencionadas para la provincia (Olrog 1979, Narosky e Yzurieta 1987), y que detallo a continuación:

**Picumnus cirratus** - Carpintero común.

El 11 de octubre de 1989 observé en la localidad de Ramallo, en el partido homónimo, a una hembra de esta especie que tamboreaba con supico sobre pequeños talas (*Celtis tala*) y barbas de chivo (*Caesalpinia gilliesi*) en los bosques de la barranca. Al día siguiente hallé un macho en idéntico hábitat, trepando arbustos de *Sesbania punicea*.

**Todirostrum margaritaceiventer** - Titirijí ojo dorado.

El 12 de octubre y el 9 de noviembre

de 1989 registré en la localidad citada, a un ejemplar de esta especie en la barranca boscosa. Se desplazaba capturando insectos en la parte inferior del follaje de los árboles, a no más de cuatro metros de altura, mientras emitía un canto fuerte y característico.

**Salpator similis** - Pepitero verdoso.

Observé un ejemplar de esta especie en el Refugio Educativo Rivera Norte, en el partido de San Isidro, los días 14 y 28 de mayo, 4 de junio y 3 de julio de 1988. Se movía entre ceibos (*Erythrina crista-galli*) y sauces (*Salix sp.*). La frecuencia relativamente baja con que esta ave es comercializada para jaula me hace pensar que es improbable que el observado fuera un individuo escapado. Esta presunción es reforzada

por el hecho de que las citas más australes son las de Abadie (1988) para Ceibas (Entre Ríos) y Villa Constitución (Santa Fe), no lejos de la frontera con Buenos Aires.

### BIBLIOGRAFIA

- ABADIE, E. 1988. Observaciones sobre aves del sur de Entre Ríos. *Nuestras Aves* 15: 9-10.  
 NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay, Asoc. Ornit. del Plata, Buenos Aires.  
 OIROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Op. Lilloana* 27, Tucumán.

\* Recibida diciembre 1989.

\*\* San Lorenzo 3201, 1651 San Andrés, Buenos Aires.



## NOTAS SOBRE LA NIDIFICACION DE LA PAVA DE MONTE (*PENELOPE OBSCURA*)\*

Por Sergio A. Salvador \*\*

En general es poco lo que se conoce sobre la nidificación del género *Penelope* (Delacour y Amadon 1973), no encontrándose datos en esta obra sobre *P. obscura*, ni en los trabajos de Dabbene (1972) y Escalante (1983).

Venturi (en Hartert y Venturi 1909), menciona haber hallado tres nidos en Chaco, que estaban en el extremo de largas ramas de quebracho colorado, a más de 10 m de altura, pero no pudo obtener los huevos. Posteriormente Césari y Domínguez Alonso (1975), comentan que en el Delta bonaerense la especie construye nidos perfectamente escondidos en madreelvas, a 3 m de altura y su forma recuerda a una palangana, teniendo 60 cm de diámetro externo.

En la colección oológica del Instituto Miguel Lillo hay dos nidadas de esta especie. La primera, de 3 huevos (uno roto) fue coleccionada por S. Pierotti en San Pedro de Colalao (1800 metros sobre el nivel del mar) Tucumán, en diciembre de 1957; el nido estaba en un aliso (*Alnus*) a 8 m de altura. Los huevos son de forma algo alargada y color blanco crema; tienen la cáscara rugosa pero no tanto como los de *Ortalis canicollis*; miden 69,0 x 55,7 y

73,3 x 53,5 mm. La segunda nidada consta de un solo huevo, con una inscripción que dice: "Pava de monte (7-10-63)", sin datos de localidad ni colector. Este huevo es de forma y color similares a los anteriores y mide 79,3 x 49,4 mm.

Claes Olrog (*in litt*, 1985) rescata información sobre 3 nidos hallados en el noroeste:

1) Encontrado por C. Olrog y O. Budin en las cercanías del río de las Piedras, a 20 km al oeste de Orán, Salta, el 12 de diciembre de 1949. El nido, al parecer con huevos, estaba en la ramificación de una gruesa rama, a 4 m de altura. Un individuo salió rápidamente del mismo tirándose al suelo, arrastrando consigo varias plumas y ramitas.

2) Hallado por S. Pierotti en Trancas, Tucumán, el 26 de octubre de 1954. El nido estaba oculto en una planta de caraguatá en un aliso (*Alnus*). Contenia 2 huevos.

3) Hallado por C. Olrog y F. Contino en el Cerro de Santa Bárbara (2000 m sobre el nivel del mar), Jujuy, el 23 de noviembre de 1968. El nido estaba ubicado entre un grueso tronco de aliso (*Alnus*) y una mata de caraguatá, muy

bien oculto a 5 m de altura. Contenia 2 huevos.

Agradezco al extinto Dr. Claes C. Olrog por su valiosa información. A Juana B. de Herrera, Estela Alabarce y María M. Lucero por su colaboración y por permitir al autor trabajar con las colecciones del Inst. Miguel Lillo.

### BIBLIOGRAFIA

- CESARI, C. y P. DOMINGUEZ ALONSO. 1975 Presencia en el delta bonaerense de la pava de monte común *Penelope obscura*, *obscura*, *Temminck*. *Hornero* 11: 307-08.  
 DABBENE, R. 1972. Las aves de caza. (Recop. de los artículos en la Rev. La Diosa Cazadora por el Dr. R. Magnelli Ferrari). Edit. Albatros, B. Aires.  
 DELACOUR, J. y D. AMADON. 1973. *Currassows and related birds*. Amer. Mus. Nat. Hist., New York.  
 ESCALANTE, R. 1983. Catálogo de las aves uruguayas. 3ª parte. Galliformes y Gruiformes. Intendencia Municipal de Montevideo.  
 HARTERT, E. y S. VENTURI. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novit. Zool.* 16: 159-267.

\* Recibida marzo 1990.

\*\* Bv. Sarmiento 698- (5900) Villa María, Córdoba.