

OBSERVACIONES DE CAMPO



¿*Numenius borealis* en Córdoba?*

por Pablo Luis Michelutti**

Durante un recorrido de control por la costa SO de la laguna Mar Chiquita, provincia de Córdoba (30° 54' S, 62° 46' W) que realicé el sábado 13 de octubre de 1990, observé cuatro playeros cuya fisonomía concordaba con la de *Numenius borealis* (chorlo polar).


Tenían el tamaño de *Tringa melanoleuca*, aunque eran algo más rechonchos. Presentaban dorsal pardo oscuro, garganta clara, pico negro, con suave curvatura más acentuada hacia la punta; patas negras, ceja clara, "babero" barreado, pecho gris y vientre claro. Se mostraban sumamente ariscos; al acercarme, levantaron vuelo hacia el oeste.

Se encontraban en una playa arenosa y levemente ondulada de la laguna, por la que corre un chorrillo formado por una perforación próxima. Había en el lugar otras especies de playeros y chorlos con las cuales pude compararlos: *Tringa flavipes*, *Tringa melanoleuca*, *Himantopus mexicanus*, *Vanellus chilensis*, *Phalaropus tricolor*, *Micro-*

palama himantopus
y *Calidris fuscicollis*.

* Recibida
abril 1991

** Guardaparque provincial. Tucumán 296, 5143 Miramar, Córdoba.



Numenius borealis. Dibujo Pablo Luis Michelutti

N. de R.:

Pese a que pueden presentarse dudas con respecto a la identidad específica de los escolopácidos citados en esta sucinta comunicación, nos ha parecido acertado publicarla, con la esperanza de que su difusión contribuya a esclarecer la eventual presencia en la Argentina de una especie considerada extinta por largo tiempo. El autor es

poseedor de reconocida capacidad de observación, ganada a través de años de experiencia como guardaparque en la zona. No obstante, creemos que serán necesarios más registros, en lo posible con captura incruenta o fotografías, para confirmar su identificación.



Hallazgo de *Hylocharis chrysur* en Necochea, Buenos Aires*

por Miguel A. Fiameni**

El 16 de junio de 1989 se observó un ejemplar de picaflor bronceado (*Hylocharis chrysur*) en el área urbana de Necochea, partido homónimo, provincia de Buenos Aires. Buscaba alimento entre las flores anaranjadas de una bignonia (*Pyrostegia venusta*), en el jardín de una vivienda, permitiendo una detallada observación.

Con este hallazgo se señala una localidad alejada de la distribución conocida de la especie, que, según diversos autores (Pereyra 1938, Narosky 1978), comprende la zona noreste de la provincia. Además, se confirma su presencia invernal en la región, ya mencionada por Pereyra (1923, 1938), y estudiada por Montaldo (1984), ambos en otras zonas de la provincia.

En Necochea se han registrado otros cuatro picafloros: *Chlorostilbon aureovenstris*, habitual visitante estival; *Leucochloris albicollis*, que reside todo el año; *Patagona gigas*, observado una vez en otoño (Fiameni 1986), y *Sephanoides galeritus*, que aparece como visitante invernal (Fiameni 1987).

BIBLIOGRAFIA

FIAMENI, M. A. 1986. Presencia del picaflor gigante en Necochea, Buenos Aires. *Nuestras Aves* 10: 14-15.

—. 1987. Registro del picaflor cabeza granate en Necochea, Buenos Aires. *Nuestras Aves* 12: 14-15.

MONTALDO, N. H. 1984. Asociación de dos especies de picafloros con árboles

del género *Eucalyptus* (Myrtaceae) en la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 12: 159-162.

NAROSKY, T. 1978. *Aves Argentinas. Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense*. Asoc. Ornit. del Plata, B. Aires.

PEREYRA, J. A. 1923. *Aves de la región ribereña de la provincia de Buenos Aires*. *Hornero* 3: 159-174.

—. 1938. *Aves de la región ribereña noreste de la provincia de Buenos Aires*. *Mem. Jard. Zool. La Plata* 9: 1-304.

* Recibida noviembre 1989.

** Calle 6, Nº 4388, 7630 Necochea, Buenos Aires.