


## REGISTRO NOVEDOSO



## PRIMER REGISTRO DEL PICAFLOR VIENTRE NEGRO (Anthracothorax nigricollis) EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA

FIRST RECORD OF THE BLACK-THROATED MANGO (Anthracothorax nigricollis) IN THE PROVINCE OF SANTA FE, ARGENTINA

## Eduardo L. Beltrocco<sup>1,2</sup>\* & Pablo H. Capovilla<sup>3,4</sup>

- <sup>1</sup>Club de Observadores de Aves Celestino
- <sup>2</sup>Agrupación Pay Zumé. Sarmiento 1978, Santo Tomé (3016), Santa Fe, Argentina
- <sup>3</sup>Museo de Ciencias Naturales del Departamento San Cristóbal, H. Irigoyen y Dr. Gerónimo Lassaga, San Cristóbal (3070), Santa Fe, Argentina
- <sup>4</sup>Club de Observadores de Aves Chororó

**RESUMEN:** Presentamos el primer registro documentado de Picaflor Vientre Negro (*Anthracothorax nigricollis*) para la provincia de Santa Fe, en la Reserva Natural Urbana del Oeste de la Ciudad de Santa Fe.

PALABRAS CLAVE: Trochilidae, observación, distribución

**ABSTRACT:** Here we report the first documented record of the Black-throated Mango (*Anthracothorax nigricollis*) in the province of Santa Fe, in the Reserva Natural Urbana del Oeste of the City of Santa Fe.


KEYWORDS: Trochilidae, observation, distribution

El Picaflor Vientre Negro (Anthracothorax nigricollis) es una especie de ambientes semi-abiertos, palmares, sabanas, como bordes de selva, selva ribereñas y sabanas arboladas. Su distribución es en gran parte de América del Sur tropical no andina, desde Panamá y Venezuela hasta el este de Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y noreste de Argentina (Povedano & Maugeri 2020). En nuestro país, abarca las provincias de Misiones (Pereyra 1950; Giraudo et al. 1993; Navas & Bó 1993; Chebez 1996; Krauczuk 2005; Krauczuk & Castía 2009; Militello & Chebez 2009; Bodrati et al. 2010; Martínez Gamba 2014), Formosa (Nores & Yzurieta 1981; Narosky 1983; Contreras 1987; Narosky & Mar-

telli 1995; Di Giacomo 2005; Contreras et al. 2014), Chaco (Herrera 1988; Bertonatti & Heinonen Fortabat 1988; Chatellenaz 2005), Corrientes (Esteban 1953; Chatellenaz et al. 2010), Entre Ríos (Areta et al. 2004; Marateo et al. 2009), y para el noroeste un único registro en la provincia de Salta sin evidencia (Moschione et al. 2014). El 19 de julio de 2022 registramos una hembra de Picaflor Vientre Negro adulta en la Reserva Natural Urbana del Oeste, ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, provincia de Santa Fe (Fig. 1; 31°36'S, 60°43'O; 14 msnm; eBird: S115382749). La misma estaba posada en un Ceibo (Erythrina crista-galli) sobre el canal aledaño al reservorio N° 4 y el

<sup>\*</sup>elbeltrocco@gmail.com

sendero principal de la Reserva. En dos momentos de la mañana (9:27 y 10:12 h) la observamos perchada y acicalándose en ramas expuestas del Ceibo. Al volar, la hembra capturaba insectos en el aire y se volvía a perchar. Al día siguiente, la observamos a las 9:12 h sobre el mismo sendero, pero metros más adelante, también sobre una rama de Ceibo. Este registro es el primero documentado para la provincia de Santa Fe (De la Peña 2020) y se suma como otra aparición extralimital de la especie en el país. Aún se sabe poco sobre los movimientos naturales del Picaflor Vientre Negro en Argentina. Sus apariciones más australes se dieron en la provincia de Entre Ríos. Según Areta et al. (2004), en el Parque Nacional El Palmar, Areta observó una hembra los días 21 y 22 de septiembre de 1999, v Grilli observó otra hembra el 19 de septiembre de 2002. El 2 de agosto un macho fue observado por Bodrati en cercanías de Gualeguaychú, depto. Homónimo, y el 8 de mayo de 1994 otro macho registrado por el mismo observador en el arroyo Sagastume, Villa Paranacito, dpto. Islas del Ibicuy (Areta et al. 2004). Cabe destacar que los registros mencionados se dieron en la cuenca del río Uruguay, siendo el registro de Santa Fe la evidencia más austral de la especie en el valle de inundación del Río Salado, en la cuenca del Río Paraná, hasta el momento única evidencia en afluentes del Paraná medio. Este dato suma información a la posible expansión o bien movimientos aún no definidos de la especie en Argentina.



**Figura 1:** Hembra de Picaflor Vientre Negro (*Anthracothorax nigricollis*) observada el 19 de julio de 2022 en la Reserva Natural Urbana del Oeste de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, Santa Fe, Argentina. Fotografía: Beltrocco E.

## REFERENCIAS

- ARETA JI, BODRATI A & GRILLI P. (2004). Primeros registros del picaflor vientre negro (Anthracothorax nigricollis) en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Nuestras Aves. 48: 20-21
- BERTONATTI C & HEINONEN FORTABAT S. (1988). Dos especies nuevas para la provincia del Chaco, República Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 14: 1-3
- BODRATI A, COCKLE K, SEGOVIA JM, ROESLER I, ARETA JI & JORDAN E. (2010). La avifauna del Parque Provincial Cruce Caballero, Provincia de Misiones, Argentina. *Cotinga*, 32: 41-64
- CHATELLENAZ ML. (2005). Aves del Valle del Río Paraná en la Provincia del Chaco, Argentina: riqueza, historia natural y conservación. Insugeo, *Miscelánea*, 14: 527-550
- CHATELLENAZ ML, CANO P, SAIBENE C & BALL HA. (2010). Inventario de las aves del Parque Nacional Mburucuyá (provincia de Corrientes, Argentina). *Acta Zoologica Lilloana*, 54: 139-160
- CHEBEZ JC. (1996). Fauna misionera, catálogo sistemático y zoogeográfico de los vertebrados de la provincia de Misiones (Argentina). Monografía Nº 5. L. O. L. A. Buenos Aires
- CONTRERAS JR. (1987). Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Formosa, República Argentina. *Historia Natural* VII. 4: 33-52
- CONTRERAS JR, AGNOLIN F, DAVIES YE, GODOY I, GIACCHINO A & RÍOS E. (2014). Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina. 1º Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación de Historia Natural Félix de Azara
- DE LA PEÑA MR. (2020). Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (Actualización) Columbidae a Trochilidae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino* (Nueva Serie), 6: 1-348
- DI GIACOMO AG. (2005). Aves de la Reserva El Bagual. En Di Giacomo, A. G. y S. F. Krapovickas (Eds.). Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, provincia de Formosa, Argentina. Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área del Chaco Húmedo. *Temas de Naturaleza y Conservación*, 4: 201-465
- ESTEBAN JG. (1953). Nuevas localidades para aves argentinas. *Acta Zoologica Lilloana*, 13: 349-362
- GIRAUDO AR, BALDO JL & ABRAMSON RR. (1993). Aves observadas en el sudeste, centro y este de Misiones (República Argentina), con la mención de especies nuevas o poco conocidas para la provincia. *Nótulas Faunísticas*, 49: 1-13
- HERRERA GA. (1988). Primeros registros para la provincia del Chaco del Picaflor de vientre negro

- Anthracothorax nigricollis y de Corbatita colorada Sporophila hypochroma. Garganchillo, 8: 7-9
- KRAUCZUK ER. (2005). Aves do Inta-Campo Anexo ao Zaiman, e do Campus da Universidade Nacional de Misiones, Posadas, Misiones, Argentina. *Atualidades Ornitológicas*, 126: 1-22
- KRAUCZUK ER & CASTÍA F. (2009). Notes on geographic distribution of three birds species in Misiones province, Argentina. *Atualidades Ornitológicas* On-line, 151
- MARTÍNEZ GAMBA R. (2014). Lista de aves del Parque Natural Municipal Monte Seguín, Provincia de Misiones, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, Segunda Serie, 163: 1-10
- MARATEO G, POVEDANO H & ALONSO J. (2009). Inventario de las aves del Parque Nacional El Palmar, Argentina. *Cotinga*, 31: 47-60.
- MILITELLO E & CHEBEZ JC. (2009). Notas sobre aves del Parque Nacional Iguazú y zona de influencia, Misiones, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, Segunda serie, 32: 1-5

- MOSCHIONE F., SPITZNAGEL O. & GONZÁLEZ M. (2014). Lista de aves de Salta. Ministerio de cultura y turismo. Gobierno de la Provincia de Salta
- NAVAS JR & BÓ NA. (1993). Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. V. (Adenda) Revista Museo Argentino de Ciencias Naturales, *Zoología*, 16: 37-50
- NAROSKY S. (1983). Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. *Hornero*, 12: 122-126
- NAROSKY T & MARTELLI A. (1995). Una nueva visita al este de Formosa. *Nuestras Aves*, 31: 28-29.
- NORES M & YZURIETA D. (1981). Nuevas localidades para aves Argentinas. *Historia Natural* 2: 33-42
- PEREYRA JA. (1950). Las aves del territorio de Misiones. Anales del Museo Nahuel Huapí Perito Francisco P. Moreno, Buenos Aires, 2: 1-40
- POVEDANO HE & MAUGERI FG. (2020). Picaflores en Argentina y Sudamérica: historia natural y biodiversidad. Volumen 1