

# Nidificación del Tuquito Gris (*Empidonomus aurantioatrocristatus*) en el sur de Buenos Aires

Carolina Belenguer y Sebastián Di Martino

Pueyrredón 116 - 8000, Bahía Blanca, Buenos Aires

El 23 dic 1990, en el Salitral de la Vidriera (a unos 40 km de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires) hallamos un nido de Tuquito Gris con tres pichones. El área pertenece a la provincia fitogeográfica del Espinal, distrito del Caldén (Cabrera 1976), con bosque xerófilo, bajo y pobre en especies, como vegetación dominante. Las principales especies del estrato arbóreo son el caldén (*Prosopis caldenia*) y el chañar (*Geoffroea decorticans*); en el estrato herbáceo, dominan las gramíneas rizomatosas como *Panicum* sp. y *Sporobolus* sp., y quenopodiáceas crasas. El nido, semiesférico, fue construido con palitos y revestido de raíces y tallos pequeños de gramíneas en un chañar a 1,70 m de altura. Diámetro: 10 cm; profundidad, 3 cm.

El 17 feb 1991 regresamos al lugar y hallamos el nido semidestruido, y a dos juveniles en actitud de ser aún alimentados.

Narosky *et al.* (1990) mencionan la probable nidificación de la especie en el sur de la provincia, siendo al parecer nuestro registro el primer dato concreto al respecto.

## BIBLIOGRAFIA

CABRERA, A. 1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. ACME, Buenos Aires.

NAROSKY, S., A. G. DI GIACOMO y B. LOPEZ LANUS. 1990. Notas sobre aves del sur de Buenos Aires. Hornero 13: 173-178.

Recibida diciembre de 1991.

---

---

## Nuevos registros del Aguila Viuda (*Spizastur melanoleucus*) en Argentina

Eduardo R. De Lucca

Coordinador Grupo de trabajo Rapaces Argentinas.  
Asociación Ornitológica del Plata. 25 de Mayo 749,  
2º Piso "6" - 1002, Buenos Aires.

| Fecha       | Observador                                 | Localidad / Provincia    |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| nov 1989    | A. Johnson                                 | Pto. Iguazú / Misiones   |
| dic 1990    | A. Bosso<br>S. Heinonen y<br>A. Giraudó    | P.N. Calilegua / Jujuy   |
| 4 ago 1991  | A. Di Giacomo                              | P.N. Calilegua / Jujuy * |
| 12 ago 1991 | A. Di Giacomo y<br>G. Gil                  | P.N. Calilegua / Jujuy * |
| 15 ago 1991 | M. Babarskas<br>J. Veiga y<br>F. Filiberto | P.N. El Rey / Salta *    |
| 21 oct 1991 | B. Whitney                                 | P.N. Iguazú / Misiones   |

\* Observaciones realizadas en el marco del convenio AOP - APN, para el relevamiento ornitológico de los Parques Nacionales.

En los últimos meses, varios naturalistas me han comunicado personalmente registros visuales de esta especie, citas que se presentan a continuación. En todos los casos se observó un solo individuo.

Estas comunicaciones se suman a las ya compiladas y publicadas por el autor (De Lucca 1990). Así, este águila se constituye en el águila crestada selvática más observada en la última década en nuestro país.

Agradezco a los naturalistas que han proporcionado desinteresadamente sus observaciones, haciendo posible la redacción de esta nota.

## BIBLIOGRAFIA

DE LUCCA, E. R. 1990. Registros recientes del águila blanquinegra para la Argentina. Nuestras Aves 23: 25-26.  
Recibida diciembre de 1991