

CONTRERAS, J.R. 1981. Lista preliminar de la avifauna correntina. I. No Passeriformes. Hist. Nat. 2: 21-28.

- 1987. Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Formosa, República Argentina. Hist. Nat. 7: 33-52.

LUTI, R., M. SOLIS, F. GALERA, N. FERREYRA, M. BERZAL, M. NORES, M. HERRERA y J. BARRERA. 1979. Geografía Física de la Provincia de Córdoba. VI, Vege-

tación. J. Vázquez, R. Miatello, M. Roqué. Ed. Boldt. Argentina. pp. 297-367.

NORES, M. y D. YZURIETA. 1980. Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina. Sec. de Estado de Agric. y Ganad. Córdoba.

NORES, M.; D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las Aves de Córdoba, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cs. Cba. 56: 1-114.

OLROG, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna Argentina. Opera Lilloana. 27: 1-324.

* Recibida enero de 1992

** Cátedra de Zoología II (Vertebrados). Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Avda. Vélez Sársfield 299, (5000) Córdoba.



Cardenilla en la laguna de Los Padres, Buenos Aires*

Por Juan Núñez Chas y Miguel Sorensen**

En la bibliografía reciente (Narosky y Yzurieta 1987, Ridgely y Tudor 1989) se da como límite austral de distribución de la Cardenilla (*Paroaria capitata*) el norte de la provincia de Buenos Aires. Nores (1986) comunica el registro, aparentemente extralimital, de un individuo en Viedma, provincia de Río Negro.

El 24 abr 90, en la Laguna de los Padres, pdo. de Gral. Pueyrredon, a unos 20 km de la ciudad de Mar del Plata, observamos siete individuos de esta especie, tanto adultos como juveniles. En el mismo sitio la observaron M. Fugassa (com. pers.) unos meses antes, y R. Ymbernon el 17 ene 87, criando pichones en la copa

de un sauce criollo (*Salix humboldtiana*). El mismo observador también halló la especie en la estancia La Peregrina, muy cerca de la laguna La Brava, pdo. de Balcarce.

Por último, en la colección del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata, se encuentra una piel de esta especie (nº PC 176), obtenida el 25 abr 88 en dicha ciudad por J. V. Schactel.

La información de esta nota permitiría confirmar la ampliación de la distribución de la Cardenilla en Buenos Aires.

Agradecemos a R. Castillo (del museo L. Scaglia), a M. Fugassa y a R. Ymbernon sus datos, así como al

Grupo Ornitológico del Sudeste Bonaerense (LARUS) por su colaboración ●

BIBLIOGRAFIA

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

NORES, M. 1986. Nuevos registros para aves de Argentina. Homero 12: 304-307.

RIDGELY, R. S. y G. TUDOR. 1989. The Birds of South America: I The Oscines Passerines. Univ. of Texas Press, Austin.

* Recibida junio de 1991.

** España 2052 3º B, 7600 Mar del Plata.



Hallazgo extralimital del Burrito Pico Rojo

Neocrex erythrops olivascens *

Por Aníbal R. Camperi **

El Burrito Pico Rojo (Fam. Rallidae) tiene una distribución conocida en la Argentina que abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Chaco.

La primera cita para Tucumán corresponde a Lillo (1902), quien la menciona para San Miguel de Tucumán; a ésta se suman las de Wetmore (1926) para Tapia, y de Navas (1991) para Tañá Viejo y Concepción, quien además menciona, por primera vez, una localidad salteña para esta raza: Orán.

Olog (1958) la registra por primera vez para Jujuy, citándola para Yuto y San Salvador de Jujuy. Salvador y Narosky (1987) dan a conocer un registro de observación realizado cerca de Villa Angela, Chaco.

En el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) acaba de ingresar un ejemplar de esta subespecie, sin sexo determinado, encontrado muerto por el señor Raúl Chiesa en península de Valdés, Chubut, en noviembre de 1989. Como es poco pro-

bable que se tratara de un ejemplar escapado de cautiverio, ya que el plumaje se halla en perfectas condiciones, el presente registro puede ser considerado extralimital. Al tratarse de una especie poco común y difícil de observar, es posible que pase inadvertida muchas veces, por lo que su área de distribución puede ser mayor que la conocida.

En el MACN existen las siguientes pieles correspondientes a esta raza: JUJUY, Yuto, 1 masculino, 7 feb 1963,