

Notas breves

CONDOR EN CORDOBA. I

En el transcurso de excursiones de trekking por los cerros y serranías del Valle de Punilla, he tenido la oportunidad de observar cóndores (*Vultur gryphus*), en diversas ocasiones.

Llama la atención que la mayoría de los individuos no poseen el plumaje típico del adulto; aún cuando algunos tienen el collar blanco, carecen del blanco característico de las alas, o el mismo se encuentra sucio o bien no se desarrolló.

- 13 dic 1988:** Cerro Uritorco, 11:30 hs. 2 jóvenes y una hembra.
- 5 ene 1989:** Cerro Uritorco. Un joven.
- 10 ene 1989:** Arroyo Cruz Grande, cerca de Los Cocos, 15 hs. Un joven y una hembra.
- 27 ene 1989:** Cerro Uritorco. Una hembra.
- 16 feb 1989:** Cerro Uritorco, 13 hs. 5 cóndores, tres con collar, uno de ellos macho. Solo tres ejemplares tenían blanco muy sucio en las alas.
- 23 feb 1989:** Cerro Uritorco. Una hembra.
- 18 ene 1990:** Los Terrones, detrás del Uritorco. Entre las 19:30 y las 20:00 hs, 7 ejemplares arribaron a un apostadero, sólo uno con plumaje de adulto.
- 3 may 1990:** Cerro Uritorco, 13 hs, 7 cóndores sobrevolando la cima. Aparentemente todos subadultos, sólo uno con collar, pero sin blanco alar notable.

17 nov 1990: Cerro Uritorco, 18 hs. Un ejemplar.

7 jun 1991: Mástil de Los Cocos, 16 hs.
Dos adultos con plumaje típico, rumbo al Uritorco.

La relativa continuidad de estos avistajes y la aparente juventud de los ejemplares observados permitiría suponer que las alturas del Cerro Uritorco constituirían un refugio para una población en expansión, por ahora preservada ya que la gente los confunde con aguiluchos, sin concederles importancia.

*Félix Vidoz. Casilla de Correo 165 - 8431,
El Bolsón, Chubut.*

CONDOR EN CORDOBA. II

Observación de un posadero en los terrones

Ubicada a 17 km al norte de Capilla del Monte, se encuentra ésta formación geológica, de la que participan también Ongamira, Quebrada de Luna y Sierra de Charbonier, constituidas por areniscas rojizas cretácicas, brechas, conglomerados y sus agregados. En este caso, el manto sedimentario apoyado sobre el zócalo occidental de las postrimerias de la Sierra Chica, unos 10 km al norte del Cerro Uritorco, ha sido erosionado formando espectaculares cajones, precipicios, monolitos y columnas, que bien valen la fama ganada por el lugar. La formación está dentro de una propiedad privada, que administra el sr. Verón, antiguo maestro de la zona, quien ha construido el camino de acceso y las instalaciones para atención del turista. En su acceso, recorrido y escenario, es lo más parecido a un parque nacional que se puede

encontrar en el Valle de Punilla. (Cabe acotar que el administrador mantiene un juicio por usurpación al adueñarse de esta maravilla, que bien podría trasladarse al dominio público). Ubicado a unos 1400 msnm el mirador de El Circo constituye el punto culminante de la senda peatonal, y fue desde allí donde en el verano de 1990, descubrí el posadero de cóndores, que venían siendo detectados con asiduidad en la parte alta de estas sierras (Ver nota anterior). Hasta ahora los cóndores se habían mantenido en el anonimato, pues tanto turistas como paisanos de la zona, identifican a cualquier ave grande planeadora como aguiluchos (siendo estos en realidad más raros en el área), pero en la primavera de 1991, aparentemente un juvenil cayó en una grieta, no pudiendo levantar vuelo. El hecho fue filmado y pasado por la televisión cordobesa, estando el animal tan impotente que, según comentarios los camarógrafos llegaban a tocarlo con la mano". Este posadero permite suponer que los cóndores incursionan más hacia el norte y el este, pudiendo llegar en la actualidad hasta el Cerro Colorado, sitio donde antiguamente los indígenas grabaron en sus paredes la presencia de la especie.

*Félix Vidoz. Casilla de Correo 165 - 8431,
El Bolsón, Chubut.*

OBSERVACION DE UN ZORZAL PATAGONICO CON PICO ABERRANTE

En abril de 1992, en el jardín del edificio Ayecán Ruca (Beschtedt y Gallardo), San Carlos de Bariloche, observamos un Zorzal Patagónico (*Turdus falcklandii*) con el pico extrañamente anómalo.

Participaba de un grupo de 6 o 7 ejemplares que comían frutos maduros de serbal (*Sorbus aucuparia*) y lombrices, entre el pasto mojado por la llovizna. Aunque de plumaje similar al resto, al verlo de perfil semejaba un Chinchero Grande (*Drymornis bridgesii*), por la extraña deformación de su pico: más largo que lo habitual, ligeramente curvo hacia abajo y con la mandíbula superior, más corta y curva que la inferior, y con el ápice desviado hacia la derecha. Al parecer esto no le causaba impedimento alguno para comer, tomar agua, bañarse y acicalarse. Posteriormente, en el mismo grupo, se vió otro individuo con similar anomalía, pero de menor largo, detalle interesante de por sí para realizar un seguimiento y determinar causas y consecuencias de la imperfección.

*Félix Vidoz y Bernardita Bielsa.
Casilla de Correo 165 - 8431, El Bolsón, Chubut.*

TORCACITA COMUN ALBINA EN CORRIENTES

Durante julio de 1992, observe reiteradamente una Torcacita Común (*Columbina picui*) albina, pero que conserva la línea negro azulada de la cubiertas superiores. Frecuenta el gallinero de mi casa en La Cruz, Corrientes, con otras 15 o 20, que junto a jilgueros, chingolos y gorriones concurren a alimentarse al gallinero.

*Claudio S. Nadal. Colón 783-3346
La Cruz, Corrientes.*