los valiosos datos que me suministraron; y efectuar un reconocimiento especial a la memoria de Horacio Foerster.

Bibliografía

- Bertoni, A. de W. 1913. Contribución para un catálogo de aves argentinas. An. Soc. Cient. Arg. 75: 64-102.
Contreras, J. R. 1987. Lista preliminar de la avifauna correntina. II. Passeriformes. Hist. Nat. 7: 61-70.
Chebez, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas que se extinguen. Ed. Albatros.

- Dabbene, R. 1910. Ornitología Argentina. An. Mus. Nac. Buenos Aires 11: 1-513.
De Basaldúa, F. 1901. Pasado, presente y porvenir del Territorio Nacional de Misiones. 205 pp. La Plata.
Navas, J. R. y N. A. Bó. 1988. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. III. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat., Zool. 15: 11-37.
Pereyra, J. A. 1950. Las aves del Territorio de Misiones. An. Mus. Nahuel Huapi 2: 1-38.
———. 1951. Avifauna argentina (Contribución a la ornitología). Hornero 9: 291-347.

Recibida: mayo de 1993

* Calle 4 bis y 515; 1900 La Plata.

NIDIFICACION DE AVES EN MISIONES II

Carlos A. Saibene *

Esta comunicación incluye datos parciales sobre la nidificación de tres passeriformes registrada en el Parque Nacional Iguazú, para los cuales no se conocen antecedentes en la Argentina (Narosky *et al.* 1983, Fraga y Narosky 1985). De esta forma, dada la total escasez de información y a pesar de lo exiguuo de la obtenida, se contribuye al conocimiento de la situación reproductiva de estas especies.

Dendrocolaptes platyrostris

Trepador Oscuro

El 7 set 1991 se observó en la entrada del Sendero Macuco un ejemplar que transportaba trozos de corteza a un hueco natural en un laurel (*Nectandra sp.*). En los días siguientes no se lo vió alejarse a más de 30 m del hueco, recolectando el material de árboles cercanos, principalmente mamica de cadelá (*Fagara rhoifolia*) y maría preta (*Diatenopterix sorbifolia*). Otro ejemplar se mantenía cerca del nido sin participar. El día 20, en un momento en que el ave abandonó el nido, se subió al árbol no pudiéndose acceder al lecho dada la profundidad de la cavidad.

El hueco se encontraba a unos 8 m de altura, tenía forma alargada (fusiforme), de 40 cm de longitud y 7 cm de ancho máximo.

Philydor lichtensteini

Ticotico Ocráceo

El 15 set 1991, en un área de selva secundaria próxima a Cataratas, se observó a un ejemplar transportar material e introducirlo en un hueco. Esta tarea la repitió varias veces no pudiéndose precisar la procedencia de los elementos.

El hueco era circular, presumiblemente un nido viejo de un

carpintero, ubicado casi en el extremo de una rama lateral seca de un laurel a unos 15 m de altura.

Es interesante destacar que otras aves del mismo género utilizan galerías subterráneas para nidificar (Sick 1985).

Herpsilochmus rufimarginatus

Tiluchi Ala Rojiza

El 20 dic 1987, a los 600 m del Sendero Yacaratiá, se observó una pareja construyendo nido. Al parecer ambos sexos trabajan, pero solo pudo confirmarse que la hembra llevaba material hacia la parte baja de la copa de un aguay (*Chrysophyllum gonocarpum*) a unos 8 m del suelo, del que colgaban numerosas enredaderas dificultando la observación.

Agradecimientos

A Silvana B. Montanelli y a Tito Narosky por la lectura y corrección del manuscrito.

Bibliografía

- Narosky, S., R. Fraga y M. de la Peña. 1983. Nidificación de las aves argentinas. Dendrocolaptidae y Furnariidae. Asoc. Ornitológica del Plata.
Fraga, R. y S. Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas. Formicariidae a Cinclidae. Asoc. Ornitológica del Plata.
Sick, H. 1985. Ornitología Brasileira. Uma introducao Vol. 2. Edit. Univ. de Brasilia, Brasilia.

Recibida: julio de 1993

*Guardaparque Nacional, Área Natural Protegida Mburucuyá; CC 1; 3427 Mburucuyá, Corrientes