

EL PICAFLOR GARGANTA BLANCA (*Leucochloris albicollis*) EN CORDOBA

Norberto H. Montaldo *

El Picaflor Garganta Blanca es una especie en constante expansión en la Argentina. Olrog (1963) en un principio lo señaló sólo para Misiones y años después (Olrog 1979) amplió la distribución a toda la región mesopotámica y el este de Buenos Aires. Narosky e Yzurieta (1987) siguen el mismo criterio y agregan el este de Chaco. En la provincia de Buenos Aires fue registrado por primera vez por Pereyra (1965) en el partido de Pilar y luego este picaflor fue avanzando hacia el sur y el oeste, siendo los límites conocidos Monte Hermoso (Bó y Darrieu 1988), Tornquist (De Lucca 1990) y Bahía Blanca (Delhey 1992) respectivamente.

El 20 y 21 jul 1993 fueron vistos al menos dos ejemplares de *Leucochloris albicollis* en la localidad de Río Ceballos, depto. Colón, provincia de Córdoba. El hallazgo se realizó en el paraje denominado Cristo de Ñu-Porá, sitio forestado con vegetación exótica, donde había abundante floración de los arbustos *Aloe arborescens* y *Chaenomeles lagenaria*. Se observó que los picaflores Garganta Blanca combatían entre sí y eran perseguidos por individuos del Picaflor Coludo (*Sappho sparganura*), que explotaban dichos recursos. Este registro sería el primero para la especie en Córdoba, ya que no figura en la lista más reciente que existe para dicha provincia (Nores *et al.* 1983) y al parecer tampoco fue observada luego de su publicación (Martín, com. pers.).

De acuerdo a lo acontecido en Buenos Aires, donde *Leucochloris albicollis* es localmente frecuente (Montaldo y López 1992), nidifica (Ñuñez Chas 1993) y también es residente invernante (Montaldo 1984), se estima posible que en un futuro cercano este picaflor sea un integrante más de la avifauna cordobesa.

Agradecimientos

A la Dra. Liliana Martín (Centro de Zoología Aplicada,

Univ. Nac. de Córdoba) a quien consulté por la presente observación.

Bibliografía

- Bó, N. A. y C. A. Darrieu. 1988. Presencia de *Leucochloris albicollis* en el balneario Monte Hermoso, Buenos Aires. *Neotrópica* 34: 40.
- Delhey, R. 1992. Algunas aves nuevas o poco conocidas para la región de Bahía Blanca. *Nuestras Aves* 27: 31-32.
- De Lucca, E. R. 1990. Picaflor Garganta Blanca en el SO de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 22: 32.
- Montaldo, N. H. 1984. Asociación de dos especies de picaflores con árboles del género *Eucalyptus* (Myrtaceae) en la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 12: 159-162.
- Montaldo, N. H. y H. E. López. 1992. Aves silvestres de Pinamar y Villa Gesell. Edic. del Naturalista. Buenos Aires.
- Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. *Asoc. Ornitológica del Plata*. Buenos Aires.
- Nores, M., D. Yzurieta y R. Miatello. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Cs. Córdoba* 56: 1-114.
- Ñuñez Chas, J. M. 1992. Hallazgo de un nido de *Leucochloris albicollis* en Mar del Plata. *Nuestras Aves* 27: 32-33.
- Pereyra, J. A. 1965. *Leucochloris albicollis* en la provincia de Buenos Aires. *Hornero* 10: 279.
- Olrog, C. C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. *Opera Lilloana* 9: 1-377.
- . 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana* 27: 1-324.

Recibida: julio de 1993

*Cátedra de Botánica; Facultad de Agronomía (UBA); Av. San Martín 4453; 1417 Buenos Aires

ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LA HARPIA EN ARGENTINA

Juan C. Chebez *

Según se desprende de la bibliografía consultada (ver cuadro), la Harpía (*Harpia harpyja*) ha sido citada desde antiguo en forma más o menos amplia para el norte argentino, abarcando ambientes correspondientes a tres provincias biogeográficas: paranaense, chaqueña y de las yungas.

Acerca de su presencia en Misiones, existen ejemplares taxidermizados y cautivos, fotografías de juveniles y sus nidos, además de registros visuales que fundamentan la presencia de una población relictual, residente y nidificante en las selvas serranas de los deptos. Iguazú, Gral. Belgrano, San Pedro y Eldorado, y capturas documentadas en los

deptos. Montecarlo y Cainguás, y un dato oral del depto. Oberá (Bertoni 1913, Pereyra 1950, Foerster 1972, Olrog 1985, Chebez et al. 1990, Navas y Bó 1991, Chebez 1992) En la región chaqueña, como se aprecia en el cuadro adjunto existen dos citas nominales de Holmberg (1895) y Dabbene (1910) que habrían sido el origen de numerosas repeticiones posteriores incluyendo a la especie para Chaco y Formosa. La primera de ellas podría haber tenido su origen en De Mossy (1864), quien citó la especie para Chaco y Orán, y en Sharpe (1874), que la indica para "Chaco Boreal", tal como lo reproduce textualmente Dabbene, denominación que a nuestro entender corresponde al Chaco paraguayo o boliviano. Contreras et al. (1990) al incluir la especie en su atlas ornitogeográfico del Chaco, no indican citas concretas, refiriéndose a las anteriores como el origen de las menciones para el Chaco y señalan que "actualmente casi con seguridad no integra la avifauna del Chaco" y que "la antigua distribución de la especie está hoy enteramente fragmentada en relictos de supervivencia y todavía subsiste en Misiones (Argentina) y en el Paraguay Oriental" por lo que deducimos que interpretan su ausencia como una retracción areal. Nuestra impresión es que las citas de la especie en áreas

chaqueñas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras no están debidamente comprobadas con capturas y avistajes concretos, constituyéndose en una especie hipotética para la región.

En Salta la única cita concreta es la del geógrafo De Mossy (1860) quien indica textualmente: "La grande harpie (*Falco harpya*) se recontre au chaco et dans les forets d'Orán, principalement au bord des rivières". El hecho de lo vago de la referencia, que De Mossy no aporte detalles que convaliden la identificación y que no haga ninguna mención a otras águilas crestadas de la región, no proveen un fuerte sustento a esta cita que luego repitieron Holmberg (1878 y 1895), y varios autores posteriores. Incluso en el primer trabajo Holmberg, comentó: "Sería imposible que Mossy (sic) confundiera esta especie con otra", esta aseveración sería errónea en base a los actuales conocimientos que disponemos ya que además otras cuatro águilas crestadas habitan la provincia. En su reseña de la avifauna salteña Holmberg no indica a ninguna de las especies, que fueron citadas con posterioridad.

Existen dos citas de Olrog (1950) de Harpía en Tucumán fundamentadas en un ejemplar hembra inmaduro colectado

Cuadro: Distribución de la Harpía en Argentina, según obras generales de ornitología argentina

AUTOR	AÑO	DISTRIBUCIÓN
Holmberg	1895	"desde México hasta Chaco"
Dabbene	1910	"Chaco boreal, Orán, Salta; (Holmberg, Seg. Censo Rep. Arg. ,p. 506, 1895, id. Natural. Arg. I, p. 95, 1878). Sierra de Misiones (Bertoni)
Steullet y Deautier	1936	"desde el norte de México hasta el norte de la Argentina (Misiones: San Pedro; Chaco; Salta: Orán)"
Zotta	1944	"NE de Argentina (Misiones)"
Pereyra	1950	Tucumán y Misiones
Olrog	1959	"Casualmente encontrado en Misiones, Formosa, Salta, Jujuy , Tucumán". La mapea para Misiones y el E de Jujuy (sombreado) y como posible en el E de Salta, N de Tucumán, N y centro de Santiago del Estero, N de Santa Fe, Formosa, Chaco y N de Corrientes (punteado)
Olrog	1963	"Ocasionalmente se la encuentra en Misiones, Formosa, Salta, Jujuy y Tucumán"
Olrog	1979	"selvas en Misiones, ocasionalmente también en Salta, Jujuy, Tucumán y Formosa"
de la Peña	1985	Misiones
Narosky e Yzurieta	1987	"selvas y bosques en el N" (norte) y mapean con puntos como áreas de baja densidad Misiones, E de Formosa, E de Jujuy y centro de Salta
Canevari et al.	1991	"muy rara en la Argentina, ocasionalmente se ven ejemplares en las provincias del norte (arroyo Urugua-í, Misiones)". Además la mapean para Jujuy, N de Salta, Formosa y centro y N de Misiones.

en Timbó (seguramente Timbó Nuevo, depto. Burreyacu) y comprado a un cazador desconocido por el Instituto Miguel Lillo, el 10 ago 1949, y un avistaje de "un ejemplar adulto, probablemente una hembra fué observado por el autor en la frontera entre Tucumán y Salta, en octubre de 1950...". Con respecto al primer registro a pesar que en su artículo Olrog aclara "el ejemplar mencionado de Timbó es distinguible fácilmente de *Harpaliaetus coronatus coronatus* por su tamaño y la coloración casi blanca de las partes ventrales. La cola, además, no tiene la ancha banda blanca, tan típica de la otra especie", en el Instituto Miguel Lillo el ejemplar (no. 6068) figura como perteneciente al Aguila Coronada (*Harpaliaetus coronatus*) de acuerdo a la consulta que efectuaran a nuestro pedido Alejandro Di Giacomo y Claudio Laredo en el fichero de la colección ornitológica y en la tarjeta que acompaña a la piel. De esta manera queda planteado el interrogante de su presencia en el noroeste argentino sustentado solo en base al registro visual de Olrog, debiendo eliminarse la piel de Timbó como documento, por corresponder a otra especie.

La presencia de la Harpía en ambientes yungueños a pesar de la aparente aptitud del hábitat (recordamos que incluso en Misiones prefiere selvas serranas) y abundancia de presas potenciales, no está a nuestro entender bien fundamentada, incluso en Bolivia los datos disponibles la indican en ámbitos amazónicos en los deptos. de Cochabamba y Santa Cruz, fuera del sector de yungas (Remsen y Traylor 1989). Como refuerzo de esta presunción Fjeldsá y Krabbe (1990), no incluyen esta especie al tratar la avifauna de la zona andina.

En uno de sus últimos trabajos Olrog (1985) al referirse al estatus de la especie indicó: "The only certain population in Argentina seems to be in Misiones where adults and juveniles are observed almost every year. From the north-west, however, there are no records according to my knowledge for the last 30 years". Coincidimos mayormente con esta apreciación efectuada varios años antes de comprobarse su nidificación en el país, dejando planteado el interrogante de su presencia en el noroeste argentino y región chaqueña que, a nuestro entender no cuentan con demasiado fundamento.

Agradecimientos

A Alejandro Di Giacomo y Claudio Laredo por su colaboración en la consulta museológica y a Eduardo Haene por facilitarme parte de la bibliografía.

Bibliografía

- Canevari, M., P. Canevari, G. R. Carrizo, G. Harris, J. Rodríguez Mata y R. J. Straneck. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomo II. Fund. Acindar. Buenos Aires.
- Contreras, J. R., L. M. Berry, A. O. Contreras, C. C. Bertonatti y E. E. Utgés. 1990. Atlas Ornitogeográfico de la provincia del Chaco. República Argentina. I. No Passeriformes. Cuad. Tec. Félix de Azara 1: 1-164.
- Chebez, J. C. 1992. Notas sobre algunas aves poco conocidas o amenazadas de Misiones (Argentina). Aprona, Bol. Cient. 21: 12-30.
- Chebez, J. C., M. Silva Croome, A. Serret y A. Taborda. 1990. La nidificación de la Harpía (*Harpia harpyja*) en Argentina. Hornero 13: 155-158.
- Dabbene, R. 1910. Ornitología Argentina. An. Mus. Nac. Buenos Aires 11: 1-513.
- de la Peña, M. R. 1985. Guía de aves argentinas. II. Falconiformes. Ed. del autor, Santa Fe.
- De Moussy, M. 1860. Description Géographique at Statistique de la Confédération Argentine. T. Deuxieme: 26, Libr. Firmin. Didot Frères, París.
- Foerster, J. 1972. Notas biológicas sobre *Harpia harpyja* (Linné) (Aves, Falconiformes). Neotrópica 18: 146-148.
- Fjeldsá, J. y N. Krabbe. 1990. Birds of the High Andes. Zool. Mus., Univ. of Copenhagen.
- Hölmberg, E. L. 1878. Contribuciones para el conocimiento de la fauna de Salta. Nat. Argentino. 1: 83-96, 118-122, 152-156 y 315-320.
- . 1895. La Fauna Argentina. En: Segundo Censo de la República Argentina: 477-577, B. Aires.
- Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata. B. Aires.
- Navas, J.R. y N.A. Bó. 1991. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. IV. Rev. Mus. Arg. Cs. Nat., Zool. 15: 95-106.
- Olrog, C.C. 1950. Notas ornitológicas sobre la colección del Instituto Miguel Lillo (Tucumán). Acta Zool. Lilloana 9: 471-474.
- . 1959. Las aves argentinas. Una guía de campo. Univ. Nac. Tucumán Miguel Lillo, Tucumán.
- . 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Opera Lilloana 9: 1-377.
- . 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.
- . 1985. Status of Wet Forest Raptors in Northern Argentina. ICBP. Techn. Publ. 5: 191-197.
- Pereyra, J.A. 1950. Avifauna Argentina (Contribución a la Ornitología). Hornero 9: 178-241.
- Remsen, J. V., Jr. y M. A. Traylor, Jr. 1989. An annotated list of the birds of Bolivia. Buteo Books. Vermilion, South Dakota, USA.
- Sharpe, R.B. 1874. Catalogue of the Birds in the British Museum. London, Brit. Mus. Vol. I.
- Steullet A.B. y E.A. Deautier. 1936. Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina. Obra Cincuent. Mus. La Plata 1: 257-492.
- Zotta, A. 1944. Lista sistemática de las aves argentinas. Tirada Mus. Arg Cs. Nat. Buenos Aires, 236 pp.

Recibida: marzo de 1993

*Administración de Parques Nacionales, Delegación Técnica Regional NEA, Av. Victoria Aguirre 66; CC 54, 3370 Puerto Iguazú; Misiones.