

tante, en Nueva Caledonia y otras regiones cálidas del Pacífico, una especie del mismo género (*A. tristis*) es considerada responsable de la progresiva disminución de algunas especies de aves autóctonas (Barrau y Devanchez 1957, en Dorst 1972).

Agradecimientos

A la Dra. Nelly Bó por facilitarnos material de su biblioteca y por sus atinados comentarios. A Alejandro Di Giacomo, bibliotecario de la AOP, por el envío de fotocopias de la guía de Japón.

Bibliografía

Bó, N. A. y C. A. Darrieu. 1991. Lista sistemática de las aves de la provincia de Buenos Aires. Situación ambiental de la provincia de Buenos Aires. CIC 8: 1-37.

Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo y M. Babarskas. 1993. Nuevos registros de *Sturnus vulgaris* y *Acridotheres cristatellus* en Buenos Aires. Nuestras Aves 29: 32-33.

Dorst, J. 1972. Antes que la naturaleza muera. Omega, Barcelona.

Farrand, J., Jr. 1988. Western Birds. An Audubon Handbook. Mc. Graw Hill.

Moschione, F. N. 1989. Nuevas aves para la reserva de Punta Lara. Garganchillo 10: 7-11.

Narosky, T. y A. G. Di Giacomo. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus. Asoc. Ornitológica de Plata, Vazquez Mazzini Eds., L.O. L. A., Buenos Aires.

Saidon, M., I. Barrios y C. Gomez. 1988. Estornino crestado asilvestrado en Plaza Paso, La Plata. Garganchillo 5: 11-12.

Udvardy, M. D. F. 1977. The Audubon Society Field Guide to North American Birds. Western Region. Alfred Knopf, New York.

Wild Bird Society of Japan. 1982. A Field Guide to the birds of Japan. W.B.S.J.

Recibida: agosto de 1993

*Av. Paso 3398; 7600 Mar del Plata; Buenos Aires

**Lab. Vertebrados (dep. Biología); Fac. Cs. Ex. y Nat. UNMdP; Funes 3350; 7600 Mar del Plata; Buenos Aires

PRESENCIA DEL PICAFLOR GARGANTA BLANCA (*Leucochloris albicollis*) EN BOLIVIA

German Roitman * y Roberto Neumann *

El 4 jun 1993 fueron observados tres individuos (dos adultos y un juvenil) del Picaflor Garganta Blanca en la frontera entre Argentina y Bolivia, sobre el río Bermejo, en la selva montana de Alarache (22° 16' S y 64° 35' W), en la orilla boliviana.

El ambiente en que se los observó se encuentra a 1000 m de altitud, con una precipitación media anual de 2200 mm. Las temperaturas medias de julio y diciembre son 13 °C y 23 °C, respectivamente, con máximos absolutos de 38 °C y mínimos absolutos de -2 °C. El relieve es montañoso con pendientes fuertes y terrazas aluvionales cubiertas por una densa formación forestal de yungas. Los árboles más característicos son maroma (*Ficus maroma*), pacay (*Inga edulis*, *I. marginata* e *I. saltensis*), cedro (*Cedrela angustifolia*), sacha chirimoya (*Croton densiflorus*), lapacho amarillo (*Tabebuia lapacho*), quina blanca (*Lonchocarpus lilloi*) y laurel blanco (*Nectandra pichurin*). Las especies arbustivas típicas de este sector septentrional de las yungas son: helecho árbol (*Nephelea incana*), bandera boliviana (*Heliconia subulata*), sacha achira (*Thalia geniculata*), etc. Entre las especies de floración invierno-primaveral aptas para la dieta

nectarívora de los Trochilidae se destacan *Tabebuia*, *Heliconia* y las siguientes Acanthaceae: *Dicliptera tweediana*, *Ruellia brevifolia*, *R. sanguinea*, *Aphelandra hieronymi*, *Justicia ramulosa*, *J. oranensis*, *J. baenitzii*, *J. kuntzei*, *Schaueria azaleiflora* y *Streblacanthus dubiosum*.

La bibliografía consultada señala que la distribución de esta especie comprende el sudoeste de Brasil en los estados de Río Grande do Sul, Espírito Santo y el sur de Minas Gerais (Ruschi 1982, Belton 1984 y Sick 1985); Paraguay, donde es raro en los departamentos de Chaco y Alto Paraná (Hayes *et al.* 1991), Uruguay y Argentina. Aquí se encuentra en las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires (Olrog 1979, Narosky e Yzurieta 1987, Canevari *et al.* 1991) y recientemente fue observado en Córdoba (Montaldo 1995). Tanto Kempff Mercado (1985) como Remsen *et al.* (1989) no incluyen esta especie para Bolivia.

Esta cita amplía el área de distribución (sería la observación más occidental) de este troquílido en expansión (Narosky e Yzurieta 1987) y agrega un nueva especie a la avifauna boliviana.

Bibliografía

- Belton, W. 1984. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part I. Rheidae through Furnariidae. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 178:371-631.
- Canevari, M., P. Canevari, G. R. Carrizo, G. Harris, J. Rodríguez Mata y R. J. Straneck. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomo II. Fund. Acindar. Buenos Aires.
- Hayes, F. E., P. A. Sharf, P. A. y H. Loftin. 1991. A Birder's field checklist of the birds of Paraguay. Russ Nat. Hist. Books. Florida, USA.
- Kempff Mercado, N. 1985. Aves de Bolivia. Ed. Gisbert. La Paz.
- Montaldo, N. H. 1995. El Picaflor Garganta Blanca (*Leucochloris albicollis*) en Córdoba. Nuestras Aves 31: 22.
- Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
- Olrog, C.C 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.
- Remsen, J. V., Jr. y M. A. Traylor, Jr. 1989. An annotated list of the birds of Bolivia. Buteo Books. Vermilion, South Dakota, USA.
- Ruschi, A. 1980. Beija-flores do estado do Espírito Santo. Ed. Rías. Sao Paulo.
- Sick, H. 1985. Ornitología Brasileira. Uma Introducao. Vol. 1. Edit. Univ. de Brasilia. Brasilia.

Recibida: setiembre de 1993

*Cátedra de Botánica; Facultad de Agronomía (UBA); Av. San Martín 4453 1417; Buenos Aires

**INTA Cerrillos; CC 228; 4403 Cerrillos; Salta.

NOTAS SOBRE LA AVIFAUNA DE SIERRA DE LAS QUIJADAS

Guillermo Gil*, Eduardo Haene* y Juan C. Chebez*

Se dan a conocer observaciones de nueve especies de la avifauna del área de la Sierra de las Quijadas, al noroeste de la Provincia de San Luis, correspondiente a la zona declarada PN en 1991 (aún sin instrumentar). Su comunicación se considera de interés por no contarse con datos precisos de su presencia en la provincia de San Luis (Zotta 1944, Casares 1944, Partridge 1953, Olrog 1979, Ochoa de Masramón 1983, Nores et al. 1983), excepto la reciente revisión realizada por Nellar (1993), en la cual se puntualizan registros para esta región de algunas de las especies tratadas. Las iniciales del observador figuran en cada caso entre paréntesis, correspondiéndose con los autores de la presente nota; las observaciones de octubre de 1991 fueron realizadas junto a Miguel Nellar y las de enero de 1995 junto a Daniel Gómez y Alejandra Carminati.

Anas bahamensis

Pato Gargantilla

Fue observado un individuo (GG y EH) el 3 sep 1990, en una fracción de la laguna Guanacache al N de la Laguna El Porvenir (depto. Belgrano); y 2 ejemplares (EH) el 30 ene 1995, en una laguna temporaria cerca de Hualtarán (depto. Belgrano).

La distribución conocida abarca desde el N hasta Buenos Aires, La Pampa y Mendoza (Olrog 1959, Meyer de Schauensee 1982), y San Luis (Nellar 1993). Roig (1965) la menciona para La Paz (Mendoza), localidad cercana a la de nuestra observación.

Buteo magnirostris

Taguató Común

Se observó un individuo (GG y EH) el 3 sep 1990, en el límite NE del PN Sierra de las Quijadas, sobre la ruta nacional 147, cerca del paraje La Chañarienta, depto. Ayacucho; en un ambiente de bosque de quebracho blanco (*Aspidosperma quebracho-blanco*) y algarrobos (*Prosopis*). Otro ejemplar fue visto el 8 sep 1990, en El Durazno, depto. Pringles.

La distribución conocida para *Buteo magnirostris saturatus* era desde el N, al O de los ríos Paraguay y Paraná hasta Santa Fé, Córdoba y La Rioja (Olrog 1979; Nores et al. 1983) y el c-NE de San Luis (Nellar 1993); nuestro registro de La Chañarienta extiende su distribución conocida hasta el NE de San Luis. Cabe acotar que la especie fue registrada en la Estancia La Primera (N. Rey y EH), al O de Villa Huidobro (Provincia de Córdoba), muy cerca del límite con la provincia de San Luis (a la altura de Buena Esperanza).

Harpyhaliaetus coronatus

Aguila Coronada

En tres oportunidades se observó un ejemplar en las inmediaciones y dentro del PN Sierra de las Quijadas, depto. Belgrano (GG y EH): a) el 1 sep 1990 en los montes cercanos al río Desaguadero, a la altura de la Estancia El Silencio, en la margen mendocina del río; b) el 3 sep 1990 planeando sobre la laguna Guanacache al N de la Laguna El Porvenir (depto. Belgrano); c) el 6 sep 1990, también pla-