

Alimentación

Hemos observado en varias ocasiones los hábitos alimenticios de este gavilán.

Los días 26 jun y 21 jul 1990 debajo de un nido, al parecer utilizado durante la temporada anterior, pero aún frecuentado por las aves, se encontraron restos frescos de una Torcaza (*Zenaidura macroura*) y de cuises (*Cavia aperea*).

El 19 ago 1990 observamos como un Gavilán Mixto que volaba sobre un liral (*Iris pseudacorus*), se arrojó en picada, para reaparecer con un cuis entre las garras. Se posó en un seibo (*Erythrina cristagalli*), y comenzó a picotear la presa. Luego de unos minutos se alejó con el roedor hacia un monte de eucaliptos, donde se perdió de vista.

El 9 set 1990 hallamos un ejemplar asentado en el suelo, en campo abierto. Ante nuestra aproximación levantó vuelo con una presa entre las garras, que luego de unos instantes dejó caer. La misma resultó ser un cuis a medio comer.

Nuestras observaciones coinciden con la información aportada por Pereyra (1950), Anónimo (1987) y de la Peña (1987), sobre la captura de palomas y cuises por parte del Gavilán Mixto.

Agradecemos a H. Stocky por su colaboración en las tareas de campo, y a A. G. Di Giacomo por la lectura crítica del manuscrito.

BIBLIOGRAFIA

Anónimo. 1987. Proyectos: Estudio del Gavilán Mixto. Aprona, Bol. Cient. 1: 22-23.

Aprile, G. y P. Novas. 1988. Observaciones sobre *Parabuteo unicinctus*. I. Territorialidad en relación intra y extra específicas. Aprona, Bol. Cient. 9: 23-31.

Dabbene R. 1918. Nido y pichones de un gavilán *Parabuteo unicinctus* (Temminck). Hornero 1: 100-101.

de la Peña, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Edición del autor, Santa Fe.

d'Orbigny, A. 1835/1844. Voyage dans l'Amérique Meridionale. Vol. 4 Part. 3: Oiseaux.

Klimaitis, J. E. y F. N. Moschione. 1987. Aves de la Reserva Integral de Selva Marginal de Punta Lara y sus alrededores. Min. de Economía de la Prov. de Bs. As.

Pereyra, J. A. 1937. Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la Gobernación de La Pampa. Mem. Jardín Zool. La Plata 7: 197-326.

Pereyra, J. A. 1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. Mem. Jardín Zool. La Plata 9: 1-304.

Pereyra, J. A. 1950. Avifauna Argentina (Contribución a la ornitología). Hornero 9: 178-241.

Withington, F. 1888. On the Birds of Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentine Republic. With Notes by P. L. Sclater. Ibis 1888: 461-473.

Recibida: mayo de 1994

¹ Barzana 1583; 1431 Capital Federal

² Padre Bruzzone 1142; 1882 Ezpeleta, Buenos Aires

DOS OBSERVACIONES DE CAPTURA DE VERTEBRADOS POR PASSERIFORMES

Eduardo H. Haene¹

En marzo de 1993 en el Puesto Abadie-cué, Parque Nacional Río Pilcomayo (provincia de Formosa) observé a dos individuos del Trepador Grande (*Xiphocolaptes major*) en una isleta de monte. Estando posados en un tronco horizontal, antes de emprender vuelo, uno de ellos tomó con su pico un anfibio (un hílido de tamaño mediano), aparentemente muerto, depositado sobre el mismo tronco donde estaba posado. Se asentó a unos 50 m, dejando nuevamente el anfibio sobre el árbol donde se hallaba. Al poco tiempo, lo tomó con el pico cuando pasó volando junto

a él el otro Trepador Castaño, perdiéndose ambos de vista dentro del bosque.

Sólo se conocían tres casos de captura de vertebrados por parte de esta especie: un reptil y un hílido de unos 7 cm, (Hayes y Escobar Argaña 1990), y el anfibio *Eleutherodactylus* (Carrizo 1991).

En feb 1993 en un jardín de Garín (provincia de Buenos Aires), registré un Zorzal Colorado (*Turdus rufoventris*) que picoteaba en el suelo a un ejemplar vivo de *Amphisbaena darwini*, saurio ápodo de vida subterránea, que medía 18 cm de largo. Luego de tomarlo con el pico, lo llevó en vuelo bajo unos 4 m, para depositarlo en el suelo y continuar atacándolo. Al advertir mi presencia, el ave se fue, abandonando su presa,

Si bien el Zorzal Colorado posee una variada dieta, que incluye básicamente frutos e invertebrados (Leiberman 1985), no existen referencias de su preferencia por vertebrados. Por su parte, *A. darwini* ha sido hallado en el contenido estomacal del Taguató Común (*Buteo magnirostris*) (Zotta 1934)

Se agradecen las sugerencias de A. Bosso y M. Babarskas.

BIBLIOGRAFIA

Carrizo, G. 1991. Un caso de predación de *Xiphocolaptes major* (Passeriformes, Dendrocolaptidae) sobre un anfibio. Bol. Asoc. Herpet. Arg. 6: 7

Hayes, F. E. y J. Escobar Argaña. 1990. Vertebrates in the diet of woodcreepers (Aves: Dendrocolaptidae). Hornero 13: 162-164.

Leiberman, J. 1985. El Zorzal Colorado. Fauna Argentina 86, 32 pp. Centro Editor de América Latina.

Zotta, A. 1934. Sobre el contenido estomacal de aves argentinas. Hornero 5: 376-383.

Recibida: noviembre de 1994

¹ AOP, 25 de Mayo 749, 2º 6; 1002 Buenos Aires

NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA FORMOSA

Manuel Nores¹, Darío Yzurieta², Sergio A. Salvador³ y Lucio A. Salvador³

Entre los años 1987 y 1990 se realizaron 4 viajes a la provincia de Formosa. Como resultado de los mismos se encontraron 6 especies que no estaban citadas para la provincia y dos de las que sólo se conocía un lugar donde habitaban.

Buteo brachyurus - Aguilucho Cola Corta

Un ejemplar fue registrado en un ambiente chaqueño a 15 km de Las Lomitas, depto. Patiño, el 12 jun 1989. Conocida de Salta, Jujuy, Tucumán y Misiones (Olrog 1979), y del E de Formosa, Chaco y Corrientes (Contreras 1990).

Cypseloides rothschildi - Vencejo Montañés

Una bandada de unos 15 ejemplares fue observada a 8 km al SE de Las Lomitas, depto. Patiño, el 27 set 1987. Conocida de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero (Olrog 1979), Catamarca (Nores y Yzurieta 1982), La Rioja (Nores y Salvador 1985) y Córdoba (Miatello *et al.* 1991).

Cinclodes comechingonus - Remolinera Serrana

Un ejemplar en Posta Km 45 (Bañado La Estrella), depto. Patiño, en dos oportunidades: el 11 jun 1989 y el 17 jul 1990. La especie nidifica en las sierras de Córdoba y de San Luis (Nores y Yzurieta 1981) y parte de la población migra al N en invierno, habiendo sido encontrada en Tucumán y Santiago del Estero (Olrog 1972) y NE de Córdoba (P. Michelutti *in litt.*).

Phacelodomus ruffifrons - Espinero Frente Rojiza

Fueron observados 4 ejemplares en Laguna Yema, depto. Bermejo, el 17 jun 1989. Conocida de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca (Olrog 1979).

Todirostrum plumbeiceps - Mosqueta Cabeza Canela

Fueron encontrados ejemplares de la raza *viridiceps* en dos localidades: Laguna Yema, depto. Bermejo, el 17 jun 1987 y en Bruchard, depto. Patiño, el 30 set 1987 (ver también Nores 1992). Conocida de Salta, Jujuy y Misiones (Olrog 1979) y Corrientes (Darrieu 1987).

Colonia colonus - Yetapá Negro

Un ejemplar fue observado en el Riacho Pilagá sobre la ruta nacional 11, depto. Formosa, el 13 jul 1990. Conocida de Misiones (Olrog 1979) y de Corrientes (Contreras 1987).

Tiaris obscura - Espiguero Pardo

Un grupo de 8-10 ejemplares fue observado en el depto. Bermejo (sin precisar localidad) el 12 jun 1989. Conocida de Salta, Jujuy y Tucumán (Olrog 1979) y Santiago del Estero (Nores et al. 1991).

Icterus icterus - Maticó

Un ejemplar fue observado a 10 km al S de Fortín Soledad, depto. Patiño, el 27 set 1987; otro a 13 km al E de Pozo del Tigre, depto. Patiño, el 29 set 1987, y otro en Posta Km 45 (Bañado La Estrella), depto. Patiño, el 11 jun 1989. Conocida para la provincia sólo de la zona de Tres Pozos (Hoy 1968, Nores e Yzurieta 1986).

Trabajo realizado con fondos provenientes de National Geographic Society (Grant No. 3253), Humedales para las Américas y CONICOR.

BIBLIOGRAFIA

- Contreras, J. R. 1987. Algunas localidades interesantes para aves argentinas. Not. Faunísticas 6: 1-2.
- Contreras, J. R. 1990. Nuevos datos acerca de la distribución y estatus de conservación de *Buteo brachyurus brachyurus* (Vieillot 1816) en la República Argentina (Accipitridae). Resúmenes del III Encuentro Argentino-Paraguayo de Ornitología. Corrientes.
- Darrieu, C. 1987. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. IV. Nuevos registros de aves (Passeriformes: Tyrannidae) y consideraciones sobre su distribución geográfica. Neotrópica 33: 29-35.
- Hoy, G. 1968. *Icterus jamachi paraguayae* (Brodtkorb). Un icterido (Aves) nuevo para la fauna argentina. Neotrópica 14: 118.
- Miatello, R., V. Cobos y C. Rosacher. 1991. Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. Hist. Nat. 8: 1-5.
- Nores, M. 1992. Bird speciation in subtropical South America in relation to forest expansion and retraction. Auk 109: 345-357.
- y D. Yzurieta. 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. Hist. Nat. 2: 33-42.
- y -. 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte 2. Hist. Nat. 2: 101-104.
- y -. 1986. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte 7. Hist. Nat. 6: 49-52.
- y S. Salvador. 1985. Nuevos registros de aves para La Rioja, Argentina. Hist. Nat. 5: 207-208.
- , D. Yzurieta y S. A. Salvador. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Cha. 59: 157-196.
- Olrog, C. C. 1972. Sobre *Cinclodes comenichingomus* Zotta y Gavio (Aves: Fumariidae). Neotrópica 18: 54-56.
- 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27: 1-324.

Recibida: enero de 1995

¹ CONICET. Centro de Zoología Aplicada. C.C. 122; 5000 Córdoba.

² Costa Canal 420; 5147 Argüello, Córdoba.

³ Bv. Sarmiento 698; 5900 Villa María, Córdoba.

NIDIFICACION DEL BAILARIN AZUL *Chiroxiphia caudata* EN ARGENTINA

Eduardo R. De Lucca ¹

El Bailarín Azul (*Chiroxiphia caudata*) habita los estratos medio e inferior de selvas húmedas y capueras en el NE de Argentina, distribuyéndose también en Brasil y Paraguay (Narosky e Yzurieta 1987). La biología reproductiva de la especie es escasamente conocida y en lo que respecta a su nidificación los pocos datos existentes fueron compilados por Fraga y Narosky (1985). Estos autores mencionan que al parecer nidifica en Misiones y N de Corrientes y hacen referencia a los nidos abandonados hallados por Giai en Misiones, los que según este último autor pertenecían a la especie (Giai 1952).

El 10 ene 1993, miembros del Grupo de Trabajo Rapaces Argentinas en compañía de Ernesto Krauczuk, mientras recorriamos el lecho del arroyo El Niño, depto. Eldorado, Misiones, en dirección a un nido de Harpía (*Harpia harpyja*) hallamos en la bifurcación de una rama de guabirá (*Campomanesia xanthocarpa*) un nido de Bailarín Azul suspendido a 1,44 m sobre el agua y distante 1,15 m de uno de los paredones del cauce (orientación S, 12 m de altura). El nido que al momento del hallazgo contenía dos pichones de plumón verde, era una pequeña taza de textura laxa constituido por palitos cubiertos de musgos. Sus medidas eran: diámetro externo 7 x 10 cm; diámetro interno 6 cm; profundidad 4,5 cm. El nido fue visitado los días 11 y 12, observándose la hembra en las intermediaciones.

Al parecer, este es el primer registro con información concreta que confirma la nidificación de la especie en Argentina.

Se agradece a la Dra. M. Ióppolo por su colaboración en la confección de esta nota y a los miembros del GTRA, que participaron de esta campaña.

BIBLIOGRAFIA

- Fraga, R. y S. Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asoc. Ornit. del Plata, Bs. As.
- Giai, A. 1952. Diccionario ilustrado de las aves argentinas. Parte I. Mundo Agrario, Ed. Haynes, Bs. As.
- Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornit. del Plata, Bs. As.

Recibida: enero de 1995

¹ Rosales 3180; 1636, La Lucila, Buenos Aires.

Editor del suplemento Observaciones de Campo:

Alejandro Di Giacomo

Revisores: Juan Carlos Chebez, Alejandro Di Giacomo y Eduardo Haene