

vinía de Buenos Aires, conociéndose cinco observaciones: cuatro de ellas en el extremo sur (partidos de Villarino, Bahía Blanca y Patagones) y la restante en el partido de Mar Chiquita, donde Mariano Martínez (com. pers.) observó un ejemplar juvenil en la albufera de Mar Chiquita. Las fechas de dichos registros corresponden a los meses de mayo, junio y julio. El objetivo de esta nota es dar a conocer tres nuevas observaciones, incluyendo las más septentrionales de individuos adultos.

El 17 jul 1994, en ocasión del octavo recuento de aves acuáticas de Sudamérica, organizado por Humedales para las Américas, IWRV y el Canadian Wildlife Service, se observó en la laguna Las Nutrias (partido de Mar Chiquita), un ejemplar juvenil. Este individuo caminaba en el borde de la misma y giraba sobre sí mismo y escarbando el fango. Sus patas eran de color amarillo. Estaba acompañada por nueve Chorlitos Doble Collar (*Choradrius fidelemdicus*).

El citado espejo de agua, de poca profundidad, tiene un denso juncal y está rodeado de pastizales naturales (*Distichlis* sp. y *Juncus* sp.). Está situado a 300 m del mar y cercano a médanos. El 7 ago 1994, se observaron en la misma laguna dos ejemplares adultos con notables patas rojas, alimentándose de la misma forma que el caso anterior. Estaban acompañados por diez Chorlitos Doble Collar y ejemplares de Sobrepuerto (*Lessonia rufi*) y Remolinera Común (*Cinclodes fuscus*). Permitieron acercarse a menos de diez metros y ser fotografiados. Prácticamente un mes después, el 4 set, se registraron dos individuos adultos, en el mismo sitio; en esta oportunidad estaban acompañados por más de cincuenta Playeritos Unicolores (*Calidris bairdii*).

Estos registros son los más septentrionales de adultos de *Phasianellus socialis*, confirman observaciones anteriores sobre su comportamiento y permiten ampliar la época en que se lo puede hallar en la provincia de Buenos Aires, la cual sería de mayo a setiembre.

Agradezco al Lic. Mariano M. Martínez por sus correcciones y comentarios, y a Fernando M. Rodríguez por su colaboración.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Hayman, P. J., Marchant y T. P. Prater. 1986. Shorebirds: an identification guide to the waders of the world. Croom Helm, London.
 Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata., Buenos Aires.
 Narosky, T., A. G. Di Giacomo y M. Babarskas. 1993. Presencia invernal del Chorlito Ceniciento (*Pluvianellus socialis*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 13: 309-310.

Recibida: octubre de 1995

Nuestras Aves 35: 36, 1996

AVISTAJE DEL PINGÜINO DE VINCHA (*Pygoscelis papua*) EN LA PENINSULA VALDES, PROVINCIA DE CHUBUT.

Hernán Pastore

Fundación Vida Silvestre Argentina, Defensa 245, 6o piso, (1065) Buenos Aires, Argentina

El 29 nov 1993 se observó un ejemplar de Pingüino de Vincha (*Pygoscelis papua*) en la reserva faunística de Punta Pirámide en la Península Valdés (depto. Viedma, Chubut). El ejemplar adulto descansaba en la costa, sobre una plataforma a 1,5 m de la superficie del mar. Se hallaba solo, aparentemente sano y con no menos de 15 días de arribo a la costa de la reserva (guardafauna Patricio Ledesma, com. pers.). Desde una distancia de 150 m pudo ser observado durante 5 minutos, hasta que se zambulló en el mar donde permaneció nadando en la superficie para luego alejarse. El guardafauna Alejandro Balado (com. pers.) pudo documentar fotográficamente el avistaje.

En la Argentina la especie se distribuye desde el archipiélago antártico hasta los 40° 18' S - 41° 10' W (aproximadamente altura de Trelew, Chubut) y "posiblemente más al norte" durante el invierno, según Olog (1963 y 1968), aunque no se precisan localidades de referencia. Narosky e Yzurieta (1987) la mapean hasta el norte de Santa Cruz. Durante la época de nidificación se distribuiría en la zona del archipiélago antártico, Islas Georgias, Sandwich, Orcadas y Shetland del Sur, Malvinas y de los Estados, además del sur del océano Índico, llegando accidentalmente hasta Tasmania (Dabbene 1920, Olog 1963 y 1968, Clark 1986).

Este último autor menciona que individuos solitarios salen a la playa en la Bahía San Sebastián, Tierra del Fuego, y que grupos reducidos frecuentan el estrecho de Le Maire.

El presente avistaje pone de manifiesto el arribo de individuos a áreas extraliminales de Chubut, tal vez de forma subobservada y, por consiguiente, con una frecuencia mayor de la supuesta y registrada. Esto se ve fortalecido también por las observaciones de los guardafaunas mencionados, quienes registraron en el lugar la presencia de otros esfénescidos, como *Aptenodytes patagonica* y *Eudyptes chrysocome*, en condiciones similares.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Dabbene, R. 1920. Los pingüinos de las costas e islas de los mares argentinos. Hornero 2: 1-9.
 Olog, C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Opera Lilloana 9: 1-377.
 —. 1968. Las aves sudamericanas. Una guía de campo. Tomo Práctico (Pingüinos - Pájaros Carpinteros). Univ. Nac. Tucumán, IML, Tucumán.
 Clark, R. 1986. Aves de Tierra de Fuego y Cabo de Hornos. Guía de campo. L.O.L.A., Buenos Aires.
 Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata., Buenos Aires.

Recibida: octubre de 1995

EDITOR OBSERVACIONES DE CAMPO: Alejandro G. Di Giacomo. REVISORES: Daniel Blanco, Juan Carlos Chebez y Tito Narosky. COLABORACION: Horacio A. Aguilar. CORRECCION: Marcos Babarskas.