

# OBSERVACIONES DE CAMPO

## Artículos

Revista Nuestras Aves, 39: 6.

### NIDIFICACIÓN DEL ESTORNINO CRESTADO (*Acridotheres cristatellus*) EN EL SUDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Enrique H. Chiurla

Av. Juan J. Paso 3398, (7.600) Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

El estornino crestado es una especie originaria del sudeste asiático; en la Argentina ha sido registrado en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires, en los partidos de La Plata, Bernal, Berazategui, Punta Lara, Florencio Varela, San Isidro, Quilmes y Mar Chiquita (Di Giacomo *et al.*, 1993; Chiurla y Martínez, 1995).

No hay en la bibliografía observaciones concretas sobre su nidificación en la Argentina; salvo los comentarios de Saidon *et al.* (1988), quienes afirman que se comprobó su cría en la ciudad de La Plata, y un registro en Florencio Varela (Di Giacomo *et al.*, 1993), donde al parecer se observaron varios ejemplares juveniles.

En esta nota se dan a conocer observaciones que confirman la nidificación del estornino crestado en territorio argentino. Los registros se realizaron en la localidad de Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires; zona ya descrita en una nota anterior (Chiurla y Martínez, 1995).

El 16 de diciembre de 1995, se observó una pareja de estorninos crestados ingresando a un nido de carpintero real (*Colaptes melanochloros*), situado a unos doce metros de altura en un álamo (*Populus sp.*). El 24 de diciembre se los registró en varias oportunidades llevando alimento en sus picos; asimismo, se encontraron bajo el árbol los restos de un huevo. El color era semejante al "turquesa" de la Carta de Colores número tres de Canevari *et al.* (1991).

El 13 de enero de 1996 continuaban transportando alimento hacia el nido; el 21 de enero ya no había actividad en el nido, pero se observó en la cercanías una pareja adulta acompañada de tres juveniles, a los cuales alimentaban. El 4 de febrero se registró un adulto con tres jóvenes, y el

11 de febrero una bandada compuesta por ocho estorninos, tres de los cuales eran juveniles. Estos se diferencian por carecer de cresta frontal, su coloración general es negruzca amarronada y su tamaño es un poco menor al de los adultos. Las manchas alares blancas son semejantes en ejemplares adultos y jóvenes. El 1° de marzo se observó una bandada de estorninos crestados compuesta por seis adultos y diez jóvenes.

De esta manera se confirma la nidificación exitosa de la especie en la Argentina. En el caso citado, los carpinteros habían utilizado el nido dos meses antes, pero sería importante observar, en caso de superposición de períodos de cría, si los estorninos se adueñan del nido, lo que supondría una interacción negativa sobre *Colaptes* spp. (para mayores detalles sobre el tema ver Di Giacomo *et al.*, 1993).

Agradezco a Mariano Martínez por sus correcciones y comentarios.

#### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.
- CHIURLA, E. H. y M. M. MARTÍNEZ. 1995. Observaciones sobre el estornino crestado (*Acridotheres cristatellus*) en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 31: 24-25.
- DI GIACOMO, A. G., A. S. DI GIACOMO y M. BABARSKAS. 1993. Nuevos registros de *Sturnus vulgaris* y *Acridotheres cristatellus* en Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 29: 32-33.
- SAIDÓN, M., Y. BARRIOS y C. GÓMEZ. 1988. Estornino Crestado asilvestrado en Plaza Paso, La Plata. *Garganchillo*, 5: 11-12.

Recibida: abril de 1997.