

cuenta esto para confirmar mi hallazgo.

El gaviotín chico común es ocasional para la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993), sin datos de nidificación. Los registros más australes corresponden al Cabo San Antonio y cercanías, donde es frecuente observarla (Blanco *et al.*, 1988; y observaciones propias). Se trataría del primer registro de nidificación para la provincia, como así también el más austral para la especie.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BLANCO, D. E., G. D. PUGNALI y H. RODRÍGUEZ GOÑI. 1988 Punta Rasa:

su importancia en la conservación de las aves migratorias. Informe inédito.

DE LA PEÑA, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves Argentinas. Edición del Autor. Santa Fe.

MOSCHIONE, F. y J. KLIMAITIS. 1984. Observaciones sobre nidificación asociada de *Charadrius collaris*, *Sterna superciliaris* y *Rynchops nigra* en el Río Uruguay, Entre Ríos Argentina. El Hornero, 12 (3): 197-202.

NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.

Recibida: julio de 1997.

Comunicaciones

Revista Nuestras Aves, 38: 12.

PRIMER REGISTRO DEL CANASTERO PÁLIDO (*Asthenes modesta*) EN EL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI, PROVINCIA DE NEUQUÉN, ARGENTINA

Daniel E. Feinstein

Cailla de Correo 984, (8.400) San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. Correo electrónico: feinstei@bariloche.com.ar

El 25 de febrero de 1997 a primeras horas de la tarde, vimos un ejemplar de *Asthenes modesta* caminando con saltitos entre piedras, sobre la margen izquierda del río Limay, 3 km aguas abajo del paraje Villa Llanquín, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia del Neuquén.

Pudimos observar claramente el estriado debajo de la mancha gular, una delgada franja superciliar, y también las timoneras rufas y negras. Emitía agudos, breves y continuos "pit" (en coincidencia con lo descrito en la bibliografía). Se posó sobre un *Verbascum thapsus* y, al notarse observado, desapareció detrás de unos arbustos.

El canastero pálido se distribuye en la Argentina desde la Puna, en el noroeste del país, hasta el sur de la Patagonia (Olrog, 1979). Sin embargo, la especie no estaba citada para el Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi (Christie *et*

al., 1988; Chehébar y Ramilo, 1989).

Agradezco a Eduardo Ramilo por el aporte de datos; a Mariano Gelain por su estímulo para la redacción de este informe; y a mi esposa Judith por su apoyo, paciencia y manejo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CHEHÉBAR, C. y E. RAMILO. 1989. Fauna del Parque Nacional Nahuel Huapi. 38 páginas.

CHRISTIE, M. I., E. RAMILO y M. BETTINELLI. 1988. Las aves de los parques nacionales norpatagónicos y zonas adyacentes. Administración de Parques Nacionales, San Carlos de Bariloche.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

Recibida: mayo 1997.

Revista Nuestras Aves, 38: 12-14.

NOTAS BREVES SOBRE AVES DE LA ARGENTINA Y PAÍSES VECINOS

por Marcos Babarskas y Juan Carlos Chebez
(compilación y comentarios)

En reiteradas oportunidades socios y amigos de la Asociación Ornitológica del Plata han enviado cartas comentando registros interesantes de aves para el cono sur de América, sin responder a la forma clásica de artículos y comunicaciones. A través de esta nueva sección de Nuestras Aves damos a conocer esa información inédita recibida. En general

los datos corresponden a novedades ornitogeográficas, pero también recibimos registros de nidos, datos de comportamiento, y otros aspectos de la vida de las aves.

Nuestra tarea como compiladores será la de seleccionar y comentar lo novedoso de ese material citando desde ya la fuente y confrontándolo con la bibliografía necesaria.