

NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA LA PROVINCIA DE NEUQUEN

Marcos Babarskas¹, Jorge Veiga² y Fernando Filiberto²

Con motivo de la elaboración de un trabajo sobre un listado y distribución de las aves de la provincia de Neuquén (presentado en la Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata, Puerto Iguazú, Misiones, sep 1993), los autores vienen realizando relevamientos en distintas partes de la provincia. Algunos de los registros más interesantes, son volcados en esta nota.

Se trata de 17 especies de las cuales 8 carecían de citas previas para la provincia. Las 9 especies restantes, si bien son mencionadas en la bibliografía para Neuquén, carecían de datos concretos.

Los nombres de los departamentos a los que pertenecen las localidades sólo son mencionados la primera vez que aparecen en el texto.

***Bubulcus ibis* - Garcita Bueyera**

Esta especie de reciente aparición en Argentina, no cuenta con datos concretos para Neuquén, a pesar que Narosky e Yzurieta (1987) y Canevari *et al.* (1991) la mapean para la provincia. Es mencionada sin fecha para el Parque Nacional (PN) Laguna Blanca, Ramilo *et al.* (1993).

Cuatro ejemplares en vuelo fueron observados en Vista Alegre Norte, depto. Confluencia, el 11 abr 1993, y una pareja en Plottier, depto. Confluencia, el 28 ene 1994. G. Iglesias (E. Ramilo *in litt.*) observó una bandada de 50 a 60 individuos en San Martín de los Andes, depto. Lácar.

Se confirma así su presencia en la provincia.

***Heteronetta atricapilla* - Pato Cabeza Negra**

Narosky e Yzurieta (1987) y Canevari *et al.* (1991) no la mapean para la provincia. Ramilo *et al.* (1993) la registran sin fecha para el PN Laguna Blanca.

El 21 ene 1994 se observó un macho en una lagunita próxima al lago Aluminé (600 m s.n.m.), depto. homónimo.

Corresponderían entonces sólo dos citas para Neuquén.

***Parabuteo unicinctus* - Gavilán Mixto**

Si bien la distribución de esta especie parece alcanzar Neuquén (Olrog 1979, Narosky e Yzurieta 1987 y Canevari *et al.* 1991), no existen datos concretos al respecto.

Una pareja se observó en las proximidades de Loncopué (1400 m s.n.m.), depto. homónimo, el 17 ene 1990. Además se halló un nido con pichones en un sauce a 12 m de altura, a la vera de un arroyo. M. Christie (E. Ramilo *in litt.*) la registró en el aeropuerto Chapelco, depto. Lácar, sin fecha determinada.

Se concreta así su presencia y nidificación en la provincia.

***Buteo albigula* - Aguilucho Andino**

Fjeldsa y Krabbe (1990) lo definen como raro en Sudamérica, y lo mencionan para el oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut, basándose probablemente en Olrog (1972). Según Navas y Manghi (1991) no existían registros de la especie para Neuquén; Casas y Gelain (1995) publican las primeras observaciones para esta provincia.

El 11 ene 1994 se observó un ejemplar, al parecer realizando vuelo

nupcial, en el lago Villarino (700 m s.n.m.), PN Nahuel Huapi, depto. Lácar. N. Rey (com. pers.) registró un juvenil en un bosque de coihue (*Notofagus dombeyi*) en el lago Correntoso (500 m s.n.m.), PN Nahuel Huapi, depto. Los Lagos, el 24 feb 1994; y E. Rivero (com. pers.) otro ejemplar en el lago Paimún, PN Lanín, depto. Huiliches, el 9 feb 1994.

Estos registros amplían la distribución conocida de la especie en Neuquén, siendo la cita para Lago Paimún la más septentrional para el bosque subantártico.

***Himantopus melanurus* - Tero-real**

Olrog (1979) y Canevari *et al.* (1991) lo mencionan para la provincia. Narosky e Yzurieta (1987) mapean la especie para casi todo Neuquén, basándose en un registro visual de diez ejemplares en Aguada del Overo, depto. Catan Lil, el 5 feb 1977 (T. Narosky com. pers.). Por último Ramilo *et al.* (1993) lo citan para el PN Laguna Blanca.

Seis ejemplares en un bañado con vegetación acuática fueron hallados en las cercanías de Añelo (500 m s.n.m.), depto. homónimo, el 28 ene 1994; y cuatro individuos en la laguna San Antonio, PN Laguna Blanca, depto. Zapala, el 18 ene 1995.

Con estos avistajes queda confirmada su presencia en Neuquén.

***Columba picazuro* - Paloma Picazuró**

Al parecer ningún autor mapea ni menciona la especie para la provincia.

Todos los avistajes se realizaron en arboledas de sauces y álamos: Vista Alegre Norte y Centenario, depto. Confluencia, 11 abr 1993, un ejemplar en cada oportunidad; Plottier, una pareja el 8 abr 1993, y un individuo el 7 ene 1994; Bajada del Agrio (400 m s.n.m.), depto. Picun-

ches, 10 abr 1993, un ejemplar; y Picún Leufú, depto. homónimo, 6 mar 1992, otros cinco.

Estos serían entonces los primeros registros para Neuquén.

***Columba maculosa* - Paloma Manchada**

Si bien algunos autores mencionan o mapean la especie para la provincia, al parecer no existen citas concretas al respecto.

El 11 abr 1993 se registró un ejemplar en Centenario; otro en Picún Leufú, el 12 ago 1993; y uno en Plottier, el 16 ene 1994.

Se confirma de esta manera su presencia en la provincia.

***Patagona gigas* - Picaflor Gigante**

La especie es nombrada o mapeada en Argentina desde el norte y por el oeste hasta Mendoza (Narosky e Yzurieta 1987, Fjeldsa y Krabbe 1990, Canevari *et al.* 1991).

El 4 mar 1992 se observaron dos individuos posados en arbustos de una ladera junto a *Oreotrochilus leucopleurus*, a 15 km al Este de Copahue, en las cercanías de la cascada del río Agrio (1500 m s.n.m.), depto. Norquén.

Estos registros son los primeros para Neuquén y los más australes para la Argentina.

***Pseudoseisura lophotes* - Cacholote Castaño**

Al parecer ningún autor menciona ni mapea la especie para Neuquén.

Una pareja fue registrada en Plottier, el 8 abr 1993; y otra en Centenario, el 11 abr 1993, junto a un nido. Este último se hallaba en una trifurcación de un nogal, a 6 m del suelo, y fue construido con ramitas de vid, obtenidas de las plantaciones cercanas.

Este registro resulta novedoso por

ser el primero para Neuquén, y además por encontrar la especie establecida en plantaciones frutícolas.

***Pyrocephalus rubinus* - Churrinche**

A 300 m del río Limay, en las proximidades de Plottier, se observó un macho el 16 ene 1994.

Este registro es el primero para Neuquén.

***Tyrannus savana* - Tijereta**

En todos los casos, un ejemplar en árboles como álamos, sauces y olmos: Plottier, 7 ene 1994; Cutral-Có (500 m s.n.m.), depto. Confluencia, 27 ene 1994; y Dique Portezuelo Grande, depto. Confluencia, 28 ene 1994.

Constituyen estas las primeras citas para Neuquén.

***Phytoloma rutila* - Cortarramas**

Una pareja observada en Centenario el 11 abr 1993, y dos ejemplares en un álamo en Plottier, el 16 ene 1994.

Estos registros son los primeros para Neuquén.

***Progne elegans* - Golondrina Negra**

Narosky e Yzurieta (1987) y Canevari *et al.* (1991) la mapean para el este de Neuquén. Por su parte Ramillo *et al.* (1993) la citan para el PN Laguna Blanca.

Registros: intersección de la ruta nacional 22 con el arroyo Covunco, depto. Zapala, 12 ene 1993, cuatro ejemplares; puente Picún Leufú sobre la ruta nacional 40 (800 m s.n.m.), depto. Catan Lil, 13 ene 1993, tres individuos; 100 km al oeste de Añelo, sobre la ruta provincial 7, en el depto. homónimo, 17 feb 1993, cuatro ejemplares (J. C. Chebez y S. Heinonen Fortabat com. pers.); La Bomba (800 m

s.n.m.), depto. Catan Lil, 20 ene 1994, tres individuos; Dique Portezuelo Grande, 28 ene 1994, cinco ejemplares; y otro en el PN Laguna Blanca, el 16 ene 1993.

Se confirma así su presencia en Neuquén.

***Mimus saturninus* - Calandria Grande**

Un ejemplar en la ciudad de Zapala, depto. homónimo, el 11 feb 1991, y dos en Plottier, el 8 abr 1993.

Estas observaciones constituyen las primeras citas para Neuquén.

***Sicalis flaveola* - Jilguero Dorado**

El 27 ene 1994 una pareja fue registrada en Cutral-Có, siendo este el primer dato para la provincia.

***Poospiza ornata* - Monterita Canela**

Una pareja fue fotografiada a 300 m del río Limay, en ambiente de Monte con jarillas (*Larrea sp.*), en Plottier el 16 ene 1994.

Este registro es el primero para Neuquén y el más austral para la especie.

***Molothrus badius* - Tordo Músico**

Si bien diversos autores mencionan o mapean la especie para Neuquén, sólo Nores e Yzurieta (1982) señalan un dato preciso para Picún Leufú.

Registros: Plottier, 8 abr 1993, seis ejemplares; Centenario, 11 abr 1993, una pareja; Neuquén, depto. Confluencia, 7 y 28 ene 1994, en ambas oportunidades una pareja; Codihué (800 m s.n.m.), depto. Picunches, 22 ene 1994, tres ejemplares; y Cutral-Có, 27 ene 1994, cuatro individuos.

Se confirma así su presencia en la provincia.

Agradecemos a Juan Carlos Che-

bez, Sofía Heinonen Fortabat, Tito Narosky, Eduardo Ramilo, Nicolás Rey y Eduardo Rivero, por el aporte desinteresado de sus datos y el apoyo en general.

BIBLIOGRAFIA

- Canevari, M., P. Canevari, G. R. Carrizo, G. Harris, J. Rodríguez Mata y R. J. Straneck. 1991. Nueva Guía de las Aves Argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar, Buenos Aires.
- Casas, A. E. M. A. Gelain. 1995. Nuevos datos acerca del estatus del Aguilucho Andino *Buteo albigula* en la Patagonia Argentina. *Hornero* 14: 40-42.
- Fjeldsa, J. y N. Krabbe. 1990. Birds of the High Andes. Zool. Mus. Univ. of Copenhagen and Apollo Books. Denmark.
- Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- Navas, J. R. y M. S. Manghi. 1991. Notas sobre *Buteo ventralis* y *Buteo albigula* en la patagonia argentina (Aves: Accipitridae). *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., Zool.* 15: 87-94.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte III. *Hist. Nat.* 2: 151-152.
- Olog, C. C. 1972. Adiciones a la avifauna argentina. *Acta Zool. Lilloana* 26: 257-264.
- . 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Op. Lilloana* 27: 1-324.
- Ramilo, E. J., C. E. Chehebar y S. Mazzucchelli. 1993. Plan General de Manejo. Parque Nacional Laguna Blanca. Adm. de Parques Nacionales. Inf. Inéd.

Recibida: febrero de 1995

1 Adm. de Parques Nacionales, Santa Fe 690; 1059 Buenos Aires.

2 AOP, 25 de Mayo 749, 20 6; 1002 Buenos Aires.

REGISTRO CONCRETO DE NIDIFICACION DEL ESTORNINO PINTO (*STURNUS VULGARIS*) EN LA ARGENTINA

Eduardo M. Rivero¹, Bernardo Lartigau², Pablo H. Caridad¹ y Patricio Ramírez Llorens¹

El Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) es una especie originaria de Europa y Asia.

Los primeros registros para la Argentina son de Pérez (1988) quién lo observó entre fines de 1987 y agosto de 1988 en la Capital Federal; Schmidtutz y Aguilán (1988) observaron a un Estornino Pinto llevando alimento a un hueco en un árbol en la localidad de Bernal, y en setiembre de 1990 M. Babarskas y J. Veiga (Di Giacomo *et al.* 1993 y Babarskas *com. pers.*) vieron varios ejemplares en Costanera Sur, algunos llevaban comida al interior de focos en las torres de iluminación en el predio de la empresa Covimet lindante con la Reserva Ecológica.

El 10 oct 1993 observamos varios estorninos alimentándose en un sector con gramíneas junto a *Molothrus bonariensis*. Uno llevaba alimento a una grúa abandonada y otro a una torre de iluminación (las mismas a las que se refirieron Babarskas y Veiga) distante a unos 100 m del lugar de alimentación.

En el extremo de la torre, dentro de un foco roto a 21 m de altura encontramos un nido en actividad. Construido con gramíneas y algunas plumas largas, era de forma cónica, aspecto desprolijo y estaba contenido por las paredes del foco. Las medidas eran las siguientes: altura 23 cm, diámetro externo 15 cm, diámetro interno 13 cm y profundidad 7 cm. En su interior en-

contramos un huevo, dos pichones e insectos que tal vez se utilizaron para alimentación de los mismos. No encontramos excrementos, hecho citado por Bent (1950) para la especie.

El huevo no era fértil y medía 31,4 x 21,9 mm. Su forma era ovooidal y el color celeste claro. Estos datos concuerdan con los de Bent (1950) para huevos de EEUU y Gran Bretaña.

Los pichones, de unos 7 cm de longitud, tenían poco plumón gris y la piel rosada; los ojos cerrados y la comisura rictal amarilla.

Con estos datos queda confirmada la nidificación de *S. vulgaris* en la Argentina.

BIBLIOGRAFIA

- Bent, A. C. 1950. Life histories of North American Wagtails, Shrikes, Vireos and Their Allies. U.S. Natl. Mus. Bull. 197.
- Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo y M. Babarskas. 1993. Nuevos registros de *Sturnus vulgaris* y *Acridotheres cristatellus* en Buenos Aires. *Nuestras Aves* 29: 32-33.
- Pérez, J. H. 1988. Estornino Pinto en la Capital Federal. *Nuestras Aves* 17: 13.
- Schmidtutz, C. y C. Aguilán. 1988. Nidificación del Estornino Pinto. *Nuestras Aves* 17: 14.

Recibida: marzo de 1995

1 AOP, 25 de Mayo 749 2º 6; 1002, Buenos Aires.

2 Julián Alvarez 85; 1744, Moreno, Buenos Aires.

COMPILACION DE LOS NIDOS CONOCIDOS DE LA MONJITA CHOCOLATE (*NEOXOLMIS RUFIVENTRIS*)

Aníbal E. Casas¹