

## PRESENCIA DE LA CALANDRITA (*Stigmatura budytoides*) EN FORMOSA, ARGENTINA

Mariano Ordano

Instituto Nacional de Limnología (INAL-CONICET). J. Maciá 1933, (3016) Santo Tomé, Provincia de Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: inaliarcrde.edu.ar

La calandrita habita en arbustales áridos y bosques chaqueños de Brasil, Bolivia, Paraguay y la Argentina (Ridgely y Tudor, 1994). Hasta el presente, era incierto si su estatus en Formosa era el de un visitante estival o el de residente permanente. En este trabajo, se busca aclarar su estatus de residencia en dicha provincia a partir de nueva información.

El estudio se basa en las observaciones obtenidas en quince campañas entre noviembre de 1993 y mayo de 1995, como parte de un trabajo más extenso sobre la avifauna formoseña.

La calandrita fue registrada sola, en parejas y pequeños grupos de tres a cuatro individuos en las siguientes localidades y fechas:

Departamento Patiño= 1) Pozo de Navagán (24° 06' S, 59° 58' O), del 10 al 22 de junio de 1994; 2) Riacho Monte Lindo, 4 km al norte de Estanislao del Campo (25° 01' S, 60° 03' O), del 3 al 6 de agosto de 1994; 3) J. G. Bazán (24° 32' S, 60° 51' O) 6 de septiembre de 1994; 4) 6 km al oeste de Km 15 (24° 17' S, 60° 01' O), del 16 de diciembre de 1994; 5) San Miguel (24° 16' S, 60° 14' O) y Pozo Hondo (24° 18' S, 60° 16' O), del 19 de diciembre de 1994. Departamento Bermejo= 6) Pozo del Mortero (24° 26' S, 61° 04' O), del 28 al 30 de julio de 1994; 7) 5 km al norte de Laguna Yema (24° 33' S, 61° 14' O), del 7 de septiembre de 1994; 8) Fortín Leyes (24° 15' S, 59° 23' O) y Colonia San Isidro (24° 30' S, 59° 33' O), 13 de diciembre de 1994; 9) El Remanso (24° 02' S, 60° 30' O), del 17 al 19 de diciembre de 1994; 10) Los Chiriguano (24° 06' S, 61° 27' O), del 24 al 25 de enero de 1995; 11) Laguna Yema (24° 17' S, 61° 16' O), del 25 al 28 de marzo de 1995; 12) aproximadamente 20 km al sur de Laguna Yema (24° 23' S, 61° 22' O), del 28 al 30 de marzo de 1995.

En una oportunidad (el registro 7), fue colectado un macho (permiso de caza según nota 53/94 de la Dirección de Fauna de Formosa). Cuyo tamaño testicular indicaba actividad reproductiva (medidas: 3,1x1,1 mm y 2,9x1,0 mm).

Como fue mencionado anteriormente la información sobre la presencia de la calandrita en Formosa es confusa y algo contradictoria. Olrog (1959, 1984). De la Peña (1978/1979) y Canevari *et al.* (1991) incluyeron esta provincia en la distribución de la especie, pero no comentan acerca de su estatus de residencia. Contreras (1987) la incluye en la lista preliminar de aves de Formosa indicando que no existen citas de ejemplares ni de observaciones personalizadas. De acuerdo a Wetmore y Peters (1923), Olrog (1979), Meyer de Schauensee (1982) y De la Peña (1988), la calandrita migra en otoño desde la parte austral de su distribución a las provincias del norte argentino. Steibacher (1962) encontró esta especie en Formosa en invierno y Meyer de Schauensee (1966) menciona a la provincia como área de invernada. Por otro lado, Ridgely y Tudor (1994) consideran que la calandrita probablemente no migre.

En la opinión del autor, las evidencias expuestas (presencia a lo largo de todo el año en una amplia región y actividad reproductiva) favorecen la interpretación de considerar a la calandrita como un residente permanente en Formosa. Es más, la calandrita es regularmente abundante y frecuente en la región seca del centro y oeste formoseño y probablemente esté presente en la provincia del Chaco.

Esta interpretación coincide con lo señalado por Nores *et al.* (1991) y de Hayes (1995) quienes consideran a esta ave como una residente permanente y que cría en las regiones vecinas de Santiago del Estero (Argentina) y Chaco Boreal (Paraguay), respectivamente.

Obviamente, las poblaciones australes de la Argentina pueden migrar durante el invierno hacia regiones con condiciones climáticas más favorables.

Agradezco al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por el apoyo financiero, a L. Biancucci y J. L. Baldo por la colaboración en el trabajo de campo y a J. C. Paggi, A. H. Beltzer y A. R. Giraud por los comentarios sobre el manuscrito.

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CANEVARI, M. P., CANEVARI, G., CARRIZO, G., HARRIS, J., RODRIGUEZ MATA y R. STRANCK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.
- CONTRERAS, J. R. 1987. Lista preliminar de la avifauna de la Provincia de Formosa, República Argentina. *Historia Natural*, 7 (4): 33-51.
- DE LA PEÑA, M. R. 1978/1979. Enciclopedia de las aves argentinas. Editorial Colmegna. Santa Fe, 8 fascículos.
- DE LA PEÑA, M. R. 1988. Guía de aves argentinas. Tomo V. L.O.L.A. Buenos Aires, 117 páginas.
- HAYES, F. E. 1995. Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay. *American Birding Association, Monographs in Field Ornithology*, N° 1, 230 páginas.
- MEYER DE SCHAUSENSEE, R. 1966. The species of birds of South America and their distribution. *Philadelphia Acad. Nat. Sc. Philadelphia*, 577 páginas.
- MEYER DE SCHAUSENSEE, R. 1982. A guide to the birds of South America. *Intercollegiate Press Inc. Philadelphia*, 498 páginas.
- NORES, M. D., YZURIETA y S. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 59 (3-4): 157-196.
- OLROG, C. 1959. Las aves argentinas. Una guía de campo. Univ. Nac. de Tucumán e Inst. Miguel Lillo. Tucumán, 345 páginas.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.
- OLROG, C. C. 1984. Las aves argentinas. Una nueva guía de campo. Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 352 páginas.
- RIDGELY, R. y G. TUDOR. 1994. The birds of South America. Volume II: The suboscine passerines. Univ. of Texas Press, Austin, Texas, 814 páginas.
- STIENBACHER, J. 1962. Beiträge zur Kenntnis der Vögel von Paraguay. *Abhandl. Senckenbergischen Naturf. Gesell.*, 502: 1-106.
- WETMORE, A. y J. L. PETERS. 1923. New genera and subspecies based on Argentine birds. *Proc. Biol. Soc. Washington*, 36: 143-145.

Recibida: junio de 1997

Revista Nuestras Aves 29: 13-14.

## NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA LA PROVINCIA DE CHUBUT, ARGENTINA

Marcos Babarskas<sup>1</sup> y Pedro Flombaum<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Administración de Parques Nacionales. Av. Santa Fe 690, (1059) Buenos Aires, Argentina.

<sup>2</sup>Asociación Ornitológica del Plata. 25 de Mayo 749 2° piso 6, (1002) Buenos Aires, Argentina.

En esta breve comunicación se dan a conocer registros de tres especies de aves para la provincia de Chubut, una de las cuales es nueva para la provincia. Las tres especies fueron observadas en la Estancia La Gloria cuando se efectuaba un relevamiento de los recursos naturales y culturales, tarea encomendada por los dueños del predio a la Asociación Ornitológica del Plata. Durante la visita se pudieron registrar un total de 76 especies de vertebrados, de las cuales 60 fueron aves (Babarskas y Flombaum, 1997).

La Estancia está ubicada en el noroeste de la provincia de Chubut, departamento Cushamen, a 14 km al sudeste de la localidad de Paso del Sapo. Desde el punto de vista fitogeográfico, se encuentra en la Provincia Patagónica, Distrito Central (Cabrera, 1976).

**Chorlito de Collar (*Charadrius collaris*)**

Olog (1979) la indica para la Argentina desde el norte hasta Mendoza y Río Negro. Narosky e Yzurieta (1987) la mapean desde el norte hasta la provincia de Río Negro, en tanto que Canevari *et al.* (1991) la mencionan para el norte y centro del país "hasta Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Mendoza".

Gelain (1984) la menciona para el oeste de Río Negro como visitante estival. Posteriormente Gelain y Casas (1986) vuelven a citarla en Río Negro, y comentan que existen controversias de acuerdo a la bibliografía consultada sobre la distribución de la especie en esa provincia, sin mencionar registros más meridionales.

El 20 de enero de 1997 un ejemplar fue observado en una playa costera del río Chubut, próxima a la Estancia La Gloria. Sería entonces el primer registro para la provincia de Chubut.

**Cortarramas (*Phytotoma rutila*)**

Olog (1979) describe como límite meridional de la especie en la Argentina, la provincia de Río Negro. Según Narosky e Yzurieta (1987) y Canevari *et al.* (1991), la especie se distribuye desde el norte por la zona central hasta la provincia de Río Negro. Por su parte Nores (1986) cita dos ejemplares capturados por C. Olog a 60 km de Colonia Sarmiento, Chubut, y Navas (1994), en base a un ejemplar capturado por A. Kovacs, la menciona para "valle Los Mártires, cerca de Las Plumas, río Chubut".

El 16 de enero de 1997 unos diez ejemplares dispersos, entre machos y hembras (o juveniles), fueron observados en lo alto de arbustos de piquillín (*Condalia microphylla*) y molle (*Schinus sp.*) a orillas del río Chubut, dentro de la Estancia La Gloria. Este sería entonces el tercer registro para la provincia de Chubut, luego de 20 años, ya que las dos citas mencionadas más arriba datan de 1976 y 1978 respectivamente.

**Golondrina Negra (*Progne elegans*)**

Olog (1979) la indica para la Argentina desde Salta, Jujuy y oeste de Formosa hasta Chubut. Tanto Narosky e Yzurieta (1987) como Canevari *et al.* (1991), la registran desde el norte y por el centro hasta el este de Chubut. Zapata (1969) y De Lucca y Saggese (1992) la citan para el nordeste de Santa Cruz.

El 17 de enero de 1997 una pareja volaba a media altura sobre el casco de la Estancia La Gloria. Se confirmaría entonces su presencia en el oeste de la provincia de Chubut.

Agradecemos a los dueños de la Estancia La Gloria, Diana y Paul Garrard por brindarnos una cálida estadía, y a Andrés Bosso por las sugerencias para la confección de esta nota.

**BIBLIOGRAFÍA CITADA**

- BABARSKAS, M. y P. FLOMBAUM. 1997. Estancia la Gloria, provincia de Chubut, Argentina. Informe de un relevamiento de sus valores naturales. Asociación Ornitológica del Plata. Informe Inédito. Buenos Aires, 20 páginas.
- CABRERA, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. Enciclopedia argentina de agricultura y jardinería, tomo 2 (fasc. 1). Editorial ACME S.A.C.I., Buenos Aires, 85 páginas.
- CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. R. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R. J. STRANECK. 1991. Nueva guía de las Aves Argentinas. Tomo II. Fundación Acindar.
- DE LUCCA, E. R. y M. D. SAGGESE. 1992. Aves del departamento Deseado, Santa Cruz. Hornero 13(3): 259-260.
- GELAIN, M. 1984. Aves de ribera del curso inferior y desembocadura del río Niriuhau. Nuestras Aves, 4: 26-27.
- GELAIN, M. y A. CASAS. 1986. Nueva distribución para el Chorlito de Collar. Nuestras Aves, 11: 7-8.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.
- NAVAS, J. R. 1994. Aves nuevas o poco comunes de la Patagonia. Neotrópica, 40: 93-94.
- NORES, M. 1986. Nuevos registros para aves de Argentina. Hornero, 12 (4): 304-307.
- OLOG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.
- ZAPATA, 1969. Aves observadas en el Golfo San Jorge, provincias de Chubut y Santa Cruz, Argentina. Zoología Platense, 1 (5): 7 páginas.

Recibida: julio 1997.

**FE DE ERRATAS****ANTECEDENTES DEL TACHURI CANELA EN LA PAMPA Y MENDOZA**

En el artículo de Maceda *et al.* (1997) se comunicaba un registro del tachurí canela (*Polystictus pectoralis*) para La Pampa, indicándose que la especie sólo había sido mencionada para la provincia sin mayores detalles. En realidad Collar y Wege (1995) citan un ejemplar procedente de General Pico, La Pampa, capturado en 1935, depositado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".

Por otro lado, también se decía en la nota referida que la observación publicada del tachurí canela sería la más occidental conocida, dado que de Mendoza sólo había menciones sin otras referencias. Sin embargo, existía un antiguo registro para esta provincia, seguramente la base de las menciones aludidas, obtenido en Potrerillos el 17 de marzo de 1921, el cual está depositado en el Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos (Peters, 1923).

**BIBLIOGRAFÍA CITADA**

- COLLAR, N. J. y D. C. WEGE. 1995. The distribution and conservation status of the Bearded Tachuri *Polystictus pectoralis*. Bird Conservation International, 5: 367-390.
- MACEDA, J. J., M. S. KIN y F. TITTARELLI. 1997. Nuevos registros de aves para la Provincia de La Pampa, Argentina. Nuestras Aves, 37: 4-5.
- PETERS, J. L. 1923. Dos aves nuevas para la fauna mendocina. El Hornero, 3: 197-198.

**Nota a los autores:** para enviar artículos a **Observaciones de Campo** se recomienda seguir los lineamientos detallados en *El Hornero*, tomar como modelo el presente número y adjuntar disco con el trabajo en procesador de texto de uso corriente (Word, WordPerfect o similares). Sugerimos incluir las coordenadas de las localidades mencionadas. Los trabajos recibidos para *Observaciones de Campo* son mencionados en *A Vuelo de Pájaro*.