

REY DEL BOSQUE (*Pheucticus aureoventris*) EN EL CHACO OCCIDENTAL ARGENTINO

Juan Carlos Chebez¹ y Hernán Casañas²

¹ Delegación Técnica Regional Noreste, Administración de Parques Nacionales. Av. Victoria Aguirre 66 (3.370) C.C. 54, Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, Argentina

² Asociación Ornitológica del Plata, Delegación Córdoba, C.C. 9 (5.178) La Cumbre, Provincia de Córdoba, Argentina

En una reciente prospección de áreas naturales de interés conservacionista efectuada por el primero de los autores, en compañía de Ariel Soria, Javier Lima, Eduardo Gaura y Alberto Sánchez se recorrió la Reserva Provincial Fuerte Esperanza, ubicada al norte de esa localidad, departamento General Güemes, provincia de Chaco. Allí el 27 de febrero de 1997 se detectó, en el límite norte de la reserva, un ejemplar hembra de rey del bosque a media altura alimentándose de semillas de un arbusto del género *Acacia*.

En La Pirámide y Pirámide del Triunfo, departamento Almirante Brown, provincia de Chaco, localidades vecinas a la Reserva Provincial Copo, provincia Santiago del Estero, se detectó una hembra del rey del bosque el 10 abril de 1997. Recorría el estrato medio de un bosque de quebracho colorado santiagueño (*Schinopsis quebracho-colorado*) y quebracho blanco (*Aspidosperma quebracho-blanco*) con abundancia de especies de los géneros *Acacia* y *Capparis*. El ejemplar se acercó luego de reproducir la voz ("playback") del caburé chico (*Glaucidium brasilianum*), tras lo cual emitió una metálica voz de alarma que pudo ser grabada. El 11 y 13 de abril de 1997 se volvió a registrar la especie, en bandadas mixtas junto al suirirí común (*Suiriri suiriri*) y el pitiajumí (*Parula pitiajumí*), a una distancia mayor a 10 km del lugar de la observación del 10 abril, por lo que creemos que se trataba de distintos individuos. Cabe destacar que en ningún caso se observaron machos adultos. Los registros fueron efectuados junto a Luis Volkman y Juan Klavins.

Otra observación de la especie se realizó el 12 de abril 1997 en la Reserva Natural Formosa, cerca de la orilla del río Teuco o Bermejo, departamento Bermejo, provincia de Formosa, a unos 56 km al sur de la localidad de Ingeniero Juárez. El avistaje fue efectuado en compañía de Hugo Chaves, Marcelo Almirón y el guardaparque nacional Germán Peña. El ejemplar era una hembra y se observó muy pasivo a poca altura en un bosque xerófilo bajo, con predominio del árbol conocido como duraznillo (*Ruprechtia triflora*).

En la Argentina la especie es característica de las yungas, chaco serrano y quebradas húmedas (Narosky e Yzurieta, 1987; Canevari *et al.*, 1991), aunque Olrog (1984) la mapea para el centro norte de la Argentina como un visi-

tante migratorio. Cuenta con registros de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca (Olrog, 1979); La Rioja (Koslowsky, 1895), San Juan (Haene *et al.*, 1995), San Luis (Navas, 1959; Contreras, 1979; y Masramón, 1979), Córdoba (Nores *et al.*, 1983; Nores, 1996) y Santiago del Estero, sólo para la Sierra de Guasayán (Nores e Yzurieta, 1982; Nores *et al.*, 1991). Las citas de Buenos Aires corresponderían a ejemplares escapados según Narosky y Di Giacomo (1993). En Santa Fe existe un registro de Laguna La Blanca, departamento San Justo, un área de neta influencia chaqueña, en diciembre 1986, efectuado por Gustavo Marino y Mariano Ordano (com. pers.). Existe un ejemplar capturado el 22 de octubre de 1951 en Ingeniero Juárez, Formosa (Esteban, 1953).

Hayes (1995) la indica para la región del Alto Chaco que abarca la zona más occidental y seca del Chaco paraguayo, donde es un residente permanente que nidifica, habita bosques con matorrales subhúmedos, relativamente bajos y secos (usualmente xerófitos). Cabe destacar que Short (1975) considera a las especies del género con una fuerte tendencia a ambientes xerófilos.

Nuestros avistajes constituyen los primeros registros de la especie para la provincia de Chaco y el segundo para Formosa. Por lo visto, la especie también alcanza en la Argentina el Impenetrable chaqueño, casi tan al oriente como lo hace en Paraguay.

Queda pendiente la confirmación de su límite oriental de distribución en las provincias de Chaco y Formosa y la prospección del norte santiagueño y santafesino en busca de nuevos registros para confirmarlo en esas áreas. Tratándose de una especie de alto interés en el comercio de aves de jaula toda información detallada de su distribución y ecología se torna sumamente imperiosa.

Los autores agradecen a sus acompañantes la ayuda proporcionada en el campo, a la Administración de Parques Nacionales la oportunidad de visitar estos sitios alejados y poco prospectados, muy especialmente a Ariel Soria y Javier Lima que organizaron las campañas de relevamiento al Impenetrable Chaqueño y a Mariano Ordano por permitirnos disponer del registro inédito de Santa Fe. También a Hugo A. Chaves por la ayuda en el tipeado del manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.
CONTRERAS, J. 1979. Avifauna puntana. I. Algunas especies nuevas o poco conocidas para la provincia de San Luis. *Historia Natural*, 1 (3): 9-12.
ESTEBAN, J. 1953. Nuevas localidades para aves argentinas. *Acta zoológica lilloana*, 13: 349-362.
HAENE, E., S. KRAPOVICKAS, F. MOSCHIONE y D. GÓMEZ. 1995. Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la provincia de San Juan, Argentina. *Hornero*, 14 (1 y 2): 48-52.
HAYES, F. E. 1995. Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay. American Birding Association, Monographs in Field Ornithology, Nº 1, 230 páginas.
KOSLOWSKY, J. 1895. Enumeración sistemática de las aves de Chilecito, provincia de La Rioja. *Rev. Mus. La Plata*, 6: 277-287.
MASRAMÓN, D. O. de. 1979. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Tercera parte. *Hornero*, 12 (1): 59-68.
NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.
NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.

NAVAS, J. 1959. Lista preliminar de aves del Parque Nacional Comechingones. *Anales Parques Nacionales*, 8: 77-79.
NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. H. Bucher (editores), "Biodiversidad de la provincia de Córdoba": 255-337. Córdoba, 378 páginas.
NORES, M. y D. YZURIETA. 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte II. *Historia Natural*, 2 (13): 101-104.
NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 56 (1-2): 1-114.
NORES, M., D. YZURIETA y S. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 59: 157-196.
OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.
OLROG, C. C. 1984. Las aves argentinas. Una nueva guía de campo. Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 352 páginas.
SHORT, L. L. 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 154: 167-352.

Recibida: julio 1997

Revista Nuestras Aves 40: 8.

PINGÜINO DE BARBIJO (*Pygoscelis antarctica*) Y PINGÜINO REY (*Aptenodytes patagonicus*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Silvina Bachmann

Laboratorio de Vertebrados, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata.
Funes 3.250 (7.600) Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

En abril de 1993, mientras trabajaba en un centro de recuperación de aves marinas de Miramar, apareció en las playas, entre Miramar y Mar del Sur, un ejemplar adulto del pingüino de barbijo (*Pygoscelis antarctica*). Se encontraba muy débil y sin rastros de petróleo. Se lo trató de recuperar pero a los tres días murió, posiblemente debido a las altas temperaturas registradas en esos días.

Esta especie cría en la Antártida e Islas del Atlántico Sur y el resto del año es pelágica en océanos australes (Canevari *et. al.*, 1991), llegando en la Argentina hasta las Islas Malvinas (Clark, 1986). Sus movimientos invernales son poco conocidos, sólo existen registros de individuos aislados en Australia e Islas MC Quaire, Tasmania, Crozet y Gough (Serventy *et al.*, 1971, en Harrison, 1983; del Hoyo *et al.*, 1992).

En noviembre de 1992 recibí un ejemplar adulto de pingüino rey (*Aptenodytes patagonicus*) que había sido encontrado en las playas de Miramar. No tenía petróleo y se encontraba aparentemente en buen estado. Fue alimentado, se le dieron vitaminas y luego de dos días fue liberado.

La distribución invernal y pelágica de la especie llega hasta la latitud de la provincia de Buenos Aires (Narosky y Yzurieta, 1987), donde ha sido citada sólo en tres oportunidades para las costas: Bataglia y Salerno en 1986, Fia-

meni en 1992 y Fangauf (Narosky y Di Giacomo, 1993). Es probable que se trate de una especie que aparezca más frecuentemente en las costas bonaerenses de lo que se conoce hasta el momento.

Agradezco a Mariano Martínez por la lectura crítica del manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.
CLARK, R. 1986. Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Guía de campo. LOLA. Buenos Aires, 294 páginas.
DEL HOYO, J. A. ELLIOTT, y J. SARGATAL (eds.). 1992. Handbook of the birds of the world. Vol. 1, Lynx Editions. Barcelona, 696 páginas.
HARRISON, P. 1983. Seabirds: an identification guide. Croom Helm. Ltd. A. H. & A. W. Redd. Bekenham. 448 páginas.
NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.
NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas

Recibida: junio 1997