

La totalidad de los individuos fueron registrados sobre el cauce principal del río, algunos asociados a orillas de canto rodado denominados "pedreros". El número de patos observados y la presencia de pichones nos permite inferir que *Tachyeres patachonicus* no es ocasional en la zona y que la cuenca del valle medio e inferior del río Negro proporciona ambientes adecuados para la reproducción de la especie.

Nuestra contribución permite ampliar el área de distribución conocida hacia el este, hasta unos 30 km aguas arriba de la ciudad de Viedma.

#### BIBLIOGRAFIA CITADA

CABRERA, A. L. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 14 (1-2): 1-42 + 8 láminas.  
CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de la aves argentinas. Tomo I y II Fundación ACINDAR.  
CLARK, R. 1986. Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Guía de cam-

po. LOLA. Buenos Aires, 294 páginas.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.

NAROSKY, T. y M. A. FIAMENI. 1987. Aves de la Costa Bonita. Nuestras Aves, 12: 16-17.

NAROSKY, T., M. A. FIAMENI y H. AGUILAR. 1985. Primer registro de la presencia del pato vapor volador en Buenos Aires. Nuestras Aves, 8: 11.

NAVAS, J. R. 1977. Fauna de agua dulce de la República Argentina. Aves; Anseriformes. Vol. 43, Fasc. 2. F.E.C.I.C.. Buenos Aires, 94 páginas.

PÉREZ, C. H. F. 1996. Lista preliminar de las aves de la zona de Chimpay, Río Negro, Arg.. IX Reunión Argentina de Ornitología, Buenos Aires, Argentina. Libro de resúmenes: 40-41.

PÉREZ, C. H. F. 1997. Pato vapor volador, *Tachyeres patachonicus* (King, 1830) en la cuenca del Río Negro. *Natura Neotropicalis*, 28 (1): 61.

STEULLET A. B. y E. A. DEAUTIER. 1936. Obra del cincuentenario del Museo de La Plata. Tomo I, segunda entrega (Ciconiiformes, Anseriformes y Falconiformes): 257-492.

Recibida: septiembre 1997

Revista Nuestras Aves 40: 11-12.

## AVES NUEVAS O POCO CONOCIDAS PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

J. Kaspar V. Delhey y Martina Carrete

Quillén 75, (8.000) Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina

En la presente nota se dan a conocer algunos registros de aves nuevas o poco citadas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Gran parte de las observaciones corresponden a registros obtenidos en la provincia fitogeográfica del Espinal, distrito del Caldén (Cabrera, 1971), en particular en cercanías del arroyo Chasicó y su desembocadura en la laguna homónima, próxima al ex-Vivero Forestal von Humboldt, hoy perteneciente a la Universidad Nacional del Sur (partido de Villarino). De las restantes, varios registros corresponden a las denominadas "isletas de chañar", pequeños bosquecillos de chañar (*Geoffroea decorticans*) desarrollados por multiplicación vegetativa de una o un par de plantas madre centrales. Este tipo de formación vegetal es muy frecuente en las afueras de la ciudad de Bahía Blanca y podrían ser de gran importancia para la nidificación, alimentación y refugio de especies del Caldenal que ven reducido su hábitat por el desmonte progresivo.

### Aguila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*)

El 19 de julio de 1997 se observó a orillas del arroyo Chasicó, en cercanías de su desembocadura, un juvenil o subadulto de esta especie posado sobre un álamo seco (*Populus* sp.). De comportamiento arisco, levantó vuelo rápi-

damente para volver a posarse sobre unos pinos (*Pinus* sp.), desde donde profería su característico silbido. Se lo volvió a observar al día siguiente, siempre posado sobre vegetación exótica y a considerable altura, y una semana después en circunstancias similares y en el mismo lugar.

Su comportamiento, extremadamente desconfiado, contrasta con la descripción que hacen Narosky e Yzurieta (1987) de esta especie y con observaciones propias anteriores (2 de enero de 1997) de un adulto al lado de la ruta nacional 143, en cercanías de la localidad de Limay Mahuida, provincia de La Pampa.

Se trataría, entonces, del primer registro reciente para la especie en la provincia de Buenos Aires, considerada de presencia hipotética por Narosky y Di Giacomo (1993). Los últimos registros conocidos pertenecen a d'Orbigny (1835/44) y Hudson (1872), ambos para Carmen de Patagones. Delhey (1992) cita dos ejemplares para la localidad de Perú, provincia de La Pampa, siendo éste el registro más cercano conocido.

### Taguató común (*Buteo magnirostris*)

Aunque la distribución conocida de esta rapaz llega hasta la provincia de Río Negro (Narosky e Yzurieta, 1987, Canevari *et al.*, 1991), no se cuenta con registros puntuales

para el sur de la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993).

A continuación se dan a conocer algunas observaciones para los partidos de Bahía Blanca (BB), Tornquist (T) y Villarino (V): 17 de julio de 1991, Sierra de la Ventana (T), tres ejemplares; 21 de julio de 1991, arroyo Sauce Chico (límite entre partidos de Bahía Blanca y Villarino), un individuo; 22 de agosto de 1992, Hilario Ascasubi (V), un ejemplar; 31 de enero de 1993, Villa Ventana (T), un juvenil; 1° de febrero de 1997, laguna Chasicó (V), una pareja; 20 de julio de 1997, camino vecinal en cercanías de Argerich (V), un ejemplar.

### Fiofío silbador (*Elaenia albiceps*)

Se lo registró en dos oportunidades en un barrio residencial de las afueras de la ciudad de Bahía Blanca alimentándose de los frutos de la morera (*Morus alba*): 8 y 9 de noviembre de 1992, un individuo; 3 de noviembre de 1994, cuatro o cinco ejemplares. El primero de estos registros es mencionado en Narosky y Di Giacomo (1993).

La especie cuenta con pocas citas para la provincia de Buenos Aires, siendo las más cercanas para Salinas Chicas, Darregueira (Narosky y Di Giacomo, 1993) y Sierra de la Ventana (Gavio, 1939).

### Viuva (*Pipraeidea melanonota*)

El 12 de agosto de 1997 se observó un ejemplar, posiblemente una hembra por lo pálido del plumaje, en un barrio residencial de las afueras de la ciudad de Bahía Blanca. El individuo, observado a escasos metros, se alimentaba de larvas de lepidóptero sobre una planta de falso mburucuyá (*Passiflora coerulea*).

La especie, considerada ocasional para el territorio bonaerense por Narosky y Di Giacomo (1993), cuenta sólo con registros para la zona ribereña en el noreste de la misma, siendo éste el nuestro el más austral conocido. Cabe la posibilidad de que se trate de un ejemplar escapado de cautiverio. Sin embargo, nunca se constató la venta de esta especie en las pajarerías de la ciudad.

### Brasita de fuego (*Coryphospingus cucullatus*)

El 6 de mayo de 1997 se observaron dos machos de esta especie en una pequeña isleta de chañar en los alrededores de la ciudad de Bahía Blanca. Su distribución conocida llega hasta el nordeste de la provincia de Buenos Aires (Narosky e Yzurieta, 1987), siendo la cita más cercana correspondiente a Sierra de la Ventana (Gavio, 1939). Se trataría del registro más austral para la especie, aunque no se descartaría la hipótesis de que fueran ejemplares escapados de cautividad, al igual que en la especie anterior.

### Monterita canela (*Poospiza ornata*)

El 20 de abril de 1997 se registraron dos ejemplares en una franja de Espinal, en cercanías del arroyo Chasicó, formando parte de una bandadita mixta con la monterita de collar (*Poospiza torquata*). El 3 de mayo de 1997 se observó un individuo en una pequeña isleta de chañar aldeaña a un bañado, en la periferia de la ciudad de Bahía Blanca, repitiéndose la observación el 6 de mayo de 1997 de un ejemplar en un ambiente similar al anterior, pero distante un par de kilómetros.

La especie cuenta con un sólo registro para el Caldenal (Short, 1967) y, en general, con pocas citas para toda la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

### Pepitero chico (*Saltatricula multicolor*)

Se observó un ejemplar el 5 de mayo de 1996 en la franja de Espinal que bordea al arroyo Chasicó, a unos 10 km de su desembocadura. El 30 de abril de 1997 se registró un individuo en una pequeña isleta de chañar en los alrededores de la ciudad de Bahía Blanca.

Considerada accidental para Buenos Aires por Narosky y Di Giacomo (1993), cuenta con sólo dos registros para la provincia, uno de los cuales (Algarrobo) es muy cercano a nuestra primera observación.

Estas citas sugerirían que la especie ingresa a la provincia siguiendo el Espinal, siendo su presencia, tal vez, más habitual de lo supuesto. Serían necesarios más registros para la determinación de un estatus más preciso.

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CABRERA, A. L. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 14 (1-2): 1-42 + 8 láminas.  
CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.  
DELHEY, R. 1992. Algunas aves nuevas o poco conocidas para la región de Bahía Blanca. Nuestras Aves, 27: 31-32.  
d'ORBIGNY, A. 1835/44. Voyage dans l'Amérique Meridionale. Vol. 4, part. 3: Oiseaux.  
GAVIO, H. S. 1939. Excursión al Parque Provincial de Sierra de la Ventana. El Hornero, 7: 255-259.  
HUDSON, G. E. 1872. On the Birds of the Rio Negro of Patagonia. With Notes by P. L. Sclater. Proc. Zool. Soc. London 1872: 534-550.  
NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO, 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asoc. Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA, Buenos Aires, 127 páginas.  
NAROSKY, T. y D. YZURIETA, 1987. Guía para la identificación de aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.  
SHORT, L. L. 1967. Some unusual birds of Southern Buenos Aires Province. El Hornero, 10: 459-460.

Recibida: septiembre 1997