

argentinas (Dendrocolaptidae y Furnariidae). Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 98 páginas.
NELLAR ROMANELLA, M. M. 1993. Lista y distribución de las aves de San Luis. Museo Privado Ciencias Naturales e Investigaciones Ornitológicas "Guillermo E. Hudson". San Luis, 98 páginas.
NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. H. Bucher (editores), "Biodiversidad de la provincia de Córdoba": 255-337. Córdoba, 378 páginas.
OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

SCLATER, P. L. 1890. Catalogue of the birds in the British Museum. London, Brit. Mus., 15.
WETMORE, A. 1926. Observations on the birds of Argentina, Paraguay, and Chile. Bull. U. S. Nat. Mus., 133: 1-448.

Recibida: diciembre 1997

Revista Nuestras Aves 40: 19.

REGISTRO DEL BURLISTO CASTAÑO (*Casiornis rufa*) EN LA SELVA DE PUNTA LARA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Norberto H. Montaldo y G. Germán Roitman

Cátedra de Botánica Agrícola, Departamento de Ecología, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Av. San Martín 4.453 (1.417) Buenos Aires, Argentina.

El burlisto castaño (*Casiornis rufa*) habita el norte y este de Bolivia, sur y centro de Brasil y norte de la Argentina, y un pequeño número ha sido registrado durante el invierno en el sudeste de Perú (Ridgely y Tudor, 1994). En la Argentina se lo encuentra en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, este de Formosa, Chaco y Corrientes (Olrog, 1979), Santiago del Estero (Nores *et al.*, 1991) y Misiones (Chebez, 1996).

En base a una captura realizada en 1945 en el arroyo Cambado, partido de Tigre (Vasco, 1953), Narosky y Di Giacomo (1993) lo consideran como de probable presencia accidental en Buenos Aires. También en el delta bonaerense (isla Botija, partido de Zárate), el 22 de febrero de 1995, Flavio Moschione (com. pers.) observó un ejemplar de esta especie en un bosque de sauces.

El 24 de noviembre de 1997 se halló un individuo del burlisto castaño en el sector de selva ribereña de la Reserva Natural Punta Lara, partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires. Se encontraba en el estrato medio de la vegetación y a orillas del arroyo Las Cañas, donde fue observado durante unos diez minutos. En dicho lapso persiguió infructuosamente un insecto en vuelo y capturó dos orugas, una era de tamaño y longitud considerable, al cual golpeó varias veces contra la rama en que perchaba, antes de ingerirla con dificultad.

El presente registro es la cita más austral conocida para la especie, la primera observación para la Reserva Natural Punta Lara (ver Klimaitis y Moschione, 1987) y, junto con el dato de Moschione, confirman el estatus que Narosky y Di Giacomo (1993) adjudican a *Casiornis rufa* para Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CHEBEZ, J. C. 1996. Aves de la provincia de Misiones. En J. C. Chebez, Fauna Misionera: 109-179. LOLA. Buenos Aires, 318 páginas.
KLIMAITIS, J. F. y F. MOSCHIONE. 1987. Aves de la Reserva Integral de Selva Marginal de Punta Lara y sus alrededores. Reseña de sus relaciones con los principales ambientes y comunidades vegetales. Ministerio de Economía, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 120 páginas.
NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires, distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Ediciones y L.O.L.A. Buenos Aires, 128 páginas.
NORES, M.; D. YZURIETA y S. A. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Córdoba, 59: 157-196.
OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.
RIDGELY, R. S. y G. TUDOR. 1994. The birds of South America. Vol. II, The Suboscine Passerines. University of Texas Press. Austin, 814 páginas.
VASCO, J. B. 1953. Hallazgo extralimital del batará rojo. Hornero, 10: 92-93.

Recibida: diciembre 1997