



en distintas zonas y estaciones del año y que se trata de una especie sedentaria (del Hoyo *et al.*, 1994), su presencia podría no ser meramente accidental para el nordeste bonaerense.

La distribución de esta rapaz podría ampliarse a través de los talares que penetran por las barrancas del río Paraná en Entre Ríos y el nordeste de Buenos Aires como una continuación relictual y empobrecida del espinal, aunque sería necesario aumentar los registros y verificar si la especie se está reproduciendo en la zona.

Agradecemos a la Comisión de Investigaciones Científicas (C.I.C.) por haber subsidiado el proyecto, a la familia Earnshaw por permitirnos trabajar en su estancia, al doctor Carlos Darrieu y al licenciado Guillermo Soave por la revisión del manuscrito y sus sugerencias.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ABADIE, E. 1993. Aves nuevas o poco comunes de Entre Ríos. *Nuestras Aves*, 29: 31.
- CABRERA, A. L. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. *Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica*, 14 (1-2): 1-42 + 8 láminas.
- CAMPERI, A. R. 1992. Estudio sobre aves colectadas en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires. *Neotrópica*, 38 (100): 127-140.
- DEL HOYO, J. A. ELLIOTT, y J. SARGATAL (eds.). 1994. *Handbook of the birds of the world*. Vol. 2, Lynx Editions. Barcelona, 638 páginas.

Revista *Nuestras Aves*, 41: 11.

PRIMERA CITA BASADA EN MATERIAL DE COLECCIÓN DEL YAL NEGRO (*Phrygilus fruticeti fruticeti* Kittlitz 1833) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, (AVES: EMBERIZIDAE: EMBERIZINAE)

Aníbal R. Camperi y Carlos A. Darrieu

Sección Ornitología, Departamento Científico Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, (1.900) La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

El área de distribución del yal negro (*Phrygilus fruticeti fruticeti*) abarca las zonas templadas y puneñas del sudoeste de Bolivia, Chile (desde Arica hasta Llanquihue) y, en la Argentina, las zonas arbustivas áridas del este de los Andes, desde Jujuy hasta Río Negro (Paynter y Storer, 1970). Ridgely y Tudor (1989) lo mencionan también para Perú y, en la Argentina, hasta el sur de Chubut y, en forma casual, Tierra del Fuego.

La presencia de *Phrygilus fruticeti* en la provincia de Buenos Aires fue señalada por primera vez por Narosky (1978), quien la cita para el sur de la misma. Los primeros registros concretos, con localidad determinada, corresponden a Narosky (1983), que observó la especie en Carmen de Patagones y Magdalena. Posteriormente Narosky y Di Giacomo (1993) mencionan a *Phrygilus f. fruticeti* en Mar Chiquita y Pigüé. Todas estas citas se basan en registros de observación.

El 26 de julio de 1996 fue capturada una hembra de esta subespecie en la localidad de Punta Blanca, partido de Magdalena, cercano al límite con el partido de Berisso, sobre la costa del río de la Plata. Este ejemplar se encuentra depositado en la colección de la Sección Ornitología, del Departamento Científico Zoología Vertebrados del Museo

- FERRARI, C. y C. HENSCHKE. 1997. El halconcito gris (*Spizapteryx circumcinctus*) en la isla Martín García, Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 35:5.
- MURRIELLO, S., M. ARTURI y A. D. BROWN. 1993. Fenología de las especies arbóreas de los talares del este de la Provincia de Buenos Aires. *Ecología Austral*, 3: 25-31.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.
- NAROSKY, T., M. BABARSKAS y B. LÓPEZ LANÚS. 1992. Hallazgo del primer nido de halconcito gris (*Spizapteryx circumcinctus*), en Buenos Aires. *El Hornero*, 13: 246-247.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.
- SHORT, L. L. 1967. Some unusual birds of southern Buenos Aires Province. *El Hornero*, 10: 459-460.
- ZAPATA, A. R. P. y H. S. MARTÍNEZ. 1972. Algunas aves no citadas y otras poco frecuentes para el sur de la provincia de Buenos Aires. *Acta Zool. Lilloana*, 29: 181-199.

Recibida: junio 1998

de La Plata (número de catálogo 13.791).

La presente constituye la cita más septentrional en la provincia de Buenos Aires y la primera basada en material de colección.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- NAROSKY, T. 1978. Aves argentinas. Guía para reconocimiento de la avifauna bonaerense. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 128 páginas.
- NAROSKY, T. 1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. *El Hornero*, 12 (2): 122-126.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.
- PAYNTER, R. A. y R. W. STORER. 1970. Check-list of birds of the world. Vol. 13. Mus. Comp. Zool. Cambridge. Massachusetts, 443 páginas.
- RIDGELY, R. y G. TUDOR. 1989. *The birds of South America*. Volume I: The oscine passerines. Univ. of Texas Press, 516 páginas.

Recibida: julio 1998