



Estricta Otamendi. Lista sistemática. Administración de Parques Nacionales y Municipalidad de Campana. Buenos Aires.

LANDO, R. y E. HAENE. 1996. Carpintero blanco (*Melanerpes candidus*) en la provincia de Buenos Aires, *Nuestras Aves*, 35: 34-35.

LANYON, W. E. 1978. Revision of the *Myiarchus* Flycatchers of South America. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 161: 429-627.

LÓPEZ LANÚS, B. 1997. Inventario de las aves del Parque Nacional "Río Pilcomayo", Formosa, Argentina. Monografía L.O.L.A., 4. Buenos Aires, 78 páginas.

NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A.

Buenos Aires, 127 páginas.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.

NAVAS, J. R. y N. A. BÓ. 1991. Anotaciones taxonómicas sobre Emberizidae y Fringillidae de la Argentina (Aves: Passeriformes). *Rev. Museo La Plata*, 14: 119-134.

NORES, M. y D. YZURIETA. 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte III. *Hist. Nat.*, 2: 151-152.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.

PAYNTER JR, R. A. 1995. Nearctic Passerines Migrants in South America. *Nuttall. Ornithological Club*, 135: 83-85.

Recibida: agosto 1998

Revista *Nuestras Aves*, 41: 17-21.

## NOTAS SOBRE LA AVIFAUNA DEL NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

*Alejandro Bodrati<sup>1</sup>, Guillermo Bodrati<sup>1</sup> y Hernán Fernández<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Los Ceibos 1.695, (1.607) Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, Argentina

<sup>2</sup> San Lorenzo 3.201, (1.651) San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina

El lugar conocido como la Vuelta de Obligado, es un sitio histórico a orillas del río Paraná de las Palmas, a 19 km al norte de la ciudad de San Pedro, partido homónimo. Allí hay un talar de barranca y una zona de bajos, surcada por el arroyo de los Cueros, que hacia su desembocadura corre paralelo a la barranca, que se encuentran en buen estado de conservación. Se registraron en la zona 220 especies de aves (Bodrati *et al.*, 1996-1998).

H. Fernández visitó el área en agosto y diciembre de 1990, A. y G. Bodrati efectuaron 27 visitas al lugar, entre enero de 1991 y julio de 1998, junto a distintos miembros de Aves Argentinas y la Administración de Parques Nacionales. Como resultado de estas salidas se elaboró un informe (Bodrati *et al.*, 1996-1998).

A continuación detallamos las observaciones de Vuelta de Obligado y otras localidades bonaerenses de catorce especies que se consideran de interés por mejorar el conocimiento de su estatus y distribución en la provincia. Las citas que no incluyan el nombre de los observadores pertenecen a registros efectuados en conjunto por los dos primeros autores.

### **Pollona azul (*Porphyryla martinica*)**

En la provincia de Buenos Aires es una especie rara y cuenta con pocos registros, sin ninguno para el extremo norte bonaerense (Narosky y Di Giacomo, 1993).

El 22 de febrero de 1998 se observó un individuo sobre embalsados de camalotales (*Eichornia crassipes*, *Pontederia* sp., *Panicum* sp. y *Paspalum* sp.), arrastrados por la crecida del río Paraná hasta un recodo del arroyo de los Cueros; vuelto a ver el 7 y el 8 de marzo de 1998. Se movía de un embalsado a otro con vuelos cortos y bajos, al ras del agua;

atrapaba libélulas (Odonatos). El 13 de marzo de 1998, en el balneario Actur, al norte de la ciudad de San Pedro, en ambiente similar al anterior, se observaron dos adultos junto a un pichón con plumón negro, patas y pico color amarillos y un tamaño aproximado de la mitad de las patas del adulto; la cría era alimentada con libélulas (*Aeschna* sp.) desmenuzadas por los adultos (E. Sierra y A. Bodrati, obs. pers.).

### **Torcacita colorada (*Columbina talpacoti*)**

El 17 de agosto de 1990, H. Fernández observó una pareja de torcacita colorada en los talares de barranca de Vuelta de Obligado. El 28 de mayo de 1994, en la ciudad de Vuelta de Obligado, donde se encuentran restos de talares y especies exóticas como paraísos (*Melia azedarach*) y morera de papel (*Broussonetia papyrifera*), A. Bodrati, G. Bodrati y R. Güller observaron un grupo de 20 individuos que se refugiaban entre los árboles. El 29 de mayo de 1994, se avistó un grupo de unos 30 ejemplares, junto a una bandada de torcacita común (*Columbina picui*); se asoleaban (había bajas temperaturas), en un sector abierto sobre una pila de ramas cortadas de tala (*Celtis tala*).

Durante 1995, 1996 y 1998 en casi todas las visitas realizadas a la zona de Vuelta de Obligado se registraron torcacitas coloradas (H. Di Santo, C. Ferrari, D. Insúa, E. Mérida, E. Sierra y los autores, obs. inéd.). Se las vio tanto en el bosque semixerófilo de barranca como en el poblado, incluso incursionando en la zona de bajos y bordes del arroyo de los Cueros; también en el balneario municipal de San Pedro. En varias ocasiones fueron observados individuos juveniles; 27 de febrero de 1994 se avistaron tres pichones con plumón, lo que indicaría su nidificación en



la zona.

Contamos con otros registros para la zona. El 9 de julio de 1996, R. Güller (*in litt.*) avistó dos individuos en el cementerio de La Arbolada, partido de Escobar. El 24 de noviembre de 1996 en la estancia El Castillo, en el sur del partido de Ramallo, varios individuos al pie de la barranca y sobre árboles dispersos en los bajos. El 18 de agosto de 1997 A. Bodrati observó seis individuos entre los bajos inundables y la barranca de talar de la Fundación Figueroa Salas, 11 km al sur de la ciudad de Baradero, en el partido homónimo.

Estas observaciones parecen confirmar la hipótesis de que la presencia de esta especie en Buenos Aires se debería a una colonización reciente y no a apariciones accidentales (Moschione *et. al.*, 1992). Durante la última década del siglo XX, en los partidos del extremo norte bonaerense, como San Pedro y Ramallo, se detectó una pequeña población estable y seguramente nidificante; mientras que más al sur, Escobar por ejemplo, resultaría rara u ocasional. Anteriormente, contaba con pocas citas para la provincia, donde era considerada rara (Narosky y Di Giacomo, 1993).


#### **Carpinterito común (*Picumnus cirratus*)**

La especie cuenta con pocos registros y recientes para la provincia de Buenos Aires, en los talares de Ramallo y Vuelta de Obligado (Narosky y Di Giacomo, 1993) y el delta del Paraná, partido de Tigre (Blanchard, 1996).

El 16 diciembre de 1990 H. Fernández observó una hembra de esta especie en la parte baja del talar de barranca. El 20 de septiembre de 1991, tres individuos se movían en el estrato medio en un sector con predominio de tembetarías (*Fagara hyemalis*). El 9 junio de 1991 dos parejas recorrían el borde de la barranca donde esta cae sobre el río Paraná, los mismos pican sobre pequeños talas y azahar del monte (*Aloysia gratissima*). En 1992 se registra a esta especie en abril, agosto y septiembre; en 1993 en junio, julio y noviembre. El 28 de febrero de 1994 una pareja acompañada por dos individuos juveniles, que presentaban coloración ocráceo amarillenta, recorrían la parte alta de un seibo (*Erythrina crista-galli*) a pocos metros del arroyo de los Cueros. El 29 de mayo de 1994, los autores y R. Güller observan una pareja y un inmaduro en un sector con restos de talar y especies exóticas, en uno de estos reducidos manchones ubican un nido donde se refugian estos individuos. El hueco de la entrada es de 2,7 x 2,5 cm y orientación sudoeste; está a 3,6 m de altura, en la rama seca de una morera de papel con un diámetro de 22,5 cm.

Los individuos permanecían dentro del nido y el macho se mantenía observando desde el interior del hueco, efectuando un nervioso y acelerado movimiento de cabeza; por momentos picoteaba el borde del orificio, comportamiento que duro varios minutos y permitió tomar fotografías. En 1995 se lo observa en enero, marzo, junio, septiembre, noviembre y diciembre. En 1996 en octubre y noviembre. En 1998 el 22 de febrero (hasta cinco individuos en el talar), 8 de marzo, 2 y 3 de mayo.

En los talares de Vuelta de Obligado este carpinterito resulta frecuente y nidificante, no había antecedentes reproductivos para la provincia (ver Narosky y Di Giacomo,



*Nido de carpintero común*

1993). Es conocido por varios pobladores de la zona quienes lo llaman "telegrafista" debido a su sonoro tamborileo sobre distintas ramas finas. Sus poblaciones en el extremo norte provincial parecen ser de baja densidad, estar localizadas y probablemente amenazadas por el progresivo deterioro de los últimos relictos de bosques de barranca.

#### **Chincherero grande (*Drymornis bridgessi*)**

La especie es considerada hipotética para el norte de la provincia de Buenos Aires, donde cuenta con cuatro registros (Narosky y Di Giacomo, 1993; Maugerí, 1999).

El 27 de mayo de 1995 en el talar vecino al monumento histórico de Vuelta de Obligado, Dante Insúa (*in litt.*) pudo oír la fuerte y repetida voz de esta especie, seguidamente consiguió ubicar un individuo trepando el tronco de un ombú (*Phytolacca dioica*) de gran tamaño.

La presencia de esta especie en los talares del extremo norte bonaerense parecería esporádica o probablemente accidental.

#### **Caserote castaño (*Pseudoseisura lophotes*)**

El 19 de septiembre de 1998 R. Tahmazian observó un individuo en el camping vecino al monumento Histórico Vuelta de Obligado, también detectado por su voz por un grupo de observadores (C. Agulián y R. Güller *in litt.*). El 26 de septiembre de 1998 G. Pugnali (com. pers.) oyó un individuo al pie del talar de barranca y cerca del arroyo de los Cueros; dos días después A. Bodrati registró una pareja en campos arbustivos entre el talar y el arroyo de los Cueros.

El caserote castaño es considerado accidental en el noreste bonaerense (Narosky y Di Giacomo, 1993), pero ya contaba con una mención histórica para el extremo norte de la provincia (Lynch Arribáizaga, 1878).

#### **Espinero grande (*Phacellodomus ruber*)**

En la provincia de Buenos Aires solo se conocían registros para los bosques ribereños de Ramallo (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Contamos con repetidas observaciones en el talar de Vuelta de Obligado. El 17 de agosto y el 16 de diciembre de 1990, H. Fernández observó dos ejemplares, en la segunda ocasión con un nido activo. El 22 de septiembre de



1991, en este relicto natural se oye y luego observa, una pareja de este espinero cantando a dúo, en el talar.

En 1992 se lo observa en abril y septiembre, en campos bajos arbustivos de las márgenes del arroyo de los Cueros; también en julio y septiembre de 1993; febrero, mayo y octubre de 1994; marzo, junio, agosto y septiembre de 1995. En 1996 se pudo observar un mayor número de individuos: en octubre; el 16, 17 y 23 de noviembre dos parejas con nidos terminados, ubicados en la parte media de la barranca, contruidos sobre talas de gran porte; una tercera pareja con materiales. El 8 de marzo de 1998 se observó un individuo en el borde del arroyo de los Cueros, perseguido por dos de curutié colorado (*Certhiaxis cinnamomea*). El 2 y 3 de mayo de 1998 una pareja con nido sobre una morera de papel al parecer terminado, aunque llevaba materiales (incluso pedacitos de plástico).

En el partido de Baradero esta especie resulta mucho más rara, posiblemente debido a la presión del ganado sobre el pie de barranca y bajos. La hemos registrado el 21 de marzo de 1998, durante una importante crecida, dos individuos y se oyeron otros en los bajos de Figueroa Salas.

En la estancia El Castillo, 8 kilómetros al norte de Vuelta de Obligado, en el partido de Ramallo, el 24 de noviembre de 1996, cuyas barrancas se encuentran invadidos en forma total por especies arbóreas exóticas, aunque conservaba sus bajos en muy buen estado de conservación, pudieron observarse durante toda la jornada varios individuos de este espinero en diferentes sectores de los bajos.

El 25 de enero de 1997, A. Bodrati y G. Bodrati observaron dos individuos en los bajos de la Reserva El Cazador, partido de Escobar, los cuales vocalizaban desde un seibo emergente sobre una comunidad de totora (*Typha latifolia*). Este registro sería el más austral dentro de la distribución general de la especie.

Las observaciones de estos años, indican un aumento en el número de registros en momentos de crecida del río Paraná. Dentro de la provincia de Buenos Aires el espinero grande resultaría frecuente en bosques de barranca y bajos vecinos en buen estado, como ocurre en la Reserva Municipal de Ramallo, en campos privados al sur de este partido o en Vuelta de Obligado. También habita sectores de barrancas invadidas por grandes árboles exóticos (álamos, robles) pero con baja carga ganadera y sotobosques tupidos, por ejemplo la estancia El Castillo.

#### **Choca común (*Thamnophilus caeruleus*)**

Los días 13 y 14 de abril de 1992, se repitió el avistaje de una pareja de choca común en la parte alta del talar de barranca en Vuelta de Obligado, en un sector sombrío y enmarañado. En febrero, julio y septiembre de 1994, se la registra nuevamente. El 15 de octubre de 1994, se observó una hembra portando material para el nido hacia un espinillo (*Acacia caven*) rodeado de un denso pajonal de caraguatá (*Eryngium pandanifolium*) y cubierto casi totalmente por zarzaparrilla (*Smilax campestris*) y mburucuyá (*Passiflora caerulea*). El 17 de marzo de 1995, se encontraron tres individuos, uno de ellos inmaduro, en la parte alta y densa del talar. El 16 de noviembre de 1996, se

observaron dos parejas, en el sector antes mencionado, recorriendo una parte del bosque con tembetarí.

En el vecino partido de Baradero, esta especie resulta frecuente aunque en bajo número y muy localizados, al sur de esta ciudad, donde las barrancas se encuentran en buen estado de conservación en una extensión aproximada de 8 km (Haene *et al.*, 1996). Contamos con varios registros para la estancia de la Fundación Figueroa Salas, 11 km al sur de la ciudad de Baradero: el 26 de noviembre de 1995, cuatro individuos; el 18 de mayo una pareja asociada a otras especies de aves como mosqueta común (*Phylloscartes ventralis*); el 26 y 27 de octubre de 1996, varios individuos; el 19 de enero de 1997 dos parejas con juveniles; el 21 de marzo de 1998, dos parejas. En la estancia El Rincón, 6 km al norte de la ciudad de Baradero, el 25 de noviembre de 1995 se observaron dos individuos en los talares y el mismo día, a solo 2 km, al norte de la ciudad se registró un macho en el sitio conocido localmente como La Papelera.

La choca común está considerada rara para Buenos Aires, donde cuenta con escasas citas para el extremo norte de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Resulta frecuente solo puntualmente en el sector norte de Figueroa Salas (Baradero), donde el bosque se encuentra en mejor estado, cerrado y enmarañado. Aquí la detectamos en todas las visitas. En cambio, en Vuelta de Obligado no la volvimos a encontrar en los últimos tres años de prospecciones (1997 a 1999); esto coincide con el ingreso de ganado, que modificó drásticamente el estrato medio y bajo del talar por pisoteo, ramoneo y su utilización como dormitorio.

#### **Mosqueta de ojo dorado (*Hemitriccus margaritaceiventer*)**

En la provincia de Buenos Aires solo cuenta con citas recientes para Ramallo y Vuelta de Obligado (Narosky y Di Giacomo, 1993), los talares de barranca y bosques del Delta en el partido de Baradero (Bodrati *et al.*, 1997).

Avistajes que cubren todos los meses del año, realizadas en el talar de Vuelta de Obligado, indican que esta especie es residente y frecuente, al menos localmente, en talares en un estado aceptable de conservación. Sin embargo, su situación en la provincia de Buenos Aires podría ser problemática debido al deterioro constante de estos bosques de barranca.

El 16 de diciembre de 1990 H. Fernández registra esta especie en los talares de barranca de Vuelta de Obligado.

El 10 de junio de 1991 se observó en el sector más denso del talar dos individuos los cuales fueron detectados por su voz. El 22 de septiembre de 1991, dos ejemplares recorrían un sector enmarañado, a media altura en el bosque semixerófilo. El 14 de abril de 1992 hasta cuatro individuos, los cuales se movían por debajo del follaje de un tembetarí. Otras observaciones para el 5 de julio y 20 y 21 de septiembre de 1992; el 26 de febrero, 28 de mayo, 14 y 15 de octubre de 1994; el 18 de marzo, 23 de agosto y el 3 de diciembre de 1995; 2 de junio, 5 y 6 de octubre, 17 y 23 de noviembre de 1997; 22 de febrero, 7 y 8 de marzo, 2, 3 y 29 de mayo de 1998.

En 1995 se observó a un adulto alimentar a un juvenil,



que tenía el iris oscuro y emitía una voz chillona de reclamo siguiendo al adulto por el estrato medio del talar. Este avistaje supondría la nidificación de la mosqueta ojo dorado en los bosques de barranca del extremo norte bonaerense.

#### **Piojito silbón (*Camptostoma obsoletum*)**

En la provincia de Buenos Aires la especie tiene pocos y recientes registros, donde es considerada rara (Narosky y Di Giacomo, 1993). Nuestras observaciones sugieren que el piojito silbón resulta frecuente en montes xerófilos de la antigua barranca paranaense y ambientes vecinos; mientras que avistases invernales confirmarían su residencia en Buenos Aires.

Contamos con varios registros para Vuelta de Obligado: el 20 de septiembre de 1992, se observó un individuo en la parte alta de la barranca sobre el arroyo de los Cueros; el 17 de julio de 1993 un ejemplar en el camping vecino al talar de Vuelta de Obligado, recorría sauces (*Salix* sp.) junto a una vivienda; el mismo día se oyó en varias ocasiones el silbo típico de otros individuos en distintos sectores; 26 de febrero, 29 mayo y 15 de octubre 1994; 18 y 19 de marzo, 11 de junio, 22 de agosto, 17 de septiembre de 1995; 2 de junio, 6 de octubre 16 17 y 23 de noviembre de 1996.

También fue avistado en el partido de Baradero: Fundación Figueroa Salas, 26 de noviembre de 1995 al menos cuatro individuos, en esta barranca se sucedieron registros el 18 y 19 de mayo 26 y 27 de octubre de 1996, 18 y 19 enero de 1997; en La Papelera, 17 y 1 8 de julio de 1997 y 24 de mayo de 1998; estancia El Recuerdo, 14 km al sur de Baradero, 22 de marzo de 1998 se oyó su voz en varios momentos.

El 25 de enero de 1997 se observaron dos individuos en el talar de la Reserva El Cazador, partido de Escobar; el 9 de mayo de 1998 dos ejemplares en la Reserva Ribera Norte, partido de San Isidro, estos se movían en la parte alta de sauces, emitiendo su característica "risita". El 20 de septiembre de 1998 G. Pugnali (com. pers.) observó un individuo en el bosque de alisos (*Tessaria integrifolia*) de la Reserva Costanera Sur, Ciudad de Buenos Aires. El 3 de octubre de 1993, A. Bodrati y H. Hortiguera avistan hasta cuatro individuos en la estancia El Destino, partido de Magdalena.

El 21 diciembre de 1996 Carlos Ferrari (*in litt.*) observó un individuo en cercanías del paraje Sierra de la Cascada, situado en las sierras de Tandil. Este individuo fue visto en un camino vecinal y en un bosque de eucaliptos. Este sería el registro más austral dentro de la distribución general de la especie.

Se trataría de una especie subobservada por su parecido con otros tiránidos como apuntan Moschione y San Cristóbal (1991). Podría considerarse común para el norte de la provincia de Buenos Aires.

#### **Suirirí pico corto (*Sublegatus modestus*)**

La especie tiene dos menciones para el noreste de la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993).

El 27 de febrero de 1994 en el bosque semixerófilo de barranca lindante al monumento histórico Vuelta de Obligado, se detectó un individuo solitario, que emitía su

silbo corto en la parte alta de un tala. El 2 de diciembre de 1995 en un sector cercano al anterior, pudo observarse un nuevo individuo que cazaba tirándose desde las ramas exteriores de un tembetarí hacia un claro en el monte donde podían observarse diversos insectos. También se observaban dos individuos de mosqueta ojo dorado y uno de viudita pico celeste (*Knipolegus cyanostris*), esta última en el sotobosque sombrío. El 17 de noviembre de 1996, dos individuos fueron observados en la zona baja de la barranca, cerca del arroyo de los Cueros, sobre una cinacina (*Parkinsonia aculeata*) desde donde atrapaban insectos cruzando el arroyo hasta espinillos en la margen opuesta.

#### **Fiofío grande (*Elaenia spectabilis*)**

Visitante estival común en los bosques de barrancas del extremo norte bonaerense (Bodrati *et. al.*, 1997). Según nuestras observaciones esta especie llegaría a esa zona a principios de octubre y resulta frecuente desde el fin de este mes hasta marzo y principios de abril; incluso se han registrado jóvenes o rezagados a fines de este último mes.

El 8 de marzo de 1998 A. Bodrati, E. Mérida y E. Sierra encuentran en la parte alta del talar de Vuelta de Obligado en un sector con talas de gran porte (10 metros de alto) una pareja de fiofío grande con nido. Se encontraba en una horqueta triple, a 6-7 m de altura, en una morera de papel, junto a dos pichones sumamente desarrollados y a punto de abandonarlo. El nido tenía forma semiesférica, achatada, recubierto exteriormente por líquenes escamosos de coloración pardo verdosa, bien elaborado con pajitas finas y abundante telarañas, el mismo material con el que se unió a la base de la horqueta. La pareja se mantuvo inquieta durante varios minutos sin alejarse de este nido en ningún momento.

Se confirma así la probable nidificación de esta especie para la provincia de Buenos Aires indicada por Narosky y Di Giacomo (1993).

#### **Tuquito gris (*Griseotyrannus aurantioatrocristatus*)**

El 22 de enero de 1991, a 18 km hacia el oeste de la ciudad de San Pedro, partido homónimo, en una zona de campos de pastoreo cruzado por el arroyo El Tala, pudo observarse un juvenil de tuquito gris, sobre un naranjo trébol (*Poncirus trifoliata*). Era alimentado por un adulto en intervalos cortos; presentaba la típica boquera de los pichones, por lo que se deduce que habría abandonado recientemente el nido.

El 19 de marzo de 1995, se registró un individuo en las barrancas del sitio histórico Vuelta de Obligado, sobre un tala en la parte alta de la barranca. El 24 de noviembre de 1995, se observaron dos individuos cerca del arroyo de los Cueros, en árboles bajos como espinillos y talas, de los cuales se lanzaban reiteradamente atrapando insectos. El 22 de febrero de 1998 un juvenil de tuquito gris en el talar de Vuelta de Obligado.

El 18 de enero de 1997 G. Bodrati y un día después A. Bodrati, observan un individuo en la terraza alta de la barranca del establecimiento Figueroa Salas, Baradero.

En el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, esta especie cuenta con pocas citas concretas, era



considerada rara y no se conocía evidencia de su nidificación (Narosky y Di Giacomo, 1993; Narosky y Salvador, 1998).

#### **Brasita de fuego (*Coryphospingus cucullatus*)**

Es una especie rara y vulnerable en la provincia de Buenos Aires, con escasas citas, algunas muy antiguas (Narosky y Di Giacomo, 1993). El 15 de octubre de 1994 se observó dos machos y al menos una hembra integrando un pequeño grupo mixto en campos arbustivos bajos que acompañan al arroyo de los Cueros. Las especies acompañantes eran monterita cabeza negra (*Poospiza cinerea*), sietevestidos (*Poospiza nigrorufa*) y tacuarita azul (*Poliophtila dumicola*).

El 16 de septiembre de 1995 se observó una pareja en la parte baja de un espinillo al borde del arroyo de los Cueros. El 2 de junio de 1996 nuevamente un macho en el mismo sector, dentro de un grupo de monterita cabeza negra.

El 24 de mayo de 1998 se observó un macho de brasita de fuego que se movía a media altura en un tala junto a un pequeño grupo de monterita litoraleña (*Poospiza lateralis*), a metros del camino vecinal, en la parte baja de la barranca de La Papelera, Baradero.

La observación de junio confirmaría la probable residencia indicada por Narosky y Di Giacomo (1993).

#### **Loica pampeana (*Sturnella defilippi*)**

Esta especie es considerada en la categoría "en peligro" (Fraga, 1997), su distribución en la Argentina y países vecinos se redujo drásticamente. Según Tubaro (1995) los últimos registros para el nordeste bonaerense datan de la década del 30, aunque otras compilaciones señalan la existencia de individuos aislados en Entre Ríos, Brasil y Uruguay Collar *et al.* (1992).

El 26 de septiembre de 1998 A. Bosso y A. Bodrati observaron un individuo solitario, en un pequeño caragatal cerca del borde del arroyo de los Cueros; dos días después y en el mismo lugar, A. Bodrati registra un ejemplar en un bosque abierto de espinillos.

Agradecemos la colaboración prestada a nuestros compañeros de salidas durante estos años y especialmente a Andrés Bosso, C. Agulián, Carlos Ferrari, Hugo Di Santo, Roberto Güller, Dante Insúa, Emilse Mérida, Germán Pugnali, E. Sierra y R. Tahmazian por permitir incluir sus observaciones en las notas. También se agradece a Alejandra Carminati, Aldo Chiappe, C. Gauerke, Daniel Gómez, Eduardo Haene, Roberto Landó, Claudia Nardini, Ezequiel Nuñez y María José Solís que colaboraron de diferentes formas en la elaboración del informe de Vuelta de Obligado.

#### **BIBLIOGRAFÍA CITADA**

- BLANCHARD, A. 1996. Hallazgo del carpinterito común en el Delta del Paraná, Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 33: 30.
- BODRATI, A., G. BODRATI y H. FERNÁNDEZ. 1996-1998. Sobre la importancia en la conservación de un Refugio Histórico y Natural en las barrancas de Vuelta de Obligado, Partido de San Pedro. Informe inédito, Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 35 páginas.
- BODRATI, A., G. BODRATI, C. FERRARI, E. MÉRIDA y E. HAENE. 1997. Notas sobre la avifauna del Baradero, Provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 37: 2-4.
- COLLAR, N. J., L. P. GONZAGA, N. KRABBE, A. MADROÑO NIETO, L. G. NARANJO, T. A. PARKER III y D. C. WEGE. 1992. *Threatened Birds of the Americas: The I.C.B.P./I.U.C.N. Red Data Book*. Third edition, part 2. Smithsonian Inst. Press, I.C.B.P., 1.150 páginas.
- FRAGA, R. M. 1997. *Aves*. En J. J. García Fernández (coord. gral.), *Mamíferos y aves amenazados de la Argentina*: 155-219. FUCEMA y Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 221 páginas.
- HAENE, E., M. C. BERWYN, A. BODRATI, G. BODRATI, T. CUTELLE, C. FERRARI, E. MÉRIDA, C. NARDINI, E. NUÑEZ, R. RODRÍGUEZ, S. SANTISTEBAN, M. C. SMITH, M. J. SOLÍS y M. TCHARIAN. 1996. Diagnóstico general de las áreas naturales del partido de Baradero (provincia de Buenos Aires) y recomendaciones para su conservación. Informe inédito, Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 26 páginas.
- MAUGERI, G. F. 1999. Nuevo registro del chinchero grande (*Drymornis bidegsii*) para el nordeste de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 40: 22.
- MOSCHIONE, F. N., J. SAN CRISTÓBAL e I. BARRIOS. 1992. Nuevos registros de la torcacita colorada, *Columbina talpacoti*, en la provincia de Buenos Aires. *Garganchillo*, 12: 7-8.
- MOSCHIONE, F. N. y J. SAN CRISTÓBAL. 1991. El piojito silbador, *Camptostoma obsoletum*, en Isla Martín García, provincia de Buenos Aires. *Garganchillo*, 11: 8.
- NAROSKY, T., A. G. DI GIACOMO y B. LÓPEZ LANÚS. 1990. Notas sobre aves del sur de Buenos Aires. *El Hornero*, 13: 173-178.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.
- NAROSKY, T. y S. SALVADOR. 1998. Nidificación de las aves argentinas, *Tyrannidae*. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 135 páginas.
- TUBARO, P. 1995. ¿Dónde estás pastizal? *Nuestras Aves*, 31: 14-15.

Recibida: agosto 1998