



común en invierno.

Queremos agradecer el apoyo brindado por nuestros padres.

BIBLIOGRAFÍA CITADA: BELENGUER, L., K. DELHEY, S. DI MARTINO, P. PETRACCI y A. SCOROLLI. 1993. Lista comentada de la avifauna observada en la región de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires). Informe inédito de la Primera Reunión de Ornitología de la Cuenca del Plata. Puerto Iguazú. DELHEY, J. K. V. y M. CARRETE. 1999. Aves nuevas o poco conocidas para el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 40: 11-12. LEVEAU, C. y L. LEVEAU. 1997. Lista comentada de la avifauna de

Villa Cacique, Barker y alrededores, Benito Juárez, Pcia. de Buenos Aires. Informe inédito. MARTÍNEZ, M. M., J. P. ISACCH y F. DONATI. 1996. Aspectos de la distribución y biología reproductiva de *Asio clamator* en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. *Ornitología Neotropical*, 7 (2): 157-161. NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 345 páginas. NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.

Nuevo registro del picaflor andino (*Oreotrochilus leucopleurus*) para Santa Cruz (Argentina)

Por Juan Mazar Barnett. Avenida Forest 1.531, 1° B, (1.430) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: J.Mazar.Barnett@uea.ac.uk

El 6 de febrero de 1993 observé fugazmente una hembra del picaflor andino común en las inmediaciones del camping de El Chaltén, en el Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz (49° 20' S, 72° 55' O). Si bien la observación fue corta y rápida, se pudo notar claramente el ápice blanco en timoneras externas y el tamaño algo grande para un picaflor, que son diagnósticos comparados con el picaflor rubí (*Sephanoides galeritus*), el otro troquilido que habita la zona. El individuo fue observado en un bosque abierto de ñires (*Nothofagus antarctica*), en un sector de ecotono con la estepa árida hacia el este.

Los primeros registros para Santa Cruz los da Navas (1965), quien comunica tres ejemplares colectados por S. Radboone en el área del lago San Martín (en cuyas márgenes se sitúa la estancia El Cóndor). Serret y Johnson (1986) brindan tres observaciones en enero de 1985 para la zona de la estancia El Cóndor, no lejos de El Chaltén. La especie está mencionada para dos parques nacionales

santruceños: Perito Moreno y Los Glaciares (Chebez et al., 1998).

Esta observación representaría por lo menos el cuarto registro en Santa Cruz, y tal vez la más austral para la especie, unos 35 km al sudoeste de la localidad de Serret y Johnson (1986).

Agradezco a Santiago Imberti por los datos proporcionados sobre el área.

BIBLIOGRAFÍA CITADA: CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía LOLA 12. Buenos Aires, 126 páginas. NAVAS, J. R. 1965. Nuevos aportes para *Oreotrochilus leucopleurus*. *El Hornero*, 10 (3): 283-285. SERRET, A. y A. JOHNSON. 1986. Primera cita del picaflor serrano ventrinegro para la Provincia de Santa Cruz. *Nuestras Aves*, 10: 14.

Hallazgo en Chubut (Argentina) de un albatros real (*Diomedea epomophora*) anillado en Nueva Zelanda

Por Horacio Rodríguez Moulín. *Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata*, 25 de Mayo 749, 2° 6 (1.002) Buenos Aires, Argentina

Durante el desarrollo del curso de Iniciación a la observación de aves silvestres, dictado en la ciudad de Mar del Plata en noviembre de 1997, una de las participantes, R. Migliora, estudiante de Ciencias Biológicas de la Universidad de Mar del Plata nos entregó un anillo extraído de un ave muerta recuperada en alta mar.

El anillo de metal se lo había entregado varios años atrás su padre, que navegando en alta mar en un buque pesquero lo extrajo de un ave que había muerto al enredarse en un cable de acero.

El hallazgo lo realizó en enero de 1975 en las cercanías de la isla Escondida (43° 42' 2" S, 65° 16' 8" O), provincia del Chubut. La leyenda del anillo metálico decía: "Dominion Museum - New Zeland - R 22577". Inmediatamente envia-

mos los datos a Nueva Zelanda y al poco tiempo recibimos la respuesta del Programa Nacional de Anillado de Nueva Zelanda que nos envió la información requerida. Se trataba de un albatros real (*Diomedea epomophora*) que había sido anillado cuando era pichón en la isla Campbell, al sur de Nueva Zelanda, el 30 de agosto de 1971. Entre este sitio y el de su recuperación en la Argentina la distancia es de 7.800 km.

En Nueva Zelanda han sido anilladas más de 140 especies de aves, con un total de 40.000 a 45.000 ejemplares marcados cada año.

El anillado de aves tiene el propósito de obtener información exacta sobre los movimientos y hábitos de las aves. Aparte de su labor puramente científico, los anillos nume-



rados o de colores dan mucha información sobre migraciones, costumbres, período de vida, causas de muerte de aves silvestres y criadas en cautiverio.

El éxito del programa de anillado depende en gran me-

didada de que el público avise del hallazgo de anillos.

Cada anillo devuelto añade nuevos detalles de información y hasta puede significar un descubrimiento novedoso.



Albinismo de un ejemplar de remolinera andina (*Cinclodes oustaleti*)

Por Jorge Veiga, Riglos 1.295, (1.424) Buenos Aires, Argentina

En los alrededores de Copahue, departamento Ñorquín, provincia del Neuquén, Argentina, observé el 23 de enero de 1998 un subadulto de la remolinera andina con plumaje albino; las patas y el pico tenían una tonalidad amarilla.

Se desplazaba a salititos con movimientos lentos y pausados, entre rocas y se metía en las grietas dejadas por la nieve. Era alimentado por uno de sus padres (ver fotografía).

En ningún momento fue atacado o molestado por la remolinera común (*Cinclodes fuscus*) y el yal plumizo (*Phrygilus unicolor*), de los cuales había varios ejemplares en el lugar. Cabe recordar que Herrera (1993) comenta que en una bandada mixta un individuo albino de saíra dorada (*Hemithraupis guira*) era continuamente acosado por otras aves.

No hay ejemplares albinos de la remolinera andina depositados en los museos de La Plata (cfr. Zapata y Novatti, 1979) ni en el "Bernardino Rivadavia" de Buenos Aires (J. Navas, com. pers.).

Agradezco la información brindada por el doctor Jorge Navas y las sugerencias de Marcos Babarskas.



BIBLIOGRAFÍA CITADA: HERRERA, G. A. 1993. Albinismo en un ejemplar de saíra dorada (*Hemithraupis guira*). *Nuestras Aves*, 28: 29. ZAPATA, A. y R. NOVATTI. 1979. Aves albinas en la colección del Museo de La Plata. I, No Passeriformes. *El Hornero*, 12 (1): 1-10.



Nuevas citas de aves para el partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires, Argentina

Por Ignacio Roesler, Beruti y Brown s/n, (6.230) General Villegas, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: roesler@infovia.com.ar

Observaciones de 18 especies con escasa información para el partido de General Villegas (63° O: 35° S), en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Martineta copetona (*Eudromia elegans*). En el pasado fue común, inclusive en grandes bandadas. Ahora es observada ocasionalmente en campos con pastizales naturales, en grupos de dos o tres ejemplares. Considerada en peligro en la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Garcita azulada (*Butorides striatus*). Se observó un ejemplar adulto con plumaje nupcial, el 28 de diciembre de 1997, en arbustos del pastizal salobre, al costado de una laguna, y el 4 de enero de 1998, en juncales. Especie común de las zonas ribereñas de Buenos Aires, con dos registros para el oeste de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Jote cabeza negra (*Coragyps atratus*). Observado en diversas ocasiones en vuelo sobre campos o sobre la ciudad.

El 7 de abril de 1995 fue registrado un grupo de cuatro ejemplares, entre ellos dos jóvenes, volando sobre la ciudad.

Este jote no tiene registros para el noroeste de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Playerito unicolor (*Calidris bairdii*). Una bandada de unos diez individuos, el 10 de marzo de 1997, en una laguna junto a un grupo de playerito de rabadilla blanca (*Calidris*

fuscicollis).

El playerito unicolor es un escaso visitante estival con pocos registros para el interior de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Chorlo cabezón (*Oreopholus ruficollis*). El 8 de junio de 1998 en un campo arado se encontraban varias bandadas, que por momentos se juntaban; se trataría de unos cien individuos. Es un común visitante de la provincia, pero sin registros recientes para la zona (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Agachona chica (*Thinocorus rumicivorus*). El 8 de junio de 1998 junto con la especie anterior fue visto un grupo de esta especie de aproximadamente 20 individuos. Es considerada una escasa visitante invernal del centro sur y este de la provincia, en disminución (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Cuculillo canela (*Coccyzus melacoryphus*). El 28 de noviembre de 1997, en un pinar, se observó dos ejemplares.

Otro ejemplar en el pueblo el 20 de enero de 2001. Es un ave común en el nordeste y en el sur pero sin registros para el noroeste de la provincia (Narosky y Di Giacomo, 1993).

Ñacundá (*Podager nacunda*). Se lo ve frecuentemente sobrevolando campos o zonas urbanizadas durante los