

TAGUATÓ NEGRO (*Buteo leucorrhous*) EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, ARGENTINA

Manuel Nores

Centro de Zoología Aplicada. C. C. 122, (5.000) Córdoba, Argentina
Correo electrónico: mnore@gtwing.efn.uncor.edu

El taguató negro (*Buteo leucorrhous*) es endémico de América del Sur y se distribuye por el oeste desde Venezuela y Colombia, por Ecuador, Perú y Bolivia, hasta el noroeste de la Argentina en Salta, Jujuy y Tucumán; y por el este, en el sur de Brasil, este de Paraguay y noreste de la Argentina, en Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes (Zotta, 1944; Short, 1975; Blake, 1977; Olrog, 1979; Del Hoyo et al., 1994). Frecuenta principalmente bordes y claros de selvas y bosques húmedos y solo ocasionalmente aparece en zonas más áridas.

El 13 de mayo de 1999 fue observado un ejemplar al lado de la Ruta Nacional 12 a 35 km al noreste de Paraná (31° 37' S, 60° 09' O). Estaba posado en un paraíso (*Melia azedarach*) sin hojas, en un ambiente general chaqueño. El ejemplar mostraba todas las características de la especie: aspecto y tamaño similar al taguató común (*Buteo magnirostris*), plumaje general negro con muslos castaños, la cera y las patas amarillas, el pico negro corto y grueso. Cuando estaba posado se podía apreciar una banda blanca en la parte dorsal de la cola y en vuelo se destacaba, notablemente, un área blanca en rabadilla y supracaudales.

El encuentro de esta especie en Entre Ríos significa una

expansión hacia el sur de su rango conocido de aproximadamente 500 km, ya que el registro más austral era Perichón, departamento Capital, Corrientes (Contreras, com. pers.).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BLAKE, E. 1977. Manual of neotropical birds. Vol. 1, University of Chicago Press, 674 páginas.
CHEBEZ, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas en peligro. Editorial Albatros. Buenos Aires, 604 páginas.
DEL HOYO, J. A. ELLIOTT y J. SARGATAL (eds.). 1994. Handbook of the birds of the world. Vol. 2, Lynx Editions. Barcelona, 638 páginas.
OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.
SHORT, L. L. 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 154: 167-352.
ZOTTA, A. R. 1944. Lista sistemática de las aves argentina. Tirada del Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires.

Recibida: octubre de 1999

PRIMER REGISTRO DE LA BANDURRITA PICO RECTO (*Upucerthia ruficauda*) PARA LA PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA

Fabián Tittarelli y Sergio Tiranti

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa. Uruguay 151, (6.300) Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Correo electrónico: fabian_tita@usa.net

La bandurrita pico recto presenta una distribución relativamente amplia en nuestro país. Se la encuentra en Salta, Jujuy, Catamarca y Tucumán por el norte y bordeando el oeste argentino hasta el sur de Chubut (Olrog, 1979; Narosky e Yzurieta, 1987). A pesar de ello no es una especie muy conocida, especialmente en cuanto a sus hábitos nidificatorios (Narosky et al., 1983).

El 26 de octubre de 1999 en la intersección de las rutas nacional 152 y provincial 23, a 4 km de la represa Casa de Piedra, La Pampa, fue observada una pareja en un monte abierto, característico de la zona. En un primer momento posada en una jarilla (*Larrea divaricata*) y luego desplazándose por el suelo. Este registro es el primero constatado en la provincia, y aunque no pudo localizarse el nido, a juzgar por el comportamiento observado, de mantener cierta territorialidad y la época del año ob-

servada es probable que la especie sea nidificante en el lugar.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- NAROSKY, S., R. FRAGA y M. R. DE LA PEÑA. 1983. Nidificación de las aves argentinas (Dendrocolaptidae y Furnariidae). Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 98 páginas.
NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.
OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

Recibida: diciembre de 1999