

res de las sierras del sudeste del Brasil y llega hasta 2.200 m sobre el nivel del mar, con un posible descenso en invierno (Ridgely y Tudor, 1989). Es lógico entonces que el ejemplar de Misiones haya sido colectado en una zona alta, como que los registros visuales provengan de zonas vecinas a las sierras misioneras. Queda por conocer la abundancia de pepitero picudo en la provincia de Misiones y su posible variación estacional.

Agradecemos los comentarios recibidos por Juan Carlos Chebez.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BERTONI, A. 1913. Contribución para un catálogo de aves argentinas. Anal. Soc. Cien. Argentina 75: 64.

CHEBEZ, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas en peligro. Editorial Albatros. Buenos Aires, 604 páginas.

CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía L.O.L.A 12. Buenos Aires, 126 páginas.

RIDGELY, R. y G. TUDOR. 1989. The birds of South America. Volume I: The oscine passerines. Univ. of Texas Press, 516 páginas.

SICK, H. 1993. Birds in Brazil. Princeton Univ. Press, New Jersey.

Recibida: abril de 2000

Revista Nuestras Aves, 43: 19-21

NUEVOS REGISTROS PARA AVES POCO CITADAS EN SANTA FE, ARGENTINA

Andrés Pautasso

Juan del Campillo 3.413 (3.000). Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: andrespautasso@yahoo.com.ar

Sirirí vientre negro (*Dendrocygna autumnalis*)

Un ejemplar fue colectado en la laguna El León, arroyo Yacaré, departamento La Capital (Martínez Achenbach, 1957). Es citado como raro y posiblemente visitante estival en el norte santafecino, dentro de la cuña boscosa (De la Peña, 1997).

El 11 de noviembre de 1997 se observaron cinco ejemplares en los espacios perilacunares de un estero con vegetación flotante, 30 km al oeste de la localidad de Calchaquí, departamento Vera; y el 13 de diciembre de 1998 tres individuos en la orilla de la laguna La Salada, Bajos Submeridionales, también departamento Vera. Estos registros, parecen confirmar su presencia estival en la provincia.

Gallineta overa (*Pardirallus maculatus*)

Especie rara, residente y nidificante, con distribución en el centro y norte provincial (De la Peña, 1997). El 17 de octubre de 1998 y el 29 de septiembre de 1999 fue registrado un ejemplar solitario en Colastiné Norte, departamento La Capital, en un estero con vegetación palustre y espacios perilacunares con predominio de paja de techar (*Panicum prionitis*). Luego de una densa niebla, el 6 de septiembre de 1999, se encontraron siete ejemplares muertos y doce vivos con dificultades de vuelo en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias (De la Peña, com. pers.). En la misma fecha se halló uno muerto en El Pozo, Santa Fe, La Capital (Cazenave, com. pers.); y otro en iguales condiciones el 4 de noviembre de 1999 en la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria El Pozo, departamento La Capital.

Playerito unicolor (*Calidris bairdii*)

En Santa Fe existen observaciones dispersas, donde es un raro visitante estival (De la Peña, 1997). El 20 de diciembre de 1998 se registraron tres ejemplares en un grupo de unos 1.000 chorlos integrados también por playerito de rabadilla blanca (*Calidris fuscicollis*), playerito pectoral (*Calidris melanotos*), playerito blanco (*Calidris alba*), pitotoi chico (*Tringa flavipes*) y pitotoi grande (*T. melanoleuca*) en laguna La Salada.

Gaviotín pico negro (*Sterna nilotica*)

Para la provincia es considerado raro, se desconoce su residencia y nidificación, fue observado en verano e invierno en la región central (Martínez Achenbach, 1957; De la Peña, 1997). En enero de 1997, se observó una pareja en los espacios perilacunares de la laguna Melincué, departamento Melincué, donde fue recientemente citada (Di Giacomo *et al.*, 2001). Por otra parte, se avistó un ejemplar en la laguna La Salada el 19 de diciembre de 1998.

Lechuza bataraz chaqueña (*Strix chacoensis*)

Giai en 1950 observó al norte de Tostado, departamento 9 de Julio, una pareja dormitando en un mistol (*Zizyphus mistol*); es mencionada para Santa Fe por Martínez Achenbach (1957). En septiembre de 1998 se registró un ejemplar solitario posado en las ramas de un paraiso, al costado de un camino de tierra forestado con eucaliptos (*Eucalyptus* sp.) y mistol a 8 km al norte de Logroño, departamento 9 de Julio (Mastropaolo, com. pers.).

Añapero boreal (*Chordeiles minor*)

En Santa Fe, fue registrado en Esperanza (De la Peña, 1988). El 11 de enero de 1998, se observó una pareja en vuelo alrededor de un foco, que capturaba insectos en horas crepusculares y nocturnas, en el paraje Los Zapallos, departamento Garay, ambiente del valle de inundación del río Paraná, forestado con especies exóticas y muy modificado.

Curiango (*Nyctidromus albicollis*)

Giai (1950) cita a la especie para el departamento 9 de Julio y la menciona como un ave muy escasa. El 28 de noviembre de 1998 se observó un ejemplar solitario en el suelo a orillas de un mogote de monte bastante modificado y abierto por el constante pisoteo del ganado, a 8 km al norte de Logroño.

Pijú plumizo (*Synallaxis spixi*)

Para el centro-este de Santa Fe es un residente raro y nidificante (De la Peña, 1997). En enero de 1999, se registró un ejemplar que se desplazaba en un chilcal de un albardón interior de la Reserva El Pozo. El 17 de febrero del mismo año, fue observado un individuo solitario en montes chaqueños linderos a la ruta provincial 28, 30 km al oeste de la ruta nacional 11, departamento Vera.

Curutié ocráceo (*Cranioleuca sulphurifera*)

Se han registrado observaciones dispersas en el centro-oeste provincial, donde es raro, residente y nidificante (De la Peña, 1997). En marzo de 1999 fue observado un ejemplar solitario en la periferia con predominio de paja de techar de una laguna semipermanente, en la Reserva El Pozo.

Canastero coludo (*Asthenes pyrrholeuca*)

Registrado para el norte provincial como visitante invernal (Martínez Achenbach, 1957; De la Peña, 1997). En la Reserva El Pozo, en la primera quincena de junio de 1999, fueron observados dos ejemplares y, en la segunda, cinco individuos dispersos en un pastizal con predominio de paja de techar. El 17 de julio de 1999 se registraron dos individuos, en dos oportunidades, y tres ejemplares solitarios en espartillares con predominio de espartina (*Spartina argentinensis*) en las cercanías de la ruta provincial 32, 12 km al este de la intersección con la ruta 13, Bajos Submeridionales, departamento Vera. El 7 de octubre de 1999 fue encontrado muerto un ejemplar en Esperanza (De la Peña, com. pers.).

Canastero enano (*Spartonoica maluroides*)

Se conocen observaciones dispersas en el centro provincial, donde es raro y posible nidificante (Martínez Achenbach, 1957; De la Peña, 1997). El 21 de diciembre de 1998, fueron observados tres ejemplares en un arbustal de chilca (*Tessaria dodonaefolia*) al costado de la ruta 13, en un sector de la "Cañada de las víboras" (28° 35' S, 60° 45' O), departamentos 9 de Julio y Vera.

Tachurí canela (*Polystictus pectoralis*)

La especie presenta con observaciones dispersas en el centro de la provincia, donde es raro, residente y nidificante (De la Peña, 1997). En septiembre de 1999 se observó una pareja en espacios perilacunares con predominio de paja de techar y cubetas con juncos (*Schoenoplectus californicus*), en la Reserva El Pozo.

Mosqueta ceja blanca (*Cnemotriccus fuscatus*)

Citada para Santa Fe por Martínez Achenbach (1957). El 29 de septiembre de 1998, se observó un ejemplar solitario en un mogote de monte con quebracho blanco (*Aspidosperma quebracho-blanco*), chañar (*Geoffroea decorticans*) y sombra de toro (*Jodinia rhombifolia*). Este monte es muy utilizado como dormitorio por el ganado; el estrato herbáceo y arbustivo está muy degradado. La estancia se encuentra a 8 km al norte de Logroño.

Burlisto castaño (*Casiornis rufa*)

Tiene dos registros para Santa Fe (Baldo, *et al.*, 1995; De la Peña, 1996). En marzo de 1999, fue observado un ejemplar solitario, en la Reserva de Uso Múltiple "Lagunas y Palmares" (29° 45' S, 60° 35' O), departamento Vera, en un ambiente con dominio de la palma blanca (*Copernicia alba*), y alternado con algarrobos (*Prosopis* sp.).

Golondrina ribereña (*Stelgidopteryx ruficollis*)

La especie está citada para el centro y noreste santafecino (Martínez Achenbach, 1957; De la Peña, 1997). El 2 de enero de 1998 sobre la ruta provincial 70, 2 km al oeste del río Salado, departamento Las Colonias, se registró un grupo de 57 ejemplares que se alimentaba y realizaba vuelos sobre un charco semipermanente; siete días después permanecían allí, sin evidencia de reproducción.

Tangará gris (*Thlypopsis sordida*)

Se distribuye por el norte provincial a lo largo del río Paraná en el departamento General Obligado (De la Peña, 1997). El 16 de octubre de 1999, se observó un ejemplar solitario que se desplazaba en la copa de una arboleda de sauce criollo (*Salix humboldtiana*), lindante a un madrejón, en Colastiné Norte (De la Peña, com. pers.). El 11 de noviembre del mismo año, se registró un individuo en un ambiente similar al anterior en el arroyo Potrero, departamento La Capital.

Cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*)

Se distribuye por el norte provincial en áreas de la cuña boscosa, es raro y nidificante (De la Peña 1997); Collar *et al.* (1992) cita once registros para Santa Fe. En septiembre de 1998, una pareja fue observada en las arboledas de un casco de estancia, 8 km al norte de Logroño (Mastropaolo, com. pers.).

Corbatita blanco (*Sporophila leucoptera*)

Considerada rara y visitante estival en Santa Fe, con registros para el departamento General Obligado (De la

Peña, 1996 y 1997). El 18 de noviembre de 1998 se observó una pareja en un pajonal denso de totora (*Typha* sp.) en las inmediaciones de la laguna La Tigra (28° 45' S, 61° 45' O), departamento Vera; ésta sería la primer cita para los Bajos Submeridionales.

Coludo grande (*Emberizoides herbicola*)

Citado como raro, residente y nidificante, para el centro y norte de la provincia (Giai, 1950; De la Peña, 1997). El 27 de septiembre de 1998, sobre la ruta provincial 32, 12 km al este de la intersección con la ruta 13, Bajos Submeridionales, departamento Vera, se observaron dos individuos de comportamiento confiado, en un pastizal de espartina.

Monterita de collar (*Poospiza torquata*)

Considerada rara y nidificante en Santa Fe, con citas para los departamentos Las Colonias y 9 de Julio (De la Peña, 1996 y 1997). El 24 de septiembre de 1999, fue observada una pareja a 8 km al norte de Logroño, en un potrero con arbustos y ganado.

Diuca (*Diuca diuca*)

Considerada rara para el centro de Santa Fe (De la Peña, 1997). En enero de 1999 fue observada una pareja sobre matas de paja de techar en la Reserva El Pozo.

Agradezco a Martín de la Peña, al guardafauna Juan Martín Mastropaolo y a Jimena Cazenave por el aporte de datos y el apoyo brindado. Y a Ovidio Medrano, José Vittori

y Malvina Arlettaz por su colaboración en las campañas de campo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BALDO, J., M. ORDANO, Y. ARZAMENDIA y A. R. GIRAUDO. 1995. Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fe y Corrientes, Argentina. *Natura Neotropicalis*, 26: 55-59.
- COLLAR, N. J., L. P. GONZAGA, N. KRABBE, A. MADROÑO NIETO, L. G. NARANJO, T. A. PARKER III y D. C. WEGE. 1992. *Threatened Birds of the Americas: The I.C.B.P./I.U.C.N. Red Data Book. Third edition, part 2.* Smithsonian Inst. Press, I.C.B.P., 1.150 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1988. Nuevos registros o aves poco citadas para Santa Fe. *Nuestras Aves*, 16: 17-18.
- DE LA PEÑA, M. R. 1996. Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. *Hornero*, 14: 87-89.
- DE LA PEÑA, M. R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. *Monografía LOLA 15.* Buenos Aires, 128 páginas.
- DI GIACOMO, A. G., A. S. DI GIACOMO y C. A. MARCHISIO. 2001. Nuevos registros de aves para el centro de la Argentina. *Nuestras Aves*, 42: 18-20.
- GIAI, A. 1950. Notas de viajes. *Hornero*, 9: 121-164.
- MARTÍNEZ ACHENBACH, G. M. 1957. Lista de las aves de la provincia de Santa Fe. *Anales Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"*, 1: 1-61.

Recibida: abril de 2000

TRES NUEVAS CITAS DE AVES PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fernando G. Mangueri y Marcelo J. Montenegro

Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata, calle 122 y 60, (1.900) La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Correo electrónico: fgmaugeri@hotmail.com

Estas observaciones, que amplían y mejoran la distribución conocida de tres especies, surgieron al recorrer las barrancas del Paraná, donde se registraron más de 200 especies de aves en cuatro campañas, cada una de tres o cuatro días.

Carpinterito de los cardones (*Melanerpes cactorum*)

En julio de 1999 fue vista una pareja en los bosques de espinal de las barrancas del río Paraná, partido de Ramallo (33° 29' 08" S, 60° 00' 13,7" O). Se encontraban posados en un tala (*Celtis tala*), donde permanecieron un momento a escasos tres metros del observador; luego vocalizaron

y volaron hacia otro tala.

La especie no contaba con registros para la provincia de Buenos Aires (ver Narosky y Di Giacomo, 1993).

Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*)

Un ejemplar fue visto en la Reserva Municipal de Ramallo (33° 26' 46,7" S; 60° 03' 26,8" O) a fines de enero de 2000 cuando se alimentaba de insectos que capturaba en vuelo elástico, usaba como percha un árbol. Este tiránido podría ser confundido con la tijerilla (*Xenopsaris albinucha*), que habita en la región (Narosky y Di Giacomo, 1993; Bodrati *et al.*, 1997), pero ésta tiene una menor longitud y