

Peña, 1996 y 1997). El 18 de noviembre de 1998 se observó una pareja en un pajonal denso de totora (*Typha* sp.) en las inmediaciones de la laguna La Tigra (28° 45' S, 61° 45' O), departamento Vera; ésta sería la primer cita para los Bajos Submeridionales.

Coludo grande (*Emberizoides herbicola*)

Citado como raro, residente y nidificante, para el centro y norte de la provincia (Giai, 1950; De la Peña, 1997). El 27 de septiembre de 1998, sobre la ruta provincial 32, 12 km al este de la intersección con la ruta 13, Bajos Submeridionales, departamento Vera, se observaron dos individuos de comportamiento confiado, en un pastizal de espartina.

Monterita de collar (*Poospiza torquata*)

Considerada rara y nidificante en Santa Fe, con citas para los departamentos Las Colonias y 9 de Julio (De la Peña, 1996 y 1997). El 24 de septiembre de 1999, fue observada una pareja a 8 km al norte de Logroño, en un potrero con arbustos y ganado.

Diuca (*Diuca diuca*)

Considerada rara para el centro de Santa Fe (De la Peña, 1997). En enero de 1999 fue observada una pareja sobre matas de paja de techar en la Reserva El Pozo.

Agradezco a Martín de la Peña, al guardafauna Juan Martín Mastropaolo y a Jimena Cazenave por el aporte de datos y el apoyo brindado. Y a Ovidio Medrano, José Vittori

y Malvina Arlettaz por su colaboración en las campañas de campo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BALDO, J., M. ORDANO, Y. ARZAMENDIA y A. R. GIRAUDO. 1995. Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fe y Corrientes, Argentina. *Natura Neotropicalis*, 26: 55-59.
- COLLAR, N. J., L. P. GONZAGA, N. KRABBE, A. MADROÑO NIETO, L. G. NARANJO, T. A. PARKER III y D. C. WEGE. 1992. *Threatened Birds of the Americas: The I.C.B.P./I.U.C.N. Red Data Book. Third edition, part 2.* Smithsonian Inst. Press, I.C.B.P., 1.150 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1988. Nuevos registros o aves poco citadas para Santa Fe. *Nuestras Aves*, 16: 17-18.
- DE LA PEÑA, M. R. 1996. Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. *Hornero*, 14: 87-89.
- DE LA PEÑA, M. R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. *Monografía LOLA 15.* Buenos Aires, 128 páginas.
- DI GIACOMO, A. G., A. S. DI GIACOMO y C. A. MARCHISIO. 2001. Nuevos registros de aves para el centro de la Argentina. *Nuestras Aves*, 42: 18-20.
- GIAI, A. 1950. Notas de viajes. *Hornero*, 9: 121-164.
- MARTÍNEZ ACHENBACH, G. M. 1957. Lista de las aves de la provincia de Santa Fe. *Anales Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"*, 1: 1-61.

Recibida: abril de 2000

TRES NUEVAS CITAS DE AVES PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fernando G. Mangeri y Marcelo J. Montenegro

Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Universidad Nacional de La Plata, calle 122 y 60, (1.900) La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Correo electrónico: fgmaugeri@hotmail.com

Estas observaciones, que amplían y mejoran la distribución conocida de tres especies, surgieron al recorrer las barrancas del Paraná, donde se registraron más de 200 especies de aves en cuatro campañas, cada una de tres o cuatro días.

Carpinterito de los cardones (*Melanerpes cactorum*)

En julio de 1999 fue vista una pareja en los bosques de espinal de las barrancas del río Paraná, partido de Ramallo (33° 29' 08" S, 60° 00' 13,7" O). Se encontraban posados en un tala (*Celtis tala*), donde permanecieron un momento a escasos tres metros del observador; luego vocalizaron

y volaron hacia otro tala.

La especie no contaba con registros para la provincia de Buenos Aires (ver Narosky y Di Giacomo, 1993).

Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*)

Un ejemplar fue visto en la Reserva Municipal de Ramallo (33° 26' 46,7" S; 60° 03' 26,8" O) a fines de enero de 2000 cuando se alimentaba de insectos que capturaba en vuelo elástico, usaba como percha un árbol. Este tiránido podría ser confundido con la tijerilla (*Xenopsaris albinucha*), que habita en la región (Narosky y Di Giacomo, 1993; Bodrati *et al.*, 1997), pero ésta tiene una menor longitud y

una coloración más clara, además carece del ápice caudal manchado de blanco.

La especie, migradora de América del Norte (Narosky e Yzurieta, 1987), no contaba con registros para la provincia de Buenos Aires (ver Narosky y Di Giacomo, 1993).

Lavandera (*Fluvicola leucocephala*)

En enero de 1999 fue visto un ejemplar macho en un pajonal de juncos (*Schoenoplectus californicus*), situado en el noreste de la provincia de Buenos Aires, partido de Ramallo (33° 29' 08" S, 60° 00' 13,7" O). Al año siguiente, a fines de enero, fue registrado otro macho adulto solitario, cercano a ese lugar (33° 28' 34,2" S, 59° 59' 53,2" O) que usaba como percha un junco y se exhibía en actitud muy pasiva.

La lavandera es un tiránido que habita juncales y esteros en el norte del país (Narosky e Yzurieta, 1987) pero que no contaba con citas para la provincia de Buenos Aires (ver Narosky y Di Giacomo, 1993).

Agradecemos a Carlos Darrieu por su generosidad y permitírnos consultar el material a su cargo en el Museo de La Plata, y a Damián Voglino por sus comentarios sobre el manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BODRATI, A., G. BODRATI, C. FERRARI, E. MÉRIDA y E. HAENE. 1997. Notas sobre la avifauna del Baradero, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 37: 2-3.
NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.
NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.

Recibida: noviembre de 2000

Revista Nuestras Aves, 43: 22-23

PRIMERA OBSERVACIÓN DEL COLIBRÍ MEDIANO (*Colibri serrirostris*), EN LA PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA

Germán Pugnali

Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. 25 de Mayo 749, 2 «6». (1.002) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: gpugnali@yahoo.com

La presencia de bebederos para picaflores en las zonas urbanas es una novedad de los últimos años en la Argentina, que ha comenzado a atraer tanto a estas aves como a sus observadores. Estos medios permiten una observación detallada de muchas especies que, de otra manera, suelen ser más difíciles de observar e identificar dada la velocidad de su vuelo y movimientos.

En Puerto Iguazú, Misiones, existe un jardín con bebederos muy conocido por los observadores de aves, debido a la gran cantidad de especies y ejemplares de picaflores que lo visitan; también hay plantas con flores que atraen a estas aves.

El 11 de octubre de 2000, durante dos visitas, una por la mañana y otra por la tarde, a este jardín, observé en más de cinco oportunidades un ejemplar del colibrí mediano (*Colibri serrirostris*). Compartía uno de los bebederos con otras especies de picaflores. Aparecía para beber durante un par de minutos y luego desaparecía entre la espesura de la vegetación o se posaba en las ramas de los árboles y arbustos de los alrededores.

El colibrí mediano es una especie de tamaño grande, de pico largo y con un evidente apéndice de plumas color púrpura que salen hacia atrás de la cara, a la altura de la zona auricular, aparentando una larga «patilla». Además, la zona subcaudal es blanca y la cola verdosa posee una banda subapical azulada. Todas estas características lo

diferencian claramente de otras especies de su género y del picaflor de barbijo (*Heliomaster furcifer*), con quien se lo podría confundir.

Otras especies de picaflores observadas ese día en el bebedero fueron ermitaño escamado (*Phaethornis eurynome*), ermitaño canela (*Phaethornis pretrei*), picaflor negro (*Melanotrochilus fuscus*), picaflor vientre negro (*Anthracothorax nigricollis*), picaflor común (*Chlorostilbon aureoventris*), picaflor bronceado (*Hylocharis chrysura*), picaflor esmeralda (*Amazilia versicolor*), y picaflor corona violácea (*Thalurania glaucopis*). En numerosas oportunidades se observaron interacciones agresivas interespecíficas, donde normalmente eran las especies de mayor tamaño las que lograban imponerse.

La distribución geográfica conocida para el colibrí mediano abarca desde Bolivia por el noroeste de la Argentina hasta Córdoba, Santa Fe y Corrientes (Giai, 1950; Olog, 1979; Contreras y Contreras, 1984; De la Peña, 1999; Del Hoyo *et al.*, 1999). Está citado también en Brasil en los estados de Mato Grosso, Goiás, Bahía y Espíritu Santo (Del Hoyo *et al.*, 1999) y Río Grande do Sul (Ruschi, 1956 en Belton, 1984) y en Paraguay, en los departamentos orientales de Itapúa y San Pedro, es el primer registro para Encarnación, localidad fronteriza con Misiones (Hayes, 1995).

El único registro para el noreste de la Argentina, corres-