NUESTRAS AVES

BOLETIN DE LA ASOCIACION ORNITOLOGICA DEL PLATA

AÑO IV - Nº 11
Diciembre 1986

RATONA COMÚN (*Troglodytes aedon*)

Dibujo: Norma De Paoli

C.I.P.A. Informa:

La Feria de Duque de Caxias

Nuestros amigos del Clube de Observadores de Aves do Río de Janeiro nos hacen llegar los resultados de una investigación efectuada en la Feria de Duque de Caxias, en el Estado de Río de Janeiro, donde por más de 30 años se ha venido efectuando la venta ilegal de numerosísimos representantes de la fauna silvestre de ese país. El pasado 31 de agosto una acción conjunta de la Policía Militar y la Policía Militar y la Policía Federal decomisó unos 5.000 animales (en su mayor parte aves), aunque otras fuentes hablan de 10.000. El valor de estos animales fue estimado en 145.000 dólares. También se estima que esta feria es la responsable del 50 por ciento del tráfico internacional de fauna en el Brasil.

En un relevamiento personal efectuado por C.E. Carvalho, desde 1980 a 1983, visitando todos los domingos la feria, llegó a detectar 6 especies de reptiles, 31 de mamíferos y 209 de aves, de las cuales 144 se cuentan en la avifauna argentina.

Por todo ello resulta imprescindible contar con apoyo internacional para que el gobierno brasileño continúe con su política de prohibir la comercialización de fauna y en consecuencia no autorice la venta de animales silvestres en esta feria.

Así que le proponemos a nuestros socios

y amigos el envío de cartas de apoyo al: Sr. Presidente José Sarney, Palacio do Planalto, 70150 Brasilia - D.F., Brasil; Sr. Ministro Marco Maciel, Presidencia da República, 70150 Brasilia - D.F. Brasil y al Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF - Dr. Jaime Santiago, Palacio do Desenvolvimento, 12º andar, sector Bancario Norte, 70057 - Brasilia - D.F., Brasil.

Y con Pompeya y Villa Domínico... ¿qué sucede?

En la Argentina como es sabido también desde hace muchos años se viene vendiendo ilegalmente en las ferias dominicales de Nueva Pompeya (Capital Federal) y Villa Domínico (partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires) una gran cantidad de especies de nuestra fauna, produciéndose un fenómeno muy similar a lo que sucede con la Feria de Duque de Caxias, en Brasil, con el agravante de que los argentinos, además de no haber efectuado operativos tan contundentes de control, no hemos sabido organizarnos adecuadamente en las entidades conservacionistas para efectuar un trabajo similar al de nuestros amigos brasileños.

No ha aparecido aún entre nosotros el C.E. Carvalho que se dedique a reunir datos de la fauna allí comercializada para poder de este modo contar con los elementos fundamentales, para encarar ante las autoridades los reclamos necesarios que motiven la realización de decomisos masivos, multas y sanciones apropiadas a los infractores y el desalojo total de estos ya lamentablemente famosos mercados de mascotas.

Hasta que eso suceda la desaparición de estos tristes espectáculos no dejará de ser más que una suma de buenas intenciones.

Por ello, solicitamos a nuestros amigos que deseen ayudarnos, acercarse a las reuniones mensuales de trabajo del Grupo Juvenil del CIPA.

PREDACION DEL BENTEVEVO SOBRE PECES Y TORTUGAS

Durante el período 1981 a 1982 realicé distintos viajes a los sectores Centro y Norte de la Provincia de Mendoza, formando parte de un programa de exploración y relevamiento de fauna en espejos de agua dulce (naturales y artificiales) a cargo del Grupo de Actividades Subacuáticas del Acuario Municipal de Mendoza (Programa de Investigación A.M.M. n° 12). Uno de los resultados de esta campaña fue la ubicación de dos poblaciones de la tortuga de laguna, *Phrynops hilarii* (Chelonii, Chelidae), no citada hasta entonces para la provincia (Richard, 1985 y 1986).

En nuestras labores nos acompañó en todo momento el bentevevo, *Pitangus sulphuratus* (Passeriformes, Tyrannidae), lo que nos permitió observar algunos hábitos tróficos de este pequeño oportunista, como así también obtener algunos datos de interés que amplían el espectro alimentario conocido de la especie (Aravena, 1928; Beltzer, 1983 y Pereyra, 1928).

A finales del verano de 1981, acampando a orillas del Río Mendoza (ruta nac. n° 7, entre las localidades de Cacheuta y Potrerillos), pudimos ver a este tiránido pescando, de modo semejante al martín pescador, cerca de nuestras redes; sus presas las constituían los pequeños bagres cordilleranos: *Hatcheria macraei* y *Trichomycterus mendozensis* (Siluriformes, Trichomycteridae) y las mojarras panzonas: *Jenynsia lineata lineata* y *Cnesterodon decemmaculatus* (Atheriniformes, Jenynsiidae y Poeciliidae), con gran predilección por los primeros.

Dibujo: Francisco Contino

De Enero a Abril de 1982 establecimos campamentos semipermanentes en el embalse El Carrizal (Dpto. Rivadavia, Dto. Carrizal) y Lagunas de Alto Verde (Dpto. San Martín, Dto. Alto Verde) con el objeto de observar a la tortuga de laguna en sus hábitos reproductores.

Las mencionadas lagunas se ubican en un área de intensa acción antropógena (zona de cultivo de vid y frutas); están formadas por cuerpos artificiales de agua clara de poca profundidad, rodeados de sauces (*Salix* sp) y álamos (*Populus* sp), con una vegetación acuática constituida principalmente por elementos emergentes:

tatora (*Typha dominguensis*) y algunas gramíneas que penetran parcialmente en el agua. En este ambiente tuvimos la oportunidad de ver al benteveo alimentándose de caracoles (*Ampullaria* sp) y de las mojarras ya citadas; luego, a fines de Marzo y principios de Abril con la aparición de las primeras tortugas recién nacidas en los totorales cercanos, pudimos presenciar algunos ataques que ocasionalmente efectuaban estos tiránidos sobre ellas, tanto en tierra y objetos flotantes (mientras salían del agua para asolearse) como en agua.

Para capturar una tortugueta, el benteveo se lanza (no siempre con éxito) desde su lugar de acecho (ramas de sauce o alguna tatora) y volando sobre la superficie la toma desprevenida con el pico por el cuello, la pata o la caparazón, para luego en tierra golpearla contra la misma o alguna roca cercana y comenzar a picotear al quelonio cuando aún muestra signos de vida y trata de zafarse. En algunos restos encontrados más tarde pudimos constatar que las partes atacadas eran principalmente la cabeza, cuello y gran parte de las vísceras, las que aparentemente fueron extraídas del cuerpo por la región comprendida entre el cuello y la pata o por la región análoga de la parte trasera del animal; en otros la caparazón mostraba distintos grados de rotura. Estos datos se tomaron en días secos, despejados y sin brisa.

Finalmente cabe destacar que si bien la presencia de *P. hilarii* en Mendoza obedecería a un patrón de dispersión antropocórica (Richard, op. cit.) es muy posible (sobre todo teniendo en cuenta que el área de distribución de *P. sulphuratus* cubre

totalmente a la de *P. hilarii*) que en su lugar de origen el benteveo represente un predador, al menos ocasional, de las crías de esta toruga dulceacuícola.

Expreso mi agradecimiento a las siguientes personas: Sra. P.E. Belmonte de Richard, Prof. A. Nacevich, Lic. C.D. Laredo, Lic. C. Buti y Dr. G. Scrocchi por sus consejos y crítica.

BIBLIOGRAFIA

- ARAVENA, R.O. 1928. Notas sobre la alimentación de las Aves. El Hornero 4 (2):152-166.
- BELTZER, A.O. 1983. Alimentación del "Benteveo" (*Pitangus sulphuratus*) en el Valle Aluvial del Río Paraná Medio. (Passeriformes: Tyrannidae) Rev. Asoc. Cienc. Nat. del Litoral, 14 (1): 47-52.
- PEREYRA, J.A. 1928. Miscelánea ornitológica. El Hornero, 4 (2):199-202.
- RICHARD, E. 1985. *Phrynosoma hilarii* (D. et B.) como elemento de la fauna antropocórica de la Provincia de Mendoza. Bol. Asoc. Herp. Arg., 2 (4):7 (Resumen).
- , 1986. Sobre la presencia de tortugas dulceacuícolas (Testudines: Chelidae) en la Provincia de Mendoza. Bol. Asoc. Herp. Arg., 3 (en prensa).
- RUIDIAZ, A. et al. 1983. El Benteveo. In: Fauna Argentina (C.E.A.L.), 3 (29): 1-32.

Enrique Richard

Programa de Herpetología (CONICET)

Fundación Miguel Lillo - Tucumán

ASOCIACION DEL PICAFLOR CORONA AZUL CON EL BANANERO

Es sabido, según BORRERO (1965) de la asociación del colibrí Coli-Rojo (*Amazilia Tzacatl*), que liba de flores que anteriormente han sido perforadas por el Bananero, en Medellín, Colombia.

Durante la primavera-verano de 1984-85, en el Parque Nacional Iguazú, provincia de Misiones, se ha observado un comportamiento similar entre el picaflor Corona azul (*Thalurania glaucopsis*) y el Bananero (*Coereba flaveola*). Dicho comportamiento se manifestó en varios ejemplares de (*Sanchezia nobilis*) —Acantaceas—, que se encuentra en zona parquizada del Area Cataratas.

En éstos lugares de vegetación abierta, *T. glaucopsis*, es el picaflor más común, siguiéndole en abundancia *Chlorostilbon aureoventris*.

S. nobilis, se caracteriza por tener flores amarillas, tubulosas, con estilo filiforme y 2 estambres salientes, insertos en la parte inferior del tubo corolino. Las flores se hallan dispuestas en grandes inflorescencias terminales, con el raquis purpúreo y las brácteas rojas. Los largos de corola medidos varían entre 33 y 50 mm. (Dimitri, 1980).

El Bananero, para alimentarse perfora un orificio de 6 a 10 mm. de diámetro en la base de cada corola; y el picaflor Corona azul, que posee

un pico de aproximadamente 20 mm. de largo, debe en forma necesaria introducirlo en dicho orificio para aprovechar el alimento.

La mayoría de las observaciones se hicieron en una sola planta; en donde se pudo comprobar que casi a diario y durante todas las horas de luz, un picaflor, generalmente macho, recorre las flores buscando la perforación en la base de cada corola. Durante el período de mayor floración un ejemplar macho ocupó permanentemente la planta, defendiéndola de otros que intentaban alimentarse. En una oportunidad, expulsó cuatro veces, en el transcurso de 5 minutos a un macho de picaflor común (*Chlorostilbon aureoventris*), persiguiéndolo hasta 20 mts. de la planta y regresando rápidamente a la misma rama. Expulsiones similares ocurrieron también entre los Bananeros.

De las observaciones de flores durante el período de fructificación, se deduce que el accionar de éstas dos especies, aparentemente no favorece en gran medida la polinización; ni perjudica la fructificación, ya que la mayoría de las flores perforadas, desarrollaron su fruto cápsula al igual que las demás.

BIBLIOGRAFIA

- BORRERO, H. JI. 1965.** Notas sobre el comportamiento del Colibrí Coli-Rojo (*Amazilia tzacatl*) y el Mielero (*Coereba flaveola*) en Colombia. Hornero Vol. 10, Nº 3; 247:250.
- DIMITRI, M.J. 1980.** Enciclopedia Arg. de agricult. y jard. Tomo I, Segundo volumen, pág.: 987.

MIGUEL A. CASTELINO
Guardaparque P.N. Iguazú

** ** *

PRESENCIA DEL CHORLO NADADOR DE PICO FINO EN ÑIRIHUAU, DEPARTAMENTO PILCANIYEU, PROVINCIA DE RIO NEGRO

El río Ñirihuau desemboca en el lago Nahuel Huapi, a aproximadamente 10 km. al este de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

No obstante la proximidad de los bosques andino-patagónicos, es una zona ya esteparia, con la salvedad de la zona próxima al río, donde existe un ambiente palustre y fuertemente modificado.

Las alteraciones del suelo más significativas están dadas por la elevación del terreno para la construcción de la Ruta Nacional nº 237 que se hace muy notorio en proximidades del puente sobre el río. Precisamente,

para esta construcción, el cauce del río ha sido ensanchado, lo que desminuye lógicamente la profundidad del agua y aparecen islotes de pedregullo y arena. Esta parte es frecuentada por varias especies de chorlos.

En lo que respecta a la flora, la zona descrita se encuentra muy invadida por una mata exótica, la rosa mosqueta (Rosa), y se presentan también algunos sauces (*Salix*) y álamos (*Populus*).

De la desembocadura del río al puente median unos 400 metros.

A ambos lados de la ruta en inmediaciones del río, han quedado depresiones que fueron

ganadas por el agua que forma charcas de pequeñas dimensiones donde proliferan algunas plantas acuáticas. Es en una de estas charcas donde el día 1^e

charcas donde el día 1° de febrero de 1986, los autores observaron por primera vez en diez años de periódicas salidas a campo por la zona, un ejemplar de *Phalaropus lobatus* (Linné). Es un ave muy confiada. Pudimos observarla desde la orilla de la charca a unos 6 metros. Presentaba —como es lógico para la época— plumaje invernal, en el que predomina el color blanco, con las partes superiores gris azuladas, líneas oscura que atraviesa y se prolonga por detrás del ojo, pico delgado y negro. Es muy activo, picoteando de continuo en el agua a un lado y al otro, mientras nada.

De la bibliografía consultada, surge que es ave pelágica y se la encuentra en altamar en el Pacífico frente a las costas de Perú y Chile, desde octubre hasta abril. Hay citas de presencia accidental en la Patagonia.

A nuestro criterio, se trata de una presencia meramente accidental, y podemos agregar que en los días previos a su observación se desataba, originada en el Pacífico, una

fuerte tormenta, probable motivo del extravío de esta ave.

Agradecimiento:

A Daniel Gorgone, por la revisión de este escrito.

Bibliografía

- DABBENE, R. 1972. (Aves de Caza (Recopilación de artículos publicados en la revista La Diosa Cazadora —1927/38)—
- GOODALL, J.D., A.W. JOHNSON y Dr. R.A. PHILIPPI, Las aves de Chile, sus conocimientos y sus costumbres. Tomo Segundo, 1951.
- OLROG, Cl. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27. 1979.
----- Las aves argentinas. "Una nueva guía de Campo". Administración de Parques Nacionales, 1984.
- TUCK, G. y H. HEINZEL. A field guide to the seabirds of Britain and the world. 1978.

Anibal Casas
Mariano Gelain
Bariloche

** ** *

NUEVA DISTRIBUCION PARA EL CHORLITO DE COLLAR

Revisando la bibliografía que poseemos sobre la distribución de esta especie *Charadrius collaris*, hemos encontrado en ella, que a pesar de que el Dr. J.R. Navas (1970), en su trabajo "Nuevos registros de Aves para la Patagonia", cita dos capturas realizadas en la provincia de Río Negro, en obras sucesivas es integrada a su distribución con grandes altibajos, razón ésta por la que citamos la distribución señalada en las distintas obras revisadas por nosotros.

DISTRIBUCION: desde México hasta la provincia de Buenos Aires, es señalada por; Deautiet y Steullet 1935-1946:567-569;Phi-

lippi, Johnson y Goodall 1951 (tomo II): 214; Zotta 1944: 55; J. Cuello, E. Gerzentein 1962: 71 y Olrog 1959: 113, quien en 1979: 21 la señala hasta Río Negro, en 1984: 276 la señala hasta el sur de Buenos Aires y el norte de Río Negro. Gore y Gepp 1978: 121 y T. Narosky 1978: 57 la señalan desde México hasta Buenos Aires; Nores e Yzurieta 1980: 102 dan la misma distribución. Nores, Yzurieta y Miatello, 1983. Lista y Distribución de las Aves de Córdoba. Bol. Acad. Nac. Cienc.: *Charadrius collaris*: Desde el norte hasta Neuquén y Río Negro. Nores e Yzurieta, 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte II. Hist. Nat. 2

(17): 151-152: citan un ejemplar para Neuquén.

Quienes escriben la presente han visto con cierta regularidad al Chorlito de Collar en la costa Este del Lago Nahuel Huapi sobre el desemboque del río Ñirihuau (ver A. Gelain Bol. "Nuestras Aves", año II n.4: 26), entre los meses de octubre y febrero de los años, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986. Con estos registros se confirma la presencia de esta especie como visitante estival para la región Occidental de Río Negro.

Bibliografía

- Cuello J. y Gerzenstein E. 1962.** Las Aves del Uruguay, Lista sistemática, Distribución y Notas, Com. Zool., del Museo de Hist. Nat. de Montevideo, Vol. VI, N.93.
- Deautier, Steullet 1935-1946,** Catálogo sistemático de las Aves de la República Argentina. Obra cincuentenario del Museo de la Plata. Buenos Aires.
- Gore y Gepp 1978,** Aves del Uruguay, Mosca Hnos. Montevideo, Uruguay.
- Narosky, T. 1978,** Aves Argentinas, Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense, Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Navas, J.R. 1970. Nuevos registros de aves para la Patagonia, Neotrópica, 16 (49): 11-16.

Nores e Yzurieta, 1980. Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y Centro de Argentina, Se. Estado de Agr. y Gan. Direc. de Caza, pesca y actividades acuáticas de la prov. de Córdoba.

Olog C. 1959. Las Aves Argentinas una guía de campo, Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.

----- **1979.** Nueva lista de la Avifauna Argentina, Instituto Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.

----- **1984.** Las Aves Argentinas. Una Nueva guía de Campo, Administración de Parques Nacionales.

Philippi, Johnson y Goodall 1951. Tomo II, Aves de Chile. Ed. Platt Buenos Aires.

Zotta A.R. 1935-1944. Lista sistemática de las aves Argentinas, Revista el Hornero, Buenos Aires.

Mariano Gelain
Anibal Casas
S.C. de Bariloche

** ** *

PRESENCIA DEL PINGUINO REY EN EL LITORAL

ATLANTICO BONAERENSE

El 20 de Julio de 1986 en playas de Aguas Verdes, localidad del Partido de la Costa, provincia de Buenos Aires, fue encontrado por lugareños un Pingüino Rey *Aptenodytes patagonica*, especie rara de frecuentar estas latitudes, ya que su hábitat natural se restringe a los mares de la zona Sud y Antártica Argentina. Se

considera al mismo un individuo juvenil, por presentar una talla de 67 cm. y un peso de 15 kg., llegando en su madurez a alcanzar de 1 a 1.20 mt. de altura y entre 20 y 30 kg. de peso.

Al ser rescatado presentaba una extraña herida bajo el ala izquierda, motivo por el cual fue trasladado a las

Pingüino Rey
Aptenodytes patagonica

instalaciones de Mundo Marino en San Clemente del Tuyú donde se encuentra en la actualidad en cautiverio bajo especiales cuidados.

Gabriel E. Battaglia
Javier C. Salerno

** ** *

UN AVE NUEVA PARA EL "IMPENETRABLE" CHAQUEÑO:

EL ANAMBE CASTAÑO

La reciente colección, en agosto de 1986, de un ejemplar de *Pachyramphus castaneus castaneus* en las inmediaciones de la localidad de Pozo de los Suris, situada en el Departamento Güemes de la Provincia del Chaco, a 25° 04' sur y 61° 27' oeste, en plena formación boscosa, conocida como el "Impenetrable", significa una notable ampliación del área conocida para el anambé castaño.

Los registros previos más cercanos corresponden a la Provincia de Misiones (OLROG, 1978: 198), el este

del Paraguay Oriental (LAUBMANN, 1940, 2: 66) y el este y sudeste del Brasil, hasta el noreste del Estado de Río Grande do Sul (BELTON, 1985: 81).

El hallazgo chaqueño fue efectuado en una zona de bosque denso y húmedo costero de una lagunita cerca del curso del Río Bermejito. Se trata de una hembra adulta de 23 gramos, solitaria, que se desplazaba entre el follaje denso. Ha sido depositada bajo el número CE-003157 en la Colección Ornitológica Félix de Azara, Corrientes.

Intensas prospecciones realizadas en la zona y en una serie de localidades próximas, todas ellas en sectores más secos del Impenetrable, fueron negativas en cuanto a nuevos registros de la especie. Posiblemente, ésta habite en muy baja densidad en las masas selváticas bordeantes de los cursos del Río Bermejo y del Bermejito. Al igual que en Río Grande do Sul, que está en el extremo de su distribución oriental, es "muy escasa y ocurre esporádicamente" (BELTON, 1985). Posiblemente la exploración metódica de los ambientes perifluviales chaqueños, hasta ahora apenas iniciada, contribuya a completar un buen panorama de la distribución de *Pachyramphus castaneus castaneus*, cuya presencia local es coherente con una interpretación de la avifauna terrestre chaqueña como suma de dos

elencos diversos, uno adaptado a los ambientes típicamente chaqueños y otro, de tipo marcadamente tropical y subtropical, que penetra con las formaciones boscosas que acompañan a los ríos.

BIBLIOGRAFIA

- BELTON, W. 1985. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part 2. Formicariidae through Corvidae. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 180 (1): 1-242, maps 131-226, 1 tab.
- LAUBMANN, A. 1940. Die Vögel von Paraguay. II. Strecker & Schröder, Stuttgart, pp. i-viii + 1-229.
- ORLOG, C.C. 1978. Nueva lista de la Avifauna Argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324. Tucumán.

Julio Rafael Contreras
Andrés Oscar Contreras
Corrientes

** ** * * *

LA COMERCIALIZACION DE AVES SILVESTRES EN CAPITAL FEDERAL

UN PROBLEMA QUE INVOLUCRA A TODAS LAS PROVINCIAS

En la medida de lo posible es mi intención mostrar una realidad muy lamentable que desde hace varias décadas tiene vigencia en nuestro país; me refiero concretamente a la comercialización de nuestras aves silvestres en la Capital Federal. Amparado en mi aparente condición de comerciante de la fauna silvestre, en febrero de 1984 visité la llamada feria de los pájaros situada en el barrio de Pompeya. De esta manera me fue posible charlar con algunos de los feriantes y obtener información seguramente muy útil en el futuro para el movimiento conservacionista.

En el interior de la feria me fue posible comprobar unos 40 puestos de venta que exhibían al público alrededor de cinco mil

ejemplares (el 80 por ciento pertenecía a la fauna nativa, el 20 restante a aves importadas y de cautiverio). Completaban la muestra, mariposas, peces y tortugas. En este mercado persa, en donde se ofrecían desde especies consideradas perjudiciales hasta especies en franco proceso de extinción, era posible adquirir también todos los implementos necesarios para la captura de aves, tales como gomas llamadas vulgarmente pega-pega, redes de captura tipo neblina y sofisticadas tramperas de los más diversos tipos.

El cuadro número uno muestra la cantidad de ejemplares comercializados por especie en el puesto de venta llamado El Caburé.

Cuadro n° 1	Nombre científico	Cantidad de ejemplares para la venta
1 Cardenal amarillo	Gubernatrix cristata	4
2 Zorzal cordobés	Turdus chiguanco	4
3 Cabecita negra	Carduelis magellanica	30
4 Brasita de fuego	Coryphospingus cuculatus	20
5 Churrinche	Pyrocephalus rubinus	10
6 Jilguero	Sicalis flaveola	40
7 Zorzal mandioca	Turdus amaurochalinus	80
8 Reina mora	Cyanocompsa cyanea	10
9 Cardenal copete rojo	Paroaria coronata	30
10 Loro barranquero	Cyanoliseus patagonicus	10
11 Corbatita	Sporophila caerulea	20
12 Federal	Amblyramphus holosericeus	10
13 Calandria real	Mimus triurus	6

El cuadro número dos esquematiza algunos precios de venta al público, vigentes a febrero de 1984.

Cuadro 2	Nombre científico	Precios de venta al público
1 Cardenal amarillo	Gubernatrix cristata	\$a. 460
2 Tordo chaqueño	Gnorimopsar chopí	\$a. 2.000
3 Charlatán	Dolichnyx oryzivorus	\$a. 80
4 Cardenal rojo	Paroaria coronata	\$a. 100

Sorprendido ante tanta impunidad consulto (respecto de las leyes vigentes que limitan este tipo de actividades) a uno de los comerciantes allí presente y me responde que "el permiso para el funcionamiento de esta feria es expedido por la autoridad municipal competente, hallándose absolutamente prohibida en este lugar la compra masiva de aves silvestres nativas".

De todos modos, subterráneamente las operaciones comerciales de envergadura son realizadas dentro de la feria en donde los precios se rigen particularmente por la oferta y la demanda. Por ejemplo, cuando la demanda de Cardenales de Copete Rojo (Paroaria coronata) supera la oferta, los precios suben a niveles increíbles; lo mismo sucede con el resto de las especies.

Lo cierto es que este tipo de actividades se desarrolla debido sobre todo a dos grandes razones: 1) existe un importante mercado consumidor cada vez mas ávido por este tipo de mascotas. 2) las provincias canalizan el grueso de las capturas hacia la Capital Federal; aquí los grandes acopiadores de vida destinan una parte de las aves a la exportación y el resto al mercado nacional¹.

Téngase en cuenta que en general entre el 40 y el 70 por ciento del total comercializado muere durante las tareas de captura y transporte.

Conocemos el origen del problema, la forma en que se desarrolla y sus consecuencias pero es prioridad uno conocer cifras, para ello se hace necesario que las organizaciones ambientalistas de todo el país se pongan en marcha y ha-

gan su aporte como lo ha hecho ya la Fundación Vida Silvestre Argentina.²

El señor Miguel Woites por su parte en la revista "Nuestras Aves" dice: "según datos de un pajarero que abandonó la actividad y se dedica a otras cosas, del Chaco solamente, salen por semana cinco mil o seis mil pájaros clandestinamente".³

Tomando el primer valor como referencia, en el término de 4 semanas o lo que es lo mismo, un mes, son comercializadas nada menos que 20.000 aves sil-

vestres.

Estos datos se contraponen en gran medida a las cifras aportadas por el Lic. Cajal quien dice: "con respecto a las aves, cálculos razonables hablan de una explotación inferior a los 7.000 ejemplares vivos por mes, provenientes de la región chaqueña".

En febrero de 1985, en la ciudad de Santa Fe, entrevisté a un acopiador de la fauna alada y me fue posible obtener los precios de las especies que se mencionan en el cuadro n° 3.

Cuadro 3.

Nombre vulgar	Nombre científico	Precios compra nivel mayorista
1 Cardenal rojo	Paroaria coronata	\$a. 400
2 Cardenilla	Paroaria capitata	\$a. 200
3 Congo	Agelaius ruficapillus	\$a. 200
4 Dominó criollo	Sporophila collaris	\$a. 200
5 Canario común (*)	Serinus canaria	\$a. 600
6 Canario colorado (*)	Serinus canaria	\$a. 1.200
7 Cardenal amarillo	Gubernatrix cristata	\$a. 2.000
8 Ruiseñor (*)	Alauda arvensis	\$a. 300
9 Siete colores	Thraupis bonariensis	\$a. 300
10 Canario cobrizo (*)	Servinus canaria	\$a. 1.200

(*) Aves exóticas.

En la provincia de Santa Fe estas actividades se encuentran absolutamente prohibidas y se desarrollan por lo tanto en forma ilegal; al respecto se hace necesario destacar la gestión del Ing. Biani en favor de la fauna silvestre, quien ha encarado (en calidad de Director de Ecología y Protección de la Fauna) la aplicación de la Ley de fauna con verdadera responsabilidad.

El problema preocupa cada vez más a los amantes de la vida silvestre y exige con urgencia una solución por parte de las autoridades nacionales y provinciales, quienes hasta el momento, salvo raras y honrosas excepciones, han adoptado el conocido hábito de nuestro ñandú en la creencia popular, de esconder la cabeza antes que resolver con decisión situaciones problemáticas.

REFERENCIAS:

- HOMERO A. FARIOLI:** La fauna silvestre de la provincia se encuentra en vías de total extinción. El Litoral, 27-7-75.
- ALEJANDRO RONCHETTI CORVALAN.** Traficantes de vida. Revista de la Fundación Silvestre Argentina. Año IV, N° 15, junio 1985.
- MIGUEL WOITES.** La parte estrecha del embudo. Revista Nuestras Aves Año III, N° 8, diciembre 1985.

HOMERO ANGEL FARIOLI
DNI: 10.524.978
Castañeres 2887, B° Del Pilar, Cba.

NIDIFICACION OTOÑAL DEL ELANIO BLANCO

En una salida del "Grupo Rapaces" realizada en Costanera Sur el 27 de abril junto a Pedro Blendinger, Claudio Restivo y Gustavo Damonte, hallamos un nido de *Elanus leucurus*. Un comportamiento característico nos indicó que la pareja estaba incubando o con pichones ya que el macho cazaba para la hembra, la cual le arrebataba la presa en el aire.

El nido estaba ubicado en el hueco formado por 4 ramas de un aliso (*Tessaria intergrifolia*) a 2,70 mt. de altura en la periferia de un sauzal.

La zona es de difícil acceso por la irregularidad del terreno y la densidad de la cubierta vegetal constituida principalmente por cortaderas (*Cortadeira selloana*), totoras (*Typha* sp), chilca (*Baccharis salicifolia*) y yerba mora (*Solanum nigrum*).

Confeccionado de palitos y pajitas finas, el nido tenía las siguientes medidas: diámetro externo: 30 x 20 cm; diámetro interno: 15 x 15 cm, Altura: 10 cm, profundidad: 3-4 cm.

En el mismo encontramos 3 pichones de aproximadamente una semana de vida.

El 3 de mayo, junto con Claudio Restivo y Paula Bertolini, hallamos muerto a uno de los pichones. (¿cainismo?).

Una semana después, el nido había sido abandonado y sólo encontramos restos de uno de los pichones debajo del mismo.

Como había sido despedazado, suponemos que fueron víctima de algún mamífero o de alguna de las tantas rapaces que sobrevuelan la zona.

Presumiblemente, esta pareja es la misma que nidificó en noviembre de 1985 en una de las torres de iluminación a 20 mt. de altura.

En esa oportunidad encontré 3 pichones

Dibujo:
Francisco Contino

y dos huevos. (de estos últimos uno desapareció y el otro era infértil).

Las medidas del nido eran las siguientes: diámetro externo: 40 x 40 cm, diámetro interno: 15 x 15 cm, altura: 10 cm, profundidad: 4 cm.

La única referencia bibliográfica encontrada de nidificación otoñal de esta especie es la citada por Rosando M. Fraga, que fue publicada en "El Hornero" de diciembre de 1984. Como sugiere este autor, la disponibilidad de roedores para estas aves aumenta (aunque no se poseen datos concretos). Esto justificaría en parte la nidificación en esta época del año.

EDUARDO DE LUCA
Grupo Rapaces

GRUPO RAPACES

El Grupo Rapaces a través de un ambicioso proyecto planea la creación de un ban-

co de datos con información referente a distribución, status, biología y migraciones de nuestras aves de presa.

Rogamos a los interesados en participar en esta campaña nos escriban solicitando mayor información y la ficha encuesta elaborada para tal fin.

Los nombres de las aves argentinas

ORDEN: PROCELLARIIFORMES

FAMILIA: DIOMEDEIDAE

- 33) *Diomedea exulans*: Jurooj, Juruj, Huruj (Yámana o Yagán), Kayelj (Haush), Ieonokelt u Oye (Shelknám u ona); Albatros errante, Albatros viajero, Carnero del Cabo, Albatros errante mayor, Albatros errante menor, Albatros.
- 34) *Diomedea epomophora*: Jurooj o Juruj (Yámana o Yagán), Ieonokelt u Oye (Shelknám u Ona); Albatros real.
- 35) *Diomedea melanophris*: Carrapu o Carpu (Yámana o Yagán), Gaiil o Kail (Shelknám u Ona); Albatros, Pato carnero, Lagartón, Albatros ojeroso, Albatros chico; Albatros ceja negra, Albatros ceja gris, Albatros menor común.
- 36) *Diomedea cauta*: Albatros piliblanco, Albatros corona blanca, Albatros del Plata, Albatros arisco, Albatros de Plata, Albatros frente blanca.
- 37) *Diomedea chlororhynchos*: Albatros chlororrinco o clororrinco, Albatros pico amarillo, Albatros pico delgado, Albatros de pico amarillo y negro.
- 38) *Diomedea chrysostoma*: Albatros cabecigris, Albatros cabeza gris.
- 39) *Phoebetria fusca*: Albatros oscuro, Albatros oscuro chico, Albatros obscuro, Albatros oscuro grande.
- 40) *Phoebetria palpebrata*: Albatros manto claro, Albatros oscuro, Albatros oscuro grande, Albatros oscuro de dorso y vientre grises, Albatros oscuro chico, Albatros oscuro de manto claro.

FAMILIA: PROCELLARIIDAE

- 41) *Macronectes giganteus*: Capurj o Caprijh (Shelknám u Ona), Dashuluj (Yámana o Yagán); Petrel gigante común, Petrel gigante, Quebranta huesos, Petrel gigante antártico, Petrel, Gigante del sur.
- 42) *Macronectes halli*: Petrel gigante pico corto, Petrel gigante subantártico, Petrel gigante pico rojizo, Petrel gigante del norte.
- 43) *Fulmarus glacialisoides*: Petrel plateado, Fulmar, Fulmar antártico, Fulmar austral o del sur, Petrel gris plateado, Pamperito.
- 44) *Thalassoica antarctica*: Sloin (Yámana o Yagán); Petrel antártico, Damero obscuro.
- 45) *Daption capense*: Paloma del Cabo-Pintado, Petrel damero, Petrel pintado, Damero del Cabo, Petrel moteado, Petrel común, Paloma del Cabo.
- 46) *Procellaria aequinoctialis*: Shuluj o Yecada (Yámana o Yagán); Petrel negro, Fardela negra grande, Petrel barba blanca, Petrel negro de barba blanca, Petrel negro de pico amarillo y barba blanca, Petrel pico amarillo, Petrel mentón blanco.
- 47) *Adamastor cinereus*: Petrel gris, Fardela gris, Pardela gris.
- 48) *Puffinus gravis*: Pardela capirotada, Petrel pardo, Petrel de capirote, Fandela capirotada, Pardela negra, Pardela capucho negro, Petrel pardo y blanco.
- 49) *Puffinus griseus*: Tawisawa (Yámana o Yagán); Fardela, Viuda, Pardela oscura, Petrel oscuro, Pardela negra, Fardela negra común, Petrel oscuro de pico largo, Petrel chileno obscuro de pico largo, Petrel obscuro común, Fardela negra, Pardela común, Pardela sombría, Pampero oscuro, Pampero gris, Buzo de las tempestades.
- 50) *Puffinus puffinus*: Pardela pichoneta, Petrel blanquinegro, Pardela boreal, Pardela común, Petrel del Atlántico norte, Petrel negro y blanco, Fardela atlántica, Pufino cachiruleado.

--ASOCIACION ORNITOLOGICA DEL PLATA--

III Concurso Fotográfico

"AVES ARGENTINAS EN SU AMBIENTE NATURAL"

1er. Premio

Autor: **Hernán Rodríguez Goñi**
Título: "Hacia el sol"

Butorides striatus - Garcita Azulada
General Lavalle (Buenos Aires)

JURADO:

**Juan Gómez
Emilio Gutierrez
Silvia Naveira**

2do. Premio

**Autor: Miguel Angel García
Título: "Llevando comida"**

***Anthus furcatus - Cachirla Uña Corta*
Arteaga (Santa Fe)**

3er. Premio

Autor: Alejandro Serret
Título: "Río Quilquihue"

Bubo virginianus - Ñacurutú
Río Quilquihue (Santa Cruz)

1ra. Mención

Autor: Guido Andrés Betbeze
Título: "Gotas de lluvia sobre mí"

Rallus sanguinolentus - Gallineta
Costanera Sur (Capital Federal)

2da. Mención

Autor: Miguel Angel García
Título: "Enojada"

Cistothorus platensis - Ratonera Aperdizada
Arteaga (Santa Fe)

3ra. Mención

Autor: Hernán Rodríguez Goñi
Título: "Juntos"

Chauna torquata - Chajá
General Lavalle (Buenos Aires)

Nuestras Aves Amenazadas

15. Hoco Oscuro Misionero (*Tigrisoma fasciatum fasciatum*)

Esta curiosa garza, de unos 89 cm. de longitud, es una de las subespecies más escasas de nuestro país y cuenta con solo 3 registros concretos ya bastante antiguos.

Este congénere de nuestro ampliamente conocido y distribuido hocó colorado (*Tigrisoma lineatum*) se distingue por su pico y patas bastante cortos. El culmen es menor a los 95 mm, por lo general 25 a 88 mm, siendo la punta del pico negra y no castaña como en la especie anterior. La corona es negra, el cuello y el dorso son negruzcos vermiculados o salpicados de amarillo, dando la impresión este moteado de ser más espaciado que en el hocó colorado. Los flancos son negruzcos uniformes y el vientre es ocráceo rojizo. Los ejemplares inmaduros presentan trazas de blanco en los flancos, y barras ante y oscuras en los lados de la cabeza. El iris es amarillo y los pies y tarsos castaños. El largo del ala varía de los 32 a los 33,5 cm.

En la Argentinaa existe otra raza o subespecie de hocó oscuro que no figura en el Red Data Book, *Tigrisoma fasciatum pallescens* y que es propia de los ríos y arroyos con rápidos y torrentes de la selva tucumano-salteña donde se conocen varios registros en Jujuy, Salta y Tucumán. Se distingue esta raza por su vientre más leonado

(menos rojizo), las medidas algo mayores y las barras blancas del cuello y el dorso más ampliamente espaciadas.

El hocó oscuro misionero conocido también en la bibliografía como hocó oscuro, hocó del Brasil, hocó negro o "Socó-boi" (Brasil) o "Socó-boi oscuro" y parecería restringido a los ríos de la selva paranaense, con remansos y rápidos o "correderas" con tupidos bosques marginales del sudeste de Brasil y la provincia de Misiones en la Argentina.

En Brasil son conocidos muy pocos registros por lo cual se la considera en el orden nacional especie RARA. Se poseen citas de la especie desde Río de Janeiro a Santa Catarina, con registro en Matto Grosso (Chapada) y Río Grande do Sul (Taquara). En este último estado brasileño se lo conoce por un único ejemplar juvenil capturado en la localidad mencionada por Ihering en junio de 1882, por lo que se tiende a considerarlo extinguido. La especie fue citada para nuestro país en base a 2 ejemplares hembras capturados en Bonpland (provincia de Misiones) por J. Mogensen el 19 de marzo de 1912, en base al cual Zotta lo comunica para nuestro país en 1935. Pero en el instituto Miguel Lillo de Tucumán existía otro ejemplar capturado por el mismo colector en la

localidad de Bonpland el 14 de marzo de 1912 y que recién fue comunicado por Eisenmann en 1965 al estudiar los hocós de la Argentina y estableciendo que se trataba de 2 hembras inmaduras. Seguramente fueron capturadas en el cercano arroyo Yabebirí o alguno de sus afluentes. Posteriormente se supo de la existencia de otro ejemplar en la muestra zoológica que durante muchos años se expuso en la intendencia del Parque Nacional Iguazú y que hoy puede ser visto en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Iguazú en el área Cataratas. Se supone que ese ejemplar fue capturado a fines de la década de 1940 ya que Andrés Gai (1950) al visitar la intendencia del Parque en 1948 ya comenta su existencia.

Llama la atención que en todos los años de trabajo en el área del arroyo Urugua-í, en el norte de Misiones, desde 1948 hasta 1960 no se haya podido detectar la presencia, de esta especie y si en cambio en abundancia la de su congénere el hocó colorado.

La escasez natural de esta garza constituye un verdadero enigma y por ello se la ha incluido en el Red Data Book International como especie de status INDETERMINADO, aunque en rigor de verdad en el orden nacional se la debe considerar RARA dada la existencia de solo 3 registros, el último de ellos ya de más de 40 años. Con el correr de los años seguramente su situación ha ido empeorando debido a los desmontes masivos que sufre la región.

Su captura en el área del Iguazú nos hace alentar todavía alguna esperanza acerca de su posible subsistencia en el Zanja Honda, el Central, el Santo Domingo o cualquiera de los otros arroyos que surcan el corazón del parque.

BIBLIOGRAFIA

- Belton, William 1984, Birds of Río Grande do Sul, Brasil, part. I. Bull. of the Amer. Mus. of Nat. Hist. vol 178 (4): 631 pags., New York.
- Eisenmann, Eugene, 1965. The tiger-herons (Tigrisoma) of Argentina. El Hornero X (3): 225-234. Bs.As.
- Gai, Andrés. 1950. Notas de viajes II. Por el norte de Misiones. El Hornero IX (2) 138-164, Bs.As.
- , 1951. Notas sobre la avifauna de Salta y Misiones. El Hornero IX: 247-276, Bs.As.
- Olrog, Claes. 1979: Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana XXVII: 324 pags., Tucumán.
- Sick, Helmut. 1985. Ornitología Brasileira, uma introdução, T I. Univ. de Brasilia, 481 págs, Brasilia.
- Steullet, A. y E. Deautier. 1936. Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina. Obra cinc. del Museo de la Plata T I (2da. entrega): 276, Bs.As.
- Zotta, Angel, 1944 Lista sistemática de las aves argentinas. 236 págs., Mus. Arg. Cs. Naturales, Bs. As.
- , 1935. Un hocó nuevo para la fauna argentina. El Hornero VI: 106, Bs. As.

16. Palomita morada (*Claravis godefrida*)

Conocida también como tórtola morada, palomita plomiza, paloma de Geoffroy, palomita gris azulada, palomita azul mayor, en guaraní "Punkaú-í" o "dyerutí-hoví" o en Brasil como "pararu" "pararú" o "pomba-espelho", este hermoso colúmbido de 23,5 cm. de largo es, junto a la palomita celeste o azulada (*Claravis pretiosa*) la otra representante de este género en el país. Se distingue de esta especie por su mayor tamaño (*Claravis pretiosa* mide unos 19 cm. de longitud). El macho posee además dos largas fajas alares transversales castaño-cobrizas y las timoneras externas blancas. La hembra es parda y posee las fajas alares de color violáceo o sepia, coloración que evita toda posible confusión entre ambas especies.

Habita oculta en los matorrales y "tacuarales" de la selva paranaense donde se desplaza por el suelo. En apariencia prefiere los terrenos más quebrados y montañosos como ocurre en Brasil, donde frecuenta la Serra dos Orgaos e Itatiaia en los alrededores de Río de Janeiro.

Su distribución abarca el sudeste de Brasil (desde el sur de Bahía a Santa Catarina), este de Paraguay (Alto Paraná) y la provincia de Misiones en Argentina.

No se conoce mucho acerca de su biología salvo que suele reunirse en bandadas de 50 a 100 individuos, como ocurría en Teresópolis (Río de Janeiro) entre noviembre y diciembre a mediados de este siglo cuando se pro-

ducía la fructificación del tacuaruzú (*Guadua angustifolia*) y del tacuarembó (*Chusquea ramosissima*) y permanecían allí hasta el otoño. Como es sabido estas cañas florecen y fructifican en períodos espaciados de varias décadas y que este proceso influiría notablemente en la dinámica poblacional de la especie. Fuera de ese período es solo posible hallarla solitaria o en parejas. Bertoni en 1901 anotó sobre esta especie: "vive en los faldeos de las colinas de los montes frondosos, y limpios abajo, donde se pasea por el suelo en busca de su alimento, como la *Leptotila verreauxi chloroauchenia*, sin subir a más de media altura; subsiste lo mismo; pero es más esquiva, velocísima, y su vuelo es silencioso. La he visto incorporada con la susodicha; no obraban acordes, y el motivo de estar juntas era por ser allí un sitio preferido por ambas especies. Viven los sexos juntos todo el año, sin apartarse mucho. No le he oído voz alguna". Sick (1985) anota como voz de la especie el bisilábico: "U-Ut"

Bertoni la menciona en 1913 para Iguazú siendo él mismo el autor de la observación, incluyéndose así la especie en la avifauna argentina. Esta cita es repetida por todos los autores posteriores hasta que Olog en 1963 al publicar su primera lista de aves argentinas, y seguramente influenciado por las recientes campañas ornitológicas de una década de duración en el norte misionero donde la especie no apareció, opinó a pie de página que: "no

hay nada de concreto con respecto a la presencia de *Claravis godefrida* (Teminck) en Misiones, aunque podría encontrarse allí" sin incluirla en consecuencia en el listado. Pero en 1979 vuelve a mencionarla basado en dos nuevos registros efectuados en Misiones, uno de ellos la había realizado el mismo Olog en diciembre de 1974 y consistió en la observación de una pareja en los alrededores de Wanda (dpto. Iguazú). El segundo sería un ejemplar anillado por Tarak y Christie en agosto de 1977 en el parque nacional Iguazú.

La especie fue descrita por Teminck en 1811 con el nombre de *Columba godefrida*. El nombre específico sería grafía errónea de *Godofredus* nombre en latín moderno del naturalista francés E. Geoffroy de Saint-Hilaire (1772-1844), siendo corregido por su mismo autor más tarde llamándola entonces *Columba geoffroyi* nombre con que se la conoció hasta muchos años después. La localidad típica de la especie era el "Brasil" sin más detalles.

Bertoni en 1901 en Paraguay describe a la hembra de la especie como una nueva forma a la que llamó *Chamaepe-
lia miantoptera*, pero corrigiendo el error en publicaciones posteriores. Su escasez en Paraguay puede compararse a la de nuestro país tal vez por hallarse aquí la especie en su límite austral de dispersión; ya Bertoni señaló: "Es tan escasa que sólo he visto dos parejas, la una por julio de 1893, a una legua en el interior del bosque, en los 26° 53' de latitud, la otra en los 25° 43', todas en el Alto Paraná".

En Brasil la especie se ha enrarecido en los últimos años notándose un lige-

ro repunte en 1975 tal vez por el ciclo de floración de las tacuaras, en el orden nacional se la considera especie *rara*. La misma categoría posee en nuestro país debido a la escasez de registros, solo tres, en un área muy reducida, el extremo noroeste de Misiones. Téngase en cuenta que no existe ningún ejemplar de la especie en las colecciones ornitológicas argentinas. En el Red Data Book se cita como especie *vulnerable*, debido fundamentalmente a su marcada disminución en el Brasil.

Su presencia en el parque nacional Iguazú en los últimos tiempos nos permite alentar alguna esperanza acerca de esta casi desconocida especie.

BIBLIOGRAFIA

- Bertoni, A. de W. 1901. Aves nuevas del Paraguay. Anal. Cient. Paraguayos N° 1, 216 págs. Asunción.
- . 1914. Fauna paraguaya. Catálogos sistemáticos de los vertebrados del Paraguay, 85 págs. Asunción.
- Hellmayr, C. y B. Conover. 1942. Catalogue of the birds of the Americas. Zool. ser. Field Museum of Nat. Hist. vol XIII, P. I, N° 1, publ. 514, 636 págs. Chicago.
- Olog, Claes. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Opera lilloana IX: 377 págs. Tucumán.
- . 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera lilloana XXVII: 324 págs., Tucumán.
- Sick, Helmut. 1985. Ornitologia brasileira, uma introdução. TI, Univ. de Brasilia, 481 págs. Brasilia.
- Steuillet, A y E. Deautier. 1939. Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina. Obra cinc. del Museo de la Plata. T I (3a. entrega): 713, Bs.As.
- Zotta, Angel, 1944. Lista sistemática de las aves argentinas. 236 págs. Mus. Arg. Cs. Naturales, Bs. As.

EXPOHOBBY '86

La Asociación Ornitológica del Plata participó con un stand en la muestra EXPOHOBBY '86 que tuvo lugar en el predio ferial de Palermo del 12 al 28 de diciembre de 1986.

COLABORADORES

Debido al gran crecimiento e incremento de actividades que ha experimentado nuestra Asociación, solicitamos a aquellos socios que dispongan de algún tiempo libre que se acerquen a nuestra sede para trabajar como voluntarios en las diferentes áreas en que se divide nuestro accionar.

A LOS SOCIOS DEL INTERIOR

Un grupo de la A.O.P. se encuentra abocado a la recopilación de leyes, decretos, ordenanzas, etc. sobre el manejo y comercio de nuestra fauna silvestre. Es por ello que solicitamos la colaboración de nuestros socios del interior para que se dirijan a los organismos respectivos (Municipalidades, Direcciones de Fauna, etc.) y luego nos envíen el material solicitado. De la misma manera las personas que viajen al interior y tengan posibilidades de realizar la misma gestión, sepan que será de gran utilidad para esta área encargada del aspecto legislativo.

NOTAS NIDOBIOLOGICAS SOBRE AVES ARGENTINAS

(Descripción de nidos)

NIDO DE ANAMBE CHICO

Este nido de Anambé Chico (*Xenopsaris albinucha*), fue encontrado el día 5 de enero de 1986 a 16 km. al oeste de Morteros (monte de Mar Chiquita), provincia de Córdoba.

Estaba construido en las bifurcaciones de las ramas que formaban la copa de un chañar a 6,30 m. de altura. Los materiales utilizados eran fibras vegetales, raicillas y líquenes.

El nido era una semiesfera de 6 cm. de diámetro exterior y 4,5 cm. de diámetro interno. La altura era de 4 cm. y la profundidad de 3 cm.

Los adultos se posan en las perchas ubicadas en el extremo superior de los árboles y desde allí se lanzan en rápido vuelo hacia arriba para capturar los insectos. En algunas ocasiones los he visto buscar su comida entre la vegetación arbustiva. Ambos progenitores se turnan en la alimentación de sus crías y defienden con mucha agresividad su territorio.

En la fecha del relevamiento, este nido poseía dos pichones desarrollados, próximos a abandonarlo, motivo por el cual no pude tomar las medidas de los huevos. Lo mismo aconteció en otras 2 ocasiones anteriores que localicé nidificaciones próximas a ésta, en el

mes de diciembre.

Correspondería, además, incluir a esta especie en el listado de las 235 especies señaladas por Nores e Yzurieta para la región de la laguna Mar Chiquita.

Angel F. Molli
Director Museo Regional Morteros
Córdoba

UN NIDO DENTRO DE UNA FLOR

La hortensia (*Hydrangea hortensis*) es una planta ornamental originaria de Japón y ampliamente difundida en los jardines domiciliarios de nuestro país por la belleza de sus grandes inflorescencias de variados colores.

En el amplio parque que el Dr. Mateo R. Zelich posee en su residencia de la localidad de Liebig (Depto. Colón, Pcia. Entre Ríos) y entre las muchas especies vegetales tanto

exóticas como indígenas que allí han sido plantadas, no es ajena la presencia de esta saxifragácea, que se desarrolla en amplias y densas matas de hasta 2m de altura, que en enero y febrero presentan su máxima floración.

El 8 de enero de 1984, recorriendo el lugar de referencia en compañía de Flavio Moschione, se observó a un ejemplar hem-

bra de Corbatita Común (*Sporophila caeruleascens*), salir volando de una mata de hortensia ubicada en una esquina de la casa. Examinando detenidamente la planta, encontramos un nido de este pájaro en el interior de una inflorescencia, perfectamente inadvertido aún a escasa distancia, dada la completa cobertura de 6 cm de espesor brindada por el agrupamiento de flores liláceas.

Ubicado en el centro de un haz de pecíolos a los cuales estaba unido, su construcción semejava un pequeño cesto de cavidad profunda y paredes finas de 5 mm de espesor, a tal punto de poder observarse su interior a través de las mismas, íntegramente trabajado con delgadas raicillas pardo-amarillentas de 0,5 mm de diámetro y hasta 16 cm de longitud aproximadamente, entretejidas hábilmente. Altura máxima del nido 39 mm, diámetro interno 55 mm y profundidad 35 mm. Desde su base y hasta el suelo había una altura de 74 cm, y su distancia a la copa de la planta era de 90 cm.

Contenía dos huevos incubados de color gris suavemente verdoso, con manchas parduscas y negruzcas en toda la superficie, las que eran más abundantes hacia el polo obtuso. Medidas 17, 3 x 12, 9 y 16,7 x 12,3 mm.

Según referencias del Dr. Zelich y que pude comprobar personalmente en febrero de 1985 y 1986, la nidificación del Corbatita Común en el interior de inflorescencias de hortensia es un hecho habitual y repetido anualmente, hallándose en ocasiones varios nidos próximos entre sí y en la mencionada

disposición, casi siempre muy cercanos a las paredes de la casa y sin demostrar sus constructores temor alguno ante el movimiento continuo de personas. Es probable que el éxito de cría obtenido con este atípico modo de ocultar su nido, haya llevado al Corbatita Común a repetir la experiencia de construir cada temporada dentro de tales inflorescencias, al amparo de predadores naturales y también protegido por los moradores de la casa.

JUAN FRANCISCO KLIMAITIS

Familia *Tyrannidae*

VIUDITA BLANCA (*Fluvicola pica*)

El nido tiene forma de saco, de boca amplia. Emplea en la construcción fibras vegetales entrelazadas, colocando en su parte interna plumas.

El alto varía desde 12 a 15 cm., el ancho de 6,5 a 8 cm., la profundidad

o largo de 6 a 7 cm. La boca tiene un diámetro de 4,5 a 6 cm. La profundidad de la boca al fondo del nido de 6 a 8 cm.

La boca está situada en la parte superior lateral. Atado generalmente a dos ramitas de plantas acuáticas o que están cerca del agua. la postura es de 3 huevos blancos con pintas marrones, en mayor cantidad hacia el polo mayor. Medidas de huevos: de 18,5 a 19,5 x 13,3 a 14,1;

$\bar{X}$ = 18,8 x 13,7 mm. (N=11). Peso de las cáscaras: 0,098 grs. (N=2).

Nidos hallados: en Esperanza (S. Fe) el 26-2-71, con 3 huevos; el 15-12-72, 3 huevos y 1 de *Molothrus bonariensis*, otro con 2 huevos y 2 de *M. bonarien-*

sis; otro con 2 huevos y 2 de *M. bonariensis* y otro con 2 y 1 de *M. bonariensis*. El 13-12-77, con 2 huevos y 1 de *M. bonariensis*. En San Javier (S. Fe) el 7-11-81 dos nidos con 3 huevos cada uno..

LAVANDERA (*Arundinicola leucocephala*)

El nido tiene forma de saco. Es construido con fibras vegetales entrelazadas, coloca plumas en la parte interna. La boca está situada en la parte lateral superior. Lo ata a juncos, a distancia variable entre 10 y 70 cm. sobre el nivel del agua.

La boca mide de 4 a 5 cm. de diámetro. La altura de unos 17 cm. Ancho y

profundidad de unos 7 a 8 cm.

Los huevos son blancos. Miden de 19,8 a 21,4 x 14,1 a 14,4; $\bar{x}$ = 20,6 x 14,2 mm (N=3)

Peso de las cáscaras: 0,112 grs. (N=3)

Nidos hallados: en Aguará (S. Fe) el 4-1-71 con 1 huevo y el 11-11-72 con 2 huevos y 2 de *Molothrus bonariensis*.

SURIRÍ AMARILLO (*Satrappa icterophrys*)

El nido tiene forma de taza. Es construido con palitos finos y tallos de yuyos gruesos externamente. En la parte interna coloca nervaduras de hojas, algunas cerdas y plumas. Miden de 5 a 8 cm. de diámetro interno. Unos 3 cm. de profundidad. Diámetro total de 10-12 cm. y alto total 7-8 cm. Asentado en ramas.

Pone 3 huevos blancos con pintas marrón rojizas en el polo mayor. Miden de 18,5 a 22,8 x 14,6 a 15,4; X=20,3 x 15 mm. (N=9) Peso de las cáscaras: 0,128 grs. (N=9)

Nidos hallados, el 12-10-70 en Arroyo Leyes (S.Fe) con 3 huevos y 1 de *M. bo-*

nariensis, el 30-9-72 en Marcelino Escalada (S.Fe) con 3 huevos, en Esperanza (S.Fe) el 26-8-79 un nido con 1 huevo, otro con 3; el 15-12-79, un nido con 1 huevo, otro con 3 huevos y 1 de *M. bonariensis* y el 24-9-82 con 2 huevos.

Martín R. de la Peña
Dibujos: Elda Krüger
Esperanza - Santa Fe

CUOTAS SOCIALES

Las cuotas sociales para el año 1987 son las siguientes:

Socio Activo	A 21 por año
Socio Cadete	A 7 por año
Socio Protector	A 24 por año

Perro Mundo

Por José Miguel Heredia

Los trabajos para "Nuestras Aves" deben entregarse a la Redacción, escritos a máquina, con una copia y un dibujo o foto correspondiente al ave considerada. La aceptación de los mismos no implica su futura publicación.

PERDON, TE PIDO, HORNERO

El pasado 10 de mayo me tocó presenciar cuando pasaba de casualidad por la Plaza de Mayo el repintado de la pirámide del mismo nombre. Era lógico, pensaban los transeúntes en su fugaz ajetreo; se acercaba el festejo del 25 de mayo y el Monumento Nacional debía lucir blanco, casi inmaculado, para la ocasión. Pero, ni el apuro, ni la incapacidad de "mirar y ver" les permitieron advertir algo más. Algo que a los ojos de un observador de pájaros, de un hurgador de los montes y las manifestaciones naturales no pasaría nunca inadvertido, en definitiva la consumación de un sacrilegio. Se estaban pintando con gruesos brochazos los seis nidos de horneros que la Pirámide luce en el borde superior de su base o mejor dicho los cinco porque uno no sobrevivió a la brocha que pasaba una y otra vez sin piedad emparejándolo todo, igualándolo todo con el frío e inexpressivo color blanco.

Por eso no pude más que caminar unos pasos, sentarme en un banco, y garabatear estas líneas para esos ilusos pájaros que confiando en nosotros que primero les quitamos los talas y coronillos de las barrancas, luego los privamos del barro tapando las calles con asfalto y las cuadras con moles de vidrio, hierro y cemento y después los engañamos descaradamente declarándolo a través de una encuesta popular el "Ave nacional de los argentinos", dedicándole los más variados y emitidos versos, en poemas, milongas y canciones, les pagamos simplemente con la pintada y el emprolijamiento de sus nidos. Pobres ilusos creyeron que nos iban a conmovier refugiándose, en lugar de en las exóticas palmeras y los desarraigados plátanos, en la "Pirámide de Mayo", en nuestro símbolo patrio.

No te dabas cuenta hornero que tu nido afeaba la nivea estructura, que las manchas oscuras de los mismos eran *antiestéticas*. No, hornero, lamentablemente te equivocaste. Los hombres somos malos. Solo pueden quedarse con nosotros en las ciudades las palomas caseras y los gorriones que no saben dónde ir, que no saben anidar en un tala, ni siquiera en lo alto de un poste. Por eso te aconsejo como amigo montaraz que te vayas de la ciudad al campo. No es muy lejos y allá te esperan. Pensalo bien, hermano hornero, tal vez es preferible que te ataque una comadreja picaza y te castigue un poco más el aguacero, a que todos los años te "disfracen" o "retoquen" para esta fecha el nido (o inclusive te lo visten como hace algún tiempo ocurrió). Sé que vos estabas antes, que tenés más derecho a quedarte que nosotros, pero ¿sabés que ocurre?, estamos muy malos últimamente, muy flojos de memoria y temo seriamente por tu vida, por eso te lo sugiero como amigo, aunque me quede aún más solo cuando te vayas y la sensación de asfixia y ahogo se me acentúe. Yo prometo ir a visitarte de vez en cuando y a contarte si las cosas cambiaron.

Pero no te merecemos, al menos por ahora no, hasta que definamos de nuevo qué es la patria y te hagamos un público desagravio. Porque ¿sabés para mí qué es la patria? sos vos nidificando en la pirámide.

Por eso hasta que nos demos cuenta, en nombre de mi raza destructora, dueña de rifles, hondas y de brochazos, en nombre de todos los que "miran y no ven" humildemente perdón, te pido, Hornero.

Sacha Juan
(Juan del Monte)