

SAÍRA DE ANTIFAZ (*Pipraeidea melanonota*) EN FORMOSA, ARGENTINA

FAWN-BREASTED TANAGER (*Pipraeidea melanonota*) IN FORMOSA, ARGENTINA

Luis G. Pagano¹

¹Grupo FALCO, La Plata, Argentina

RESUMEN: Dos subespecies del Saíra de Antifaz (*Pipraeidea melanonota*) se encuentran presentes en Argentina. *P. m. venezuelensis* habita en forma regular las yungas de Salta, Jujuy y Tucumán, con registros hasta San Juan, por el oeste. La forma nominal (*P. m. melanonota*) se dispersa en el noreste argentino en la selva atlántica de Misiones, alcanzando el sudeste de Buenos Aires por las selvas en galería del río Uruguay. En la presente nota se reportan los primeros registros de Saíra de Antifaz (forma nominal) para la provincia de Formosa y se confirma su presencia en la región chaqueña de Argentina.

PALABRAS CLAVE: Saíra de Antifaz (*Pipraeidea melanonota*), subespecie, Formosa, región chaqueña

ABSTRACT: In Argentina, there are two subspecies of the Fawn-breasted Tanager (*Pipraeidea melanonota*). *P. m. venezuelensis* regularly inhabits the yungas of Salta, Jujuy and Tucumán, with records as far as San Juan on the west. The nominal subspecies (*P. m. melanonota*) inhabits the Atlantic Forest of Misiones in northeastern Argentina, reaching southeastern Buenos Aires via the gallery forests along the Uruguay River. Here I report the first records of Fawn-breasted Tanager (nominal subspecies) for the province of Formosa and confirm the presence of the species in the Chaco region of Argentina.

KEYWORDS: Fawn-breasted Tanager (*Pipraeidea melanonota*), subspecies, Formosa, Chaco region

El Saíra de Antifaz (*Pipraeidea melanonota*) es poco a bastante común en bordes de bosque montano, selvas, claros, jardines e incluso áreas cultivadas, desde el norte de Venezuela al noroeste de Argentina (principalmente por los Andes), y en la región del sudeste de Brasil (Ridgely & Tudor 2009), encontrándose desde Misiones hasta el sudeste de Buenos Aires (Contreras & Contreras 1993; De la Peña 2020). El 29 de junio de 2017, a las 11:30 h, en la Estancia San Simón (26°00'S, 59°39'O; 96 msnm, departamento Patiño, Formosa, Argentina), a 44 km al noroeste de El Colorado, detecté un macho adulto de Saíra de Antifaz. El individuo

permaneció en el mismo sitio por más de una hora, vocalizando en el estrato alto del monte fuerte, permitiéndome obtener grabaciones y fotografías (Fig. 1). El ejemplar observado poseía los iris color pardo, concordando con el carácter diagnóstico para la subespecie *P. m. melanonota* propia del noreste argentino (Contreras & Contreras 1993; De la Peña 2020). Este registro junto a otro en la Reserva Guaycolec, el 23 de junio 2019 (Amarilla 2019), representan la confirmación de la especie para la provincia de Formosa (ver Contreras 1987; Contreras & Contreras 1993; Di Giacomo 2005) y para la región chaqueña de Argentina.

REFERENCIAS

- AMARILLA. (2019). eBird Checklist: <https://ebird.org/argentina/checklist/S58194190> eBird: An online database of birds distribution and abundance. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (28/01/2022)
- DI GIACOMO AG. (2005). Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 203– 465 en: DI GIACOMO AG & KRAPOVICKAS SF (eds) Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, provincia de Formosa, Argentina. Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área del Chaco Húmedo. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires
- CONTRERAS JR. (1987). Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Formosa, República Argentina. *Historia Natural* VII, 4: 33-52
- CONTRERAS JR & CONTRERAS AO. (1993). Acerca de la distribución de *Pipraeidea melanonota melanonota*, (Vieillot, 1819) en la República de Paraguay y el norte argentino (Aves, Emberizidae: Thraupinae). *Nótulas Faunísticas*, 46
- DE LA PEÑA RM. (2020). Aves argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Tomo 11: Mimidae, Sturnidae, Motacillidae, Thraupidae. *Comunicaciones del Museo de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"* (actualización), 11: 1–347
- RIDGELY SR & TUDOR G. (2009). Field guide to the Songbirds of South America: the passerines. University of Texas Press, Austin



Figura 1: Saira de Antifaz (*Pipraeidea melanonota*) en departamento Patiño, Formosa, Argentina, observado el 29 de junio de 2017. Fotografía: Pagano LG.