

PRIMEROS REGISTROS DE CACHOLOTE CASTAÑO (*Pseudoseisura lophotes*) EN DIQUE AMEGHINO, CHUBUT, Y LOS MÁS AUSTRALES REPORTADOS HASTA EL PRESENTE

FIRST RECORDS OF THE BROWN CACHOLOTE (*Pseudoseisura lophotes*) IN DIQUE AMEGHINO, CHUBUT, AND THE SOUTHERNMOST REPORTED TO DATE

Cristina S. Bartolucci^{1*}

¹Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ciencias Naturales y de la Salud, Sede Esquel, Argentina

* bartolucci.cristina@gmail.com

RESUMEN: El Cacholote Castaño (*Pseudoseisura lophotes*) se distribuye por el sur de Sudamérica, hasta las provincias de Río Negro y Neuquén. En esta nota presento registros de la especie en la localidad Dique Florentino Ameghino, provincia de Chubut, Argentina. Estos son los registros más australes de la especie hasta el presente.

PALABRAS CLAVE: *Cacholote Castaño* (*Pseudoseisura lophotes*), *distribución*, *Furnariidae*

ABSTRACT: The Brown Cacholote (*Pseudoseisura lophotes*) is distributed in southern South America, up to the provinces of Río Negro and Neuquén. In this note, I present records of the species in the locality of Dique Florentino Ameghino, Chubut province, Argentina. These are the southernmost records of the species to date.

KEYWORDS: *Brown Cacholote* (*Pseudoseisura lophotes*), *distribution*, *Furnariidae*

El Cacholote Castaño (*Pseudoseisura lophotes*) es un Passeriforme de la familia Furnariidae. Su distribución abarca el sur de Sudamérica (excepto Chile), hasta las provincias de Río Negro y Neuquén (De la Peña & Titarelli 2011; De la Peña 2020). Habita sabanas, áreas rurales, y arboledas incluyendo sitios forestados con especies exóticas (Povedano & Bisheimer 2016; De la Peña 2020). Es una especie de tamaño grande, de coloración marrón-rojiza, y con una gran cresta o copete pardo oscuro. El iris es amarillo y la mandíbula color marfil (De la Peña 2020). En la Tabla 1 presento las observaciones de Cacholote Castaño que tome en las cercanías de la plaza principal de la localidad Dique Florentino Ameghino, departamento de Gaiman, provincia de Chubut, Argentina (43°41'S,

66°28'O). A su vez, presento los registros reportados por otras personas en la plataforma de ciencia ciudadana eBird durante el periodo de 2019-2022. Según los registros de observaciones de la especie, el límite sur de la distribución del Cacholote Castaño es el este de la provincia de Río Negro y Neuquén (eBird 2023; EcoRegistros 2023), por lo que estos son los registros más australes de la especie hasta el presente.

REFERENCIAS

De la Peña M. (2020). Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"* (Nueva Serie), 8: 1-294

De la Peña M and Titarelli F. (2011). Guía de aves de La Pampa. 1ª ed. Gobierno de La Pampa. Santa Rosa

eBird. (2023). eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (20/11/2023)

EcoRegistros. (2023). Cacholote Castaño (*Pseudoseisura lophotes*). Accedido de <http://www.ecoregistros.org>. (20/11/2023)

Povedano H and Bisheimer M. (2016). Aves terrestres de la Patagonia. 1ª ed. Neuquén



Figura 1. Adulto de Cacholote Castaño (*Pseudoseisura lophotes*) observado el 10 de noviembre de 2019 en el Dique Florentino Ameghino, Chubut, Argentina. Fotografía: Bartolucci C.

Tabla 1. Registros de Cacholote Castaño (*Pseudoseisura lophotes*) en la provincia de Chubut, Argentina.

Fecha	Tipo de observación	Autor	Registro
18/10/2019	Fotografía	Marcio Kerbage	https://ebird.org/checklist/S75679441
10/11/2019	Fotografía	Cristina Bartolucci	https://ebird.org/argentina/checklist/S72276472
15/01/2021	Oído	J. Quillen Vidoz & Manuel Encabo	https://ebird.org/checklist/S79475957
19/01/2022	Fotografía	Marcio Kerbage	https://ebird.org/argentina/checklist/S101064194
27/09/2022	Oído	Maria Jose Rodriguez Cajarville	https://ebird.org/argentina/checklist/S101064194