

ACTUALIZANDO LA DISTRIBUCION DE NUESTRAS AVES

En la comprobación de la maravillosa dinámica de la naturaleza incluimos en la Sección una serie de registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas.


CONDOR REAL EN OTAMENDI (BUENOS AIRES)

El domingo 17 de febrero de 1985 en una salida de campo realizada a la localidad de Ingeniero Rómulo Otamendi, provincia de Buenos Aires, observamos sobrevolando la zona aledaña a la selva ribereña un ejemplar de Cóndor Real (*Sarcoramphus papa*).

Ave carroñera de la familia Cathartidae se caracteriza por su coloración predominantemente blanca con remeras y timoneras negras, destacándose la coloración roja de su cabeza y un collar gris.

En su distribución más austral, según Blake (1979), llega hasta el norte de Santa Fe y Corrientes, dato que coincide con Olrog (1984).

Cabe destacar que el señor Clotaire Coulen (com. pers.) ha observado un ejemplar de esta ave sobrevolando el arroyo Pajarito, (Delta del Río de la Plata), algunos años atrás.



Cóndor Real (*Sarcoramphus papa*)
Dibujo: Hernán Rodríguez Goñi

Es posible que éstas sean las dos observaciones más australes registradas hasta la fecha.

Hernán E. Casañas
Luis H. Segura

TORITO PICO AMARILLO EN BUENOS AIRES

Dentro de los límites de la Capital Federal encontramos varios lugares donde nos dedicamos a la observación de aves. Uno de nuestros preferidos es un predio detrás de la Ciudad Universitaria.

Allí tenemos registradas cerca de 100 es-

pecies, algunas raras u ocasionales para la provincia.

El día 10 de julio de 1983, mientras observábamos al Canastero Coludo (*Thriphaga pyrrholeuca*), nos distrajo la presencia de un pequeño pájaro. Inquieto, pero muy