

PRIMER REGISTRO DOCUMENTADO, Y NUEVAS LOCALIDADES DEL CAPUCHINO CORONA GRIS (*Sporophila cinnamomea*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FIRST DOCUMENTED RECORD, AND NEW LOCATIONS
OF CHESNUT SEEDEATER (*Sporophila cinnamomea*) IN BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA

EMILSE MÉRIDA^{1*} & ALEJANDRO BODRATI²

¹ Blanco Encalada 4755, depto. 5B CABA (1431), Argentina.

² Proyecto Selva de Pino Paraná. Vélez Sarsfield y San Jurjo S/N, San Pedro (3352), Misiones, Argentina.

*emilsemerida@hotmail.com

RESUMEN: El Capuchino Corona Gris (*Sporophila cinnamomea*) es considerado “vulnerable” en el orden internacional. La provincia de Buenos Aires es el extremo austral de su geonemia, donde contaba con tres registros visuales anteriores. Aquí presentamos el primer registro y el más meridional documentado, y tres nuevas localidades para Buenos Aires.

PALABRAS CLAVE: Capuchino Corona Gris, *Sporophila cinnamomea*, distribución, Buenos Aires, Argentina.

ABSTRACT: The Chesnut Seedeater (*Sporophila cinnamomea*) is considered globally “vulnerable”. The province of Buenos Aires is the southern extreme of its distribution, where there were three previous visual records. Here we present the first and most southern documented record, and three new localities for Buenos Aires.

KEYWORDS: Chesnut Seedeater, *Sporophila cinnamomea*, distribution, Buenos Aires, Argentina.

El Capuchino Corona Gris (*Sporophila cinnamomea*) se distribuye en el sudeste de Brasil, este de Paraguay, noreste de Argentina y Uruguay, y se considera su estatus de conservación “Vulnerable” (BirdLife International 2020). En la provincia de Buenos Aires el Capuchino Corona Gris contaba con tres observaciones anteriores en la Reserva Costanera Sur y la Reserva Ribera Norte (Bodrati et al. 1997; Gasparri et al. 2018).

El 15 de enero de 2008, EM observó y fotografió un individuo macho en la zona del faro, cerca de la planta potabilizadora (34°11'S, 58°15'O), en el centro de la Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Martín García (Fig. 1). Este comía semillas en un pastizal junto a individuos de

Cabecitanegra (*Spinus magellanicus*) y chingolos (*Zonotrichia capensis*). Al día siguiente se observó un individuo en el mismo sector, posiblemente el mismo.

El 18 de noviembre de 2002, AB observó dos machos de Capuchino Corona Gris en la margen oriental del río Ibicuy, 6 km al sur de Puerto Ibicuy, departamento Islas del Ibicuy, provincia de Entre Ríos (33°47'S, 59°10'O), frente a la desembocadura de éste con el río Paraná Guazú, límite entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires (sección 4ta. Islas del partido de Zárate). Estos integraban un bando genérico con varias hembras y/o juveniles, tres machos de Capuchino Garganta Café (*Sporophila ruficollis*) y un macho de Capuchino Castaño (*Sporophila hypochroma*) que

se alimentaban de semillas en un pastizal. Luego de unos minutos el grupo cruzó volando hacia la costa opuesta del arroyo por lo que el registro podría considerarse para ambas márgenes provinciales.

El 28 de diciembre de 2007, Enrique Sierra (in litt.) observó un individuo macho solitario de Capuchino Corona Gris en pastizales de inundación del arroyo de los Cueros (valle de inundación del río Paraná) en la Estancia Río Paraná (33°35'S, 59°48'O), Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, se agrega esta especie para el AICA BA02 donde no contaba con información (Bodrati et al. 2005, 2006). En este trabajo presentamos los primeros registros del Capuchino Corona Gris para la Isla Martín García (Moschione & San Cristóbal 1995) y el primero documentado para la provincia de Buenos Aires, adicionando otras tres nuevas localidades en el Delta bonaerense.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos el registro de la localidad de Vuelta de Obligado proporcionado por Enrique Sierra.

REFERENCIAS

- BIRDLIFE INTERNATIONAL. (2020). IUCN Red List for birds. Disponible en <http://www.birdlife.org>. Available on: 31/07/2020.
- BODRATI A, HENSCHKE C & NARDINI C. (1997). Nuevas citas del género *Sporophila* para Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 37: 5.
- BODRATI A, MÉRIDA E & SIERRA E. (2005). Vuelta de Obligado. en A. S. Di Giacomo (ed) Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. *Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata*, Buenos Aires.
- BODRATI A, MÉRIDA E, BODRATI G & SIERRA E. (2006). Avifauna del talar de Vuelta de Obligado y de sus ambientes contiguos. San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. en: Mérida, E. y J. Athor (eds) *Talares bonaerenses y su conservación. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara"*. Buenos Aires.
- GASPARRI B, DEL RÍO D, EARNSHAW A, HENSCHKE C, BRYANT G, CRISTALDO L, FACCIOLI A, GENTILES JM, GALIANO GUIRAO I, VITALE M, RODRÍGUEZ TOURÓN G & SUÁREZ G. (2018). Lista comentada de las aves del Parque Natural Municipal Ribera Norte, San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 234: 1-43.
- MOSCHIONE FN & SAN CRISTÓBAL J. (1995). Aves de la Reserva Natural Isla Martín García, provincia de Buenos Aires, Ministerio de Asuntos Agrarios.



Figura 1: Macho de Capuchino Corona Gris (*Sporophila cinnamomea*) fotografiado 15 de enero de 2008, Reserva Natural Isla Martín García, Buenos Aires, Argentina. Fotografía: Mérida E.