

REGISTROS NOVEDOSOS

PICAFLOP TOPACIO (*Chrysolampis mosquitos*) EN LA CIUDAD DE PUERTO IGUAZÚ, MISIONES

RUBY-TOPAZ HUMMINGBIRD (*Chrysolampis mosquitos*) IN THE CITY OF PUERTO IGUAZÚ, MISIONES

LEANDRO CASTILLO^{1*} & BETANIA FLORENTÍN

¹ Fray Luis Beltrán 150, Puerto Iguazú (3370), Misiones, Argentina.

*jardindelospicaflores@hotmail.com

RESUMEN: Presentamos nuevos registros de Picaflor Topacio (*Chrysolampis mosquitos*) en Puerto Iguazú provincia de Misiones. Las observaciones repetidas indican una estacionalidad, con presencia en otoño en Argentina.

PALABRAS CLAVE: Picaflor Topacio, *Chrysolampis mosquitos*, nuevos registros, presencia otoño, estacionalidad, Argentina.

ABSTRACT: We report new records of Ruby-topaz Hummingbird (*Chrysolampis mosquitos*) in Puerto Iguazú, Misiones. The repetitive observations during autumn indicate a seasonal pattern in Argentina.

KEYWORDS: Ruby-topaz Hummingbird, *Chrysolampis mosquitos*, new records, autumn presence, seasonality, Argentina.

Desde el 11 de abril al 17 de mayo de 2020, observamos durante todos los días un individuo juvenil de Picaflor Topacio (*Chrysolampis mosquitos*) en el Jardín de los Picaflores, Puerto Iguazú, Misiones (25°36'S, 54°34'O). El mismo presentaba pico negro, corto con una curvatura en la punta, corona parda con los costados marrón claro, dorso verde con reflejos verdes más brillantes, postocular blanco, malar blanco, babero color dorado verdoso o verde oscura (según la incidencia de la luz; Fig. 1A & B), continuando con una línea oscura hasta el vientre, ventral grisáceo, subcaudal blanco y cola con ápices blancos. Observamos al Picaflor Topacio alimentarse de bebederos artificiales, y comportarse en forma agresiva hacia otras especies de Trochilidos que estaban en el lugar como Picaflor Esmeralda (*Amazilia versicolor*), Picaflor Faja Blanca (*Amazilia* sp.), Picaflor Bronceado (*Hylocharis chrysura*) y Picaflor Corona Violácea (*Thalurania glaucopis*). El Picaflor Topacio

habita ambientes de vegetación arbustiva, selvas en galería, sabanas, matorrales y jardines (Schuchmann 1999). En Argentina, todas las observaciones de la especie provienen del mismo lugar (i.e., Jardín de los Picaflores) y generalmente en la misma época del año, otoño (Pugnali & Pearman 2001; Chebez et al. 2004).

REFERENCIAS

- CHEBEZ JC, CASTILLO R & GÜLLER RM. (2004). Notas sobre picaflores del Noreste Argentino. *Hornero*, 19: 1-5.
- PUGNALI G & PEARMAN M. (2001). Confirmación de la presencia del Colibrí Rubí (*Chrysolampis mosquitos*) en Argentina. *Hornero*, 16: 93-95.
- SCHUCHMANN KL. (1999). Family Trochilidae (hummingbirds). en: del Hoyo J, Elliot A & Sargatal J (eds) *Handbook of the birds of the world. Volume 5. Barn-owls to hummingbirds*. Lynx Edicions, Barcelona.




Figura 1: Picaflor Topacio (*Chrysolampis mosquitos*) fotografiado el 11 de abril de 2020, en el Jardín de los Picaflores, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. A) de perfil con babero verde oscuro; B) de frente babero dorado verdoso por incidencia de la luz. Fotografía: Castillo L.