

REGISTROS NOVEDOSOS

TERCER REGISTRO DE PICAFLOR GARGANTA ESCAMADA (*Heliomaster squamosus*) EN ARGENTINA THIRD RECORD OF STRIPE-BREASTED STARTRHROT (*Heliomaster squamosus*) IN ARGENTINA

GUSTAVO PUENTE^{1*}, GABRIEL MAUGERI & RAÚL SPAIS
¹ Presidente Perón 112, Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina.
*gpunte@entrieros.net

RESUMEN: Presentamos el tercer registro de Picaflor Garganta Escamada (*Heliomaster squamosus*) en Argentina. Este es el registro más austral para la especie y el primero para Entre Ríos.

PALABRAS CLAVE: Picaflor Garganta Escamada, *Heliomaster squamosus*, registro austral, primer registro, Entre Ríos, Argentina.

ABSTRACT: We report the third record of Stripe-breasted Starthroat (*Heliomaster squamosus*) in Argentina. This is the southernmost record for the species and the first for Entre Ríos.

KEYWORDS: Stripe-breasted Starthroat, *Heliomaster squamosus*, austral record, first record, Entre Ríos, Argentina.

El Picaflor Garganta Escamada (*Heliomaster squamosus*) es un Trochílido endémico de Brasil con escasos registros fuera de su área de reproducción (Del Hoyo et al. 1992; eBird 2020). En Argentina sólo existen dos registros para esta especie: uno en Formosa (Contreras et al. 2014) y otro en Misiones (Castillo & Chebez 2009). Desde el 26 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020 un ejemplar macho adulto en plumaje alterno fue observado y fotografiado en el ejido urbano de la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos (Fig. 1; 33°00'S, 58°30'O; 10 msnm; eBird: Aves Argentinas 2020). Múltiples observaciones realizadas a muy corta distancia permitieron una diagnosis inequívoca: corona turquesa, barbijo púrpura rojizo, malar blanco, pico largo casi recto y negro, faz ventral verde dividida por una banda media blanca, subcaudales "blanquinegras", cola bifurcada y verde azulada. Se posaba frecuentemente sobre un Palán Palán (*Nicotiana glauca*) durante periodos de 5 a 15 min, donde vocalizaba, estiraba sus alas y desplegaba su cola en instantes previos al vuelo. Libaba en flores de *Pyrostegia venusta* y *Abutilon megapotamicum*. Se documentó una vocalización matutina compuesta por 2 notas introductorias seguidas de un trino de 6 elementos (Xeno-canto: Spais 2020). El presente registro es el más austral para la especie, el primero para Entre Ríos y el tercero para Argentina

[web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (29/03/2020).

eBIRD. (2020). eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (10/03/2020).

CASTILLO L & CHEBEZ JC. (2009). Presencia del picaflor garganta escamada (*Heliomaster squamosus*) (Temminck, 1823) en la Argentina. Nótulas Faunísticas. Segunda Serie, 40: 1-8.

CONTRERAS J, AGNOLIN F, DAVIES Y, GODOY I, GIACCHINO A & RÍOS E. (2014). Atlas ornitogeográfico de la provincia de Formosa, República Argentina.

DEL HOYO J, ELLIOTT A & SARGATAL J. (1992). Handbook of the birds of the world. Volume 1. Barcelona: Lynx edicions. Barcelona.

SPAIS R. (2020). Xeno-canto: <https://www.xeno-canto.org/561432>



Figura 1: Picaflor Garganta Escamada (*Heliomaster squamosus*) macho fotografiado el 29 de marzo de 2020 en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Fotografía: Puente G.

REFERENCIAS

AVES ARGENTINAS. (2020). eBird Checklist: <https://ebird.org/ebird/view/checklist/S66356226>. eBird: An online database of bird distribution and abundance