

## REGISTROS NOVEDOSOS

### FRUTERO CORONA AMARILLA (*Trichothraupis melanops*) EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA

#### BLACK-GOGGLED TANAGER (*Trichothraupis melanops*) IN SANTA FE PROVINCE, ARGENTINA

GERLERO G. MAURO<sup>1\*</sup>, MARCELO GROH & PABLO H. CAPOVILLA<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Grupo eBird Santa Fe, Rawson 644, (2453). Carlos Pellegrini, Santa Fe, Argentina.

\*pinogerlero@gmail.com

**RESUMEN:** En este trabajo, reportamos el primer registro de Frutero Corona Amarilla (*Trichothraupis melanops*) en la provincia de Santa Fe, y el registro más austral de la especie en Argentina.

**PALABRAS CLAVE:** Frutero Corona Amarilla, *Trichothraupis melanops*, Thraupidae, Santa Fe, Argentina.

**ABSTRACT:** We report the first observation of Black-goggled tanager (*Trichothraupis melanops*) in Santa Fe province, Argentina. Our observation is also the southernmost record of the species in Argentina.

**KEYWORDS:** Black-goggled tanager, *Trichothraupis melanops*, Thraupidae, Santa Fe, Argentina.

En Sudamérica, la distribución conocida del Frutero Corona Amarilla (*Trichothraupis melanops*) abarca el este y sur de Brasil, norte de Uruguay, este de Paraguay y Argentina (Coconier et al. 2007; Ridgely & Tudor 2009). En nuestro país, la distribución de la especie comprende Misiones, norte y este de Corrientes, este de Chaco y Formosa, noreste de Entre Ríos, norte de Salta y noreste de Jujuy (de la Peña 2019; eBird 2020). El 29 de junio de 2020, GGM registró un individuo joven de Frutero Corona Amarilla en el extremo este de la localidad de Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe, Argentina (Fig. 1; 32°03'S, 61°46'O). Dicho individuo se estaba alimentando en un pequeño bosque compuesto principalmente por Chañar (*Geoffroea decorticans*). Los siguientes tres días, GGM observó un individuo de Frutero Corona Amarilla en el mismo lugar, tratándose, probablemente, del mismo individuo. Este constituye el primer registro de la especie para la provincia de Santa Fe (Fandiño & Giraudo 2010; de la Peña 2019), y es a su vez, el registro más austral de Frutero Corona Amarilla en Argentina (de la Peña 2019).

#### REFERENCIAS

COCONIER, EG, LÓPEZ-LANIÚS B, ROESLER I, MOSCHIONE F, PEARMAN M, BLENDINGUER P, BODRATI A, MONTELEONE D, CASAÑAS H, PUGNALI G & ÁLVAREZ ME. (2007). Lista comentada de las aves Silvestres de la Unidad de Gestión Acambuco. Las aves silvestres de Acambuco, Provincia de Salta, Argentina. Relevamientos de un AICA prioritaria de la Selva Pedemontana. Temas de Naturaleza y Conservación. Monografía de Aves Argentinas, 6: 1-127.

EBIRD. (2020). eBird: An online database of bird distribution and abundance. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>.

FANDIÑO B & GIRAUDO AR. (2010). Revisión del inventario de aves de la provincia de Santa Fe, Argentina. FABICIB, 14: 116-137.

DE LA PEÑA MR. (2019). Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: Edición ampliada. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N°7, Ediciones Biológica.

RIDGELY RS & TUDOR G. (2009). The Birds of South America: The oscine passerines. Texas University Press.



**Figura 1:** Joven de Frutero Corona Amarilla (*Trichothraupis melanops*) fotografiada el 29 de junio de 2020 en el este de la localidad de Carlos Pellegrini, provincia de Santa Fe, Argentina. Fotografía: Gerlero GM.