

REGISTROS NOVEDOSOS

CO-OCURRENCIA DE DORADITO PAMPEANO (*Pseudocolopteryx flaviventris*) Y
DORADITO LIMÓN (*Pseudocolopteryx citreola*) EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, ARGENTINA

CO-OCCURRENCE OF WARBLING DORADITO (*Pseudocolopteryx flaviventris*) AND TICKING DORADITO
(*Pseudocolopteryx citreola*) IN THE SOUTH OF BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA IN CÓRDOBA,
ARGENTINA

PABLO ALEJANDRO PLA¹*

¹ Domingo Vazquez 635, Tres Arroyos (7500), Buenos Aires, Argentina.

*pabloppla@gmail.com.

RESUMEN: Durante la temporada reproductiva, observé la presencia de un Doradito Pampeano (*Pseudocolopteryx flaviventris*) y un Doradito Limón (*Pseudocolopteryx citreola*) en un mismo sitio al sur de la Provincia de Buenos Aires. Este es el primer registro documentado del solapamiento del área de distribución de ambas especies durante la temporada de cría.

PALABRAS CLAVE: Doradito (*Pseudocolopteryx* sp.), especies crípticas, distribución, temporada reproductiva.

ABSTRACT: I observed the co-occurrence of Doradito Pampeano (*Pseudocolopteryx flaviventris*) and Doradito Limón (*Pseudocolopteryx citreola*) in the south of the Province of Buenos Aires. This constitutes the first documented record of an overlap in the distribution of both species during the breeding season.

KEYWORDS: Doradito (*Pseudocolopteryx* sp.), cryptic species, distribution, breeding season.

El Doradito Pampeano (*Pseudocolopteryx flaviventris*), antes llamado Doradito Común (Gallegos et al. 2020), y el Doradito Limón (*Pseudocolopteryx citreola*) se diferencian en su distribución durante la temporada reproductiva (eBird 2020). El Doradito Pampeano se encuentra dentro de la región pampeana (este de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires y algunas zonas de Uruguay), siempre asociado a vegetación de lagunas o pastizales anegados (Cardoni et al. 2016). El Doradito Limón, en

cambio, ocupa zonas del centro de Chile y el oeste de Argentina, desde Salta hasta Chubut, extendiéndose hacia el este únicamente en la provincia de Río Negro y el extremo sur de Buenos Aires. El Doradito Limón se encuentra en ambientes costeros de lagunas o cursos de agua, con juncos y totoras, o en otros tipos de vegetación (e.g., chilcales y tamariscales), siempre con presencia de agua en las cercanías (Abalos & Areta 2009). Ambos doraditos son tiránidos pequeños, de dorso pardo, corona castaña y ventral amarillo. Son




Figura 1: (A) Doradito Limón (*Pseudocolopteryx citreola*) y (B) Doradito Pampeano (*Pseudocolopteryx flaviventris*) observados el 18 de noviembre de 2019 en Salinas Chicas, Partido de Villarino, Buenos Aires, Argentina. Debajo de cada especie presento los respectivos sonogramas de sus vocalizaciones. Fotografía: Pla PA.



Figura 2: Ambiente donde encontré un individuo de Doradito Pampeano (*Pseudocolopteryx flavigularis*) y Doradito Limón (*Pseudocolopteryx citreola*) el 18 de noviembre de 2019 en Salinas Chicas, Partido de Villarino, Buenos Aires, Argentina. Fotografía: Pla PA.

especies crípticas: indistinguibles entre sí por su anatomía externa, y sólo reconocibles por sus vocalizaciones (Fig. 1). A su vez, ambas son especies migratorias (Abalos & Areta 2009). El 18 de noviembre de 2019, a las 12:11 h, encontré un individuo de Doradito Pampeano y otro de Doradito Limón a unos 600 m de distancia uno del otro, en la costa norte de las Salinas Chicas, Partido de Villarino, Provincia de Buenos Aires, Argentina (38°44'S, 62°54'O; 42 msnm). Fotografié a ambos individuos y grabé sus vocalizaciones (Figs. 1 A y B). Los dos individuos estaban en un lugar con vegetación típica de humedales (*Phragmites australis*, *Cortaderia selloana*), con algunos tamariscos (*Tamarix* sp.) en las cercanías, parches de espinal (*Prosopis* sp., *Geoffroea decorticans*, etc) y otros sectores parcialmente inundados (Fig. 2; eBird: Pla 2020). Este es el primer registro documentado de ambas especies en un mismo lugar durante la temporada reproductiva, resultando novedoso ya que en este período del año cada especie tendría un área de distribución bien diferenciada.

REFERENCIAS

ABALOS R & ARETA J I. (2009). Historia Natural y Vocalizaciones del Doradito Limón (*Pseudocolopteryx cf. Citreola*) en Argentina. *Ornitología Neotropical*, 20: 215-230.

CARDONI A, PRETELLI M, ISACCH J, BALADRÓN A & CHIARADIA M. (2016). Biología Reproductiva y Estatus de ocurrencia del Doradito Común (*Pseudocolopteryx flavigularis*) nidificando en pastizales al sur de su distribución. *Ornitología Neotropical*, 27: 317-325.

eBIRD (2020). An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (19/11/2019).

GALLEGOS D. (2020). Nuevos nombres para algunas aves de Argentina. eBird. [URL: <https://ebird.org/argentina/news/nuevos-nombres-aves-argentina/>].

PLA P. (2019). eBird Checklist: <https://ebird.org/ebird/view/checklist/S61569585>. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (18/11/2019).