



Nuestras Aves 61: 45-49, 2016

## PLAYEROS Y GOLONDRINAS CON ESCASOS AVISTAMIENTOS EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN, ARGENTINA: RECOPIACIÓN Y NUEVAS OBSERVACIONES

**Mauro Bianchini**

Independencia 1424, ciudad de Neuquén (8300), Neuquén, Argentina. Correo electrónico mbianchini36@yahoo.com.ar

En esta nota recopilo registros publicados y no publicados (propios y de terceros) que actualizan y triplicarían la información de playeros y golondrinas con escasos registros en la provincia de Neuquén, Argentina. Presento además, fotografías de Becasa de Mar (*Limosa haemastica*), Falaropo Común (*Phalaropus tricolor*) y Golondrina Parda (*Progne tapera*) que resultarían ser las primeras evidencias para esta provincia.

### Becasa de Mar (*Limosa haemastica*)

Es un ave migratoria visitante estival neártica, gregaria, estrictamente costera, que en Argentina ha sido registrada en casi todas las provincias (con excepción de Catamarca, Formosa, La Rioja, Misiones y Salta), en las Islas Malvinas y Shetland del Sur (de la Peña 2013). En Neuquén, existen al menos cuatro registros en los últimos 20 años, entre septiembre y febrero, en cuatro sitios, entre los 342 y 2000 msnm (Fig. 1, Tabla 1). En general se observaron individuos solitarios y esto podría deberse a que estaban alejados de su ruta de migración costera-marina conven-



**Figura 1.** Becasa de Mar (*Limosa haemastica*) en el dique El Chañar, provincia de Neuquén, Argentina; 26 de octubre 2013. Fotografía: M Bianchini.

cional (Couve & Vidal 2003). Se trataría de una especie rara, errática para la provincia de Neuquén.

### Falaropo Común (*Phalaropus tricolor*)

Es un ave migratoria visitante estival neártica, gregaria, que en Argentina ha sido registrada en casi todas las provincias, con excepción de Catamarca, La Rioja, y San



**Figura 2.** Falaropo Común (*Phalaropus tricolor*) en el dique El Chañar, 13 de febrero 2010 (arriba); y en la laguna La Salada, 28 de noviembre 2010 (abajo); provincia de Neuquén, Argentina. Fotografías: M Bianchini.



Luis (de la Peña 2013). En Neuquén existen al menos 31 registros (22 presentados en esta nota) en los últimos 36 años, entre octubre y marzo, en siete sitios de seis departamentos provinciales, entre los 276 y 2150 msnm (Fig. 2, Tabla 1). Dos sitios concentraron el 65% de los registros: el Parque Nacional Laguna Blanca (10 registros desde 1979), y el Área Nacional Protegida El Tromen (10 registros desde 1996), donde es considerado visitante anual (Di Martino *in litt.* 2013, Gomez *in litt.* 2014, Freire *in litt.* 2015). El número de individuos por observación varió entre 1 y 110. Se trataría de una especie poco común y dispersa para la provincia de Neuquén, con una tendencia a frecuente y común en los dos sitios aludidos.

#### **Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulicarius*)**

Es un ave migratoria visitante estival neártico oceánico para Sudamérica, rara o muy difícil de ver en Argentina, donde ha sido registrada en las provincias del centro y sur, la Antártida e Islas Malvinas (Couve & Vidal 2003, Kovacs et al. 2005, Narosky & Yzurieta 2010, de la Peña 2013). En Neuquén existen al menos nueve registros en los últimos 44 años, entre septiembre y enero, en nueve sitios de siete departamentos provinciales, entre los 416 y 2150 msnm (Fig. 3, Tabla 1). En general se observaron individuos solitarios. Se trataría de una especie rara, errática para la provincia de Neuquén.



**Figura 3.** Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulicarius*) en el lago Mari Menuco (arriba), 29 de octubre 2006, fotografía: G Chandia; y en la laguna La Salada (abajo), 22 de noviembre 2014, fotografía: F Rosati; provincia de Neuquén, Argentina

#### **Golondrina Parda (*Progne tapera*)**

En Argentina ha sido registrada en casi todas las provincias, con excepción de Mendoza, San Luis y Tierra del Fuego (de la Peña 2013). En Neuquén existen al menos 18 registros (15 presentados en esta nota) en los últimos 22 años, entre octubre y abril, en cinco departamentos provinciales, entre los 260 y 1283 msnm (Fig. 4, Tabla 1). Se trataría de una especie escasa a nivel provincial, aunque común en el tramo medio e inferior del río Limay, y en el inferior del río Neuquén. La observación en mayo de 2015 correspondería a un caso singular fuera del período estival, dejando la incertidumbre si se trata de individuos relegados en su migración estacional, o si resultan residentes para estas latitudes. En Neuquén es común encontrarla junto a individuos de Golondrina Patagónica (*Tachycineta leucopyga*), Golondrina Barranquera (*Pygochelidon cyano-leuca*) y Golondrina Negra (*Progne elegans*) (obs. pers.). En esta zona, pero en la vecina provincia de Río Negro, la he fotografiado el 11 de noviembre de 2007, en el sector oeste del Lago Pellegrini (38°41'41"S, 68°03'46"O, 274 msnm), departamento Gral. Roca. En Neuquén, observé Golondrinas Pardas en nidos de Hornero (*Furnarius rufus*) en febrero y marzo de 2015, lo que me permite indicar que la especie nidificaría en esta provincia.



**Figura 4.** Golondrina Parda (*Progne tapera*) sobre calle Independencia, Neuquén capital, provincia de Neuquén, Argentina; 9 de diciembre 2015. Fotografía: M Bianchini.

#### **Golondrina Zapadora (*Riparia riparia*)**

En Argentina ha sido registrada en casi todas las provincias, con excepción de Catamarca, Chaco, La Rioja, Misiones, San Luis y Tierra del Fuego (de la Peña 2013, Lucero & Schmidt 2014). En Neuquén, existen al menos 10 registros, sin evidencias, en los últimos 12 años, entre octubre y marzo, en tres sitios de tres departamentos provinciales, entre los 342 y 2150 msnm (Tabla 1). En la provincia de Río Negro, el 11 de noviembre de 2007 observé cinco individuos en el acceso de la península Ruca-Co del Lago Pellegrini (38°43'18"S, 68°02'28"O, 282 msnm). Se trataría de una especie rara, errática para la provincia de Neuquén.





### Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*)

En Argentina ha sido registrada en todas las provincias y en las Islas Malvinas (de la Peña 2013). En Neuquén, existen al menos cuatro registros sin evidencias, en los últimos 20 años, entre noviembre y enero, en tres sitios de tres departamentos del sureste de la provincia, entre los 342 y 700 msnm (Tabla 1). Se trataría de una especie rara o poco común para la provincia de Neuquén.

En la provincia de Río Negro, el 14 de noviembre de 2015 junto a Cynthia Arenas observamos seis individuos (adultos y juveniles) entremezclados con una veintena de Golondrinas Negras (*Progne elegans*), y escasas Golondrinas Patagónicas (*Tachycineta leucopyga*) y Golondrinas Barranqueras (*Pygochelidon cyanoleuca*), en el sector oeste del Lago Pellegrini, en la península Ruca-Co (38°42' 28"S, 68°01' 50"O, 273 msnm). Dado

que existen registros de nidificación a solo 140 km del sitio de estas observaciones, en la provincia de La Pampa (Bianchini, 2016), es posible que la Golondrina Tijerita esté nidificando en Neuquén.

Agradezco a Miguel Moreno, por conceder los permisos para realizar los relevamientos en el dique El Chañar, como así a los agentes de Gendarmería Nacional de turno; a Eduardo Ramilo, Sebastián Di Martino, Rodolfo Freire, Jorge Gómez, Guillermo Chandia, Facundo Rosati, Pablo Acerbo, Geraldine Van Kooten, Luis Scarrone y Fernando Segura, por compartir sus registros no publicados; a Eduardo Ramilo, Jorge Veiga y Alejandro del Valle, por la información adicional brindada; a Cynthia Arenas, por las salidas compartidas en terreno y por la revisión inicial del manuscrito; y a los editores y revisores, Igor Berkunsky, Gabriel Maugeri y Román Ruggera, por su labor.

**Tabla 1.** Recopilación de registros publicados y no publicados (propios y de terceros) de Becasa de Mar (*Limosa haemastica*), Falaropo Común (*Phalaropus tricolor*), Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulicarius*), Golondrina Parda (*Progne tapera*), Golondrina Zapadora (*Riparia riparia*) y Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*) para la provincia de Neuquén, Argentina; s/d = número de individuos sin determinar; \* = con evidencia (fotográfica/piel).

DEPARTAMENTO	LUGAR	FECHA (NÚM. DE INDIV.)	REFERENCIAS
<b>Becasa de Mar (<i>Limosa haemastica</i>)†</b>			
Chos Malal	ANP El Tromen; 37°06'S, 70°08'O, 2000 msnm	26 Feb 96 (1)	Veiga et al. (2005)
Collon Curá	Laguna Carilafquen Grande; 40°14'S, 70°21'O, 893 msnm	12 Ene 00 (2)	Veiga et al. (2005)
Confluencia	Dique El Chañar; 38°36'S, 68°23'O, 342 msnm	26 Oct 13 (1) (Fig. 1)	Esta nota
Lácar	Laguna próxima a RN 234; 40°08'S, 71°17'O, 730 msnm	17 Sep 06 (1)	Di Martino <i>in litt.</i> (2014)
<b>Falaropo Común (<i>Phalaropus tricolor</i>)</b>			
Chos Malal	ANP El Tromen, laguna homónima; 37°05'S, 70°06'O, 2150 msnm	17 Ene 96 (2) Dic 05 (11), Ene/Feb 06 (7), Ene/ Feb 07 (9), Ene/Feb 08 (s/d), Ene/ Feb 09 (s/d), 26 Ene 10 (40), 12 Feb 10 (50), Feb 11 (3), Ene/Mar 13 (12-15), Feb 14 (7)	Veiga et al. (2005) Gómez <i>in litt.</i> (2014) y Freire <i>in litt.</i> (2015)
Collon Curá	Laguna Carilafquen Grande; 40°14'S, 70°21'O, 893 msnm	5 Mar 95 (1)	Veiga et al. (2005)
Confluencia	Laguna Capex; 38°56'S, 68°11'O, 276 msnm	15 Nov 09 (1)	Acerbo & Van Kooten <i>in litt.</i> (2013)
	Dique El Chañar; 38°36'S, 68°23'O, 342 msnm	13 Feb 10 (9) (Fig. 2a)	Esta nota
Los Lagos	Ea. Rincón Grande; 40°58'S, 71°04'O, 759 msnm	1 Dic 07 (2)	J Wiczorek, checklist S4640419 (eBird 2016)
	Laguna Verde; 40°37'S, 71°19'O, 1060 msnm	17 Feb 10 (10)	Wetlands International, checklist S28810802 (eBird 2016)
Pehuenches	Laguna Auquinco; 37°21'S, 69°59'O, 1415 msnm	19 Ene 96 (5)	Veiga et al. (2005)
	Yacimiento El Trapial; 37°29'S, 69°50'O, 1195 msnm	Feb 96 (s/d)	Veiga et al. (2005)
Zapala	PN Laguna Blanca, laguna Blanca; 39°02'S, 70°23'O, 1283 msnm	20 Oct 79 (s/d) 1982 (s/d) 5 Nov 94 (1) Feb 96 (110) 26 Ene 14 (1)	Canevari (1979) Yzurieta (1982) Veiga et al. (2005) Romiti & Martínez (1999) Segura <i>in litt.</i> (2014)
	Laguna Verde; 39°00'S, 70°23'O, 1281 msnm	18 Feb 91 (40) 16 Feb 96 (15) 17 Feb 10 (10)	APN (1993) Ramilo & Rabagliatti <i>in litt.</i> (2015) Ramilo et al. <i>in litt.</i> (2015)
	Laguna Jabón; 38°58'S, 70°22'O, 1324 msnm	16 Feb 10 (2)	Ramilo et al. <i>in litt.</i> (2015)
	Laguna El Hoyo; 39°00'S, 70°25'O, 1296 msnm	8 Feb 13 (18)	González. Ramilo <i>in litt.</i> (2015)
	Laguna La Salada; 38°46'S, 70°01'O, 788 msnm	14 Feb 10 (1) 21 Feb 10 (64) 28 Nov 10 (5) (Fig. 2b)	Van Kooten & Rueda <i>in litt.</i> (2013) Wetlands International, checklist S27940381 (eBird 2016) Esta nota
	Laguna próxima a Zapala; 38°51'S, 69°58'O, 977 msnm	22 Nov 14 (1)	Rosati <i>in litt.</i> (2016)



DEPARTAMENTO	LUGAR	FECHA (NÚM. DE INDIV.)	REFERENCIAS
<b>Falaropo Pico Grueso</b> ( <i>Phalaropus fulicarius</i> )			
Chos Malal	ANP El Tromen; 37°06'S, 70°06'O, 2150 msnm	16-18 Ene 00 (1)*	Pérez et al. (2006)
	Confluencia ríos Neuquén y Curi Leuvú; 37°22'S, 70°17'O, 837 msnm	13 Oct 14 (1)*	López & López (2014)
Collón Cura	Valle del río Collón Curá	21 Oct 71 (1)*	Olrog (1974)
Confluencia	Lago Mari Menuco; 38°37'S, 68°27'O, 416 msnm	29 Oct 06 (4) (Fig. 3a)	Chandia <i>in litt.</i> (2014)
Lácar	PN Lanín, lago Nonthue; 40°09'S, 71°37'O, 640 msnm	22-25 Nov 11 (1)	Argerich (2012)
Los Lagos	Lago Trafal; 40°38'S, 71°25'O, 820 msnm	8 Sep 03 (1)*	Kovacs et al. (2005)
Picunches	Ea. La Portaña, Las Lajas; 38°34'S, 70°19'O, 740 msnm	14 Sep 14 (2)	C de Larminat, checklist S20657992 (eBird 2016)
Zapala	PN Laguna Blanca; 39°02'S, 70°19'O, 1283 msnm	19 Sep 91 (1)	Chehebar et al. (1992)
	Laguna La Salada; 38°46'S, 70°01'O, 788 msnm	22 Nov 14 (1) (Fig. 3b)	Rosati et al. <i>in litt.</i> (2015)
<b>Golondrina Parda</b> ( <i>Progne tapera</i> ) ††			
Confluencia	Plaza Huincul; 38°57'S, 69°09'O, 562 msnm	Feb 94 (1)	Veiga et al. (2005)
	Dique Portezuelo Grande; 38°26'S, 68°56'O, 428 msnm	15 Nov 96 (2)	Veiga et al. (2005)
	Isla 132, Neuquén capital; 38°58'S, 68°03'O, 260 msnm	28 Dic 08 (s/d)	G van Kooten, checklist S20168849 (eBird 2016)
		8 Nov 15 (1)	C Sarco, checklist S25750096 (eBird 2016)
	Neuquén capital; 38°57'S, 68°02'O, 264 msnm	Nov 14 a Abr 16 (estival) (6) (Fig. 4), 30 May 15 (1)	Esta nota
	Dique El Chañar; 38°34'S, 68°24'O, 342 msnm	14 Mar 15 (1)	Esta nota
	Lago Mari Menuco; 38°32'S, 68°33'O, 425 msnm	14 Feb 16 (4)*	J Tocce, checklist S27546135 (eBird 2016)
	Dique El Chocón; 39°15'S, 68°45'O, 332 msnm	12 Feb 16 (4)*	Esta nota
	Dique Arroyito; 39°06'S, 68°35'O, 312 msnm	12 Feb 16 (2)*	Esta nota
	Laguna Capex; 38°57'S, 68°19'O, 283 msnm	18-20 Feb 16 (15), 4 Mar 16 (2)*	Esta nota
	Centenario; 38°50'S, 68°07'O, 296 msnm	5 Mar 16 (1)	Esta nota
Collón Curá	Valle del río Collón Curá; 40°23'S, 70°37'O, 700 msnm	25 Nov 12 (1)	H Matarasso, Checklist S21055577 (eBird 2016)
Pehuenches	Próximo a Buta Ranquil; 37°06'S, 69°42'O, 841 msnm	16 Nov 10 (1)	Di Martino <i>in litt.</i> (2014)
Picún Leufú	Picún Leufú; 39°31'S, 69°17'O, 386 msnm	21 Nov 15 (3)	MJ Huc, checklist S25956126 (eBird 2016)
	Laguna s/n; 39°30'S, 68°17'O, 386 msnm	17 Ene 16 (4)*	Esta nota
Zapala	Paso de los Indios; 38°32'S, 69°24'O, 597 msnm	29 Ene 94 (2)	Veiga et al. (2005)
	PN Laguna Blanca; 39°03'S, 70°20'O, 1283 msnm	15 Dic 15 (s/d)	JQ Vidoz, checklist S15299265 (eBird 2016)
<b>Golondrina Zapadora</b> ( <i>Riparia riparia</i> )			
Confluencia	Dique El Chañar; 38°36'S, 68°24'O, 342 msnm	26 Dic 10 (3), 19 Feb 11 (2), 22 Oct 11 (3) y 17 Dic 11 (3)	Esta nota
		14 Feb 16 (4)	J Tocce, checklist S27554328 (eBird 2016)
Chos Malal	PP Tromen; 37°06'S, 70°05'O, 2150 msnm	14 Feb 14 (s/d)	J Watson, checklist S17120077 (eBird 2016)
Lácar	Vega Maipú; 40°07'S, 71°16'O, 735 msnm	20 Mar 04 (s/d), 29 Oct 04 (2), 2005 (s/d), 6 Mar 06 (s/d)	Veiga & Dupuy (2009)
<b>Golondrina Tijerita</b> ( <i>Hirundo rustica</i> )			
Collón Curá	Valle del río Collón Curá; 40°23'S, 70°37'O, 700 msnm	25 Nov 12 (2)	H Matarasso, Checklist S21055577 (eBird 2016)
Confluencia	Dique El Chañar; 38°34'S, 68°23'O, 342 msnm	24 Ene 14 (2)	Esta nota
Picún Leufú	Laguna s/n; 39°29'S, 69°17'O, 386 msnm	5 Ene 96 (2)	Veiga et al. (2005)
	Laguna temporaria s/n; 39°30'S, 69°18'O, 393 msnm	5 Ene 96 (s/d)	Scarrone <i>in litt.</i> (2014)

† No se incluye el registro de Del Valle et al. (1989), Del Valle & Funes (1994), dado que ante la consulta a Del Valle (*in litt.* 2013) expresó que la Beca de Mar fue citada por ellos como "probable" en los embalses del este neuquino.

†† No se incluye el registro de P. Acerbo en Tratayén (en Veiga et al. 2005), dado que ante la consulta a Acerbo (*in litt.* 2015) expresó que sólo tiene un registro de la Golondrina Parda para la provincia de Neuquén, en Portezuelo Grande.

## BIBLIOGRAFÍA CITADA

APN (1993) *Plan General de Manejo. Parque Nacional Laguna Blanca Argentina. Informe no publicado.* Administración de Parques Nacionales

ARGERICH E (2012) Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulica-*

*rius*) en Lago Nonthue, Neuquén, Argentina. *EcoRegistros Revista* 2:17

BIANCHINI M (2016) Expansión del área geográfica reproductiva de la Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica erythrogaster*) en las provincias de La Pampa y Río Negro, Argentina. *Historia*



- Natural (tercera serie)* 6(2):119-134-29
- CANEVARI P (1979) *Listado de aves observadas. Archivo Delegación Regional Patagonia*. Administración de Parques Nacionales, San Carlos de Bariloche
- CHEHEBAR C, RAMILO EJ & MAZZUCHELLI SA (1992) *Parque Nacional Laguna Blanca. Plan General de Manejo. Documento Preliminar para discusión. Delegación Técnica Regional. Informe no publicado*. Administración Parques Nacionales
- COUVE E & VIDAL C (2003) *Aves de Patagonia, Tierra del Fuego y Península Antártica*. Fantástico Sur Editorial, Punta Arenas
- DE LA PEÑA MR (2013) *Citas, observaciones y distribución de las aves argentinas: edición ampliada*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N°7. Ediciones Biológica, Santa Fe
- DEL VALLE AE & FUNES MC (1994) *Vertebrados de la provincia del Neuquén*. Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, Junín de los Andes
- DEL VALLE AE, GADER R & FUNES MC (1989) *Aves y mamíferos de la provincia del Neuquén. Informe no publicado*. Dirección General de Bosques y Parques Provinciales, Neuquén
- EBIRD (2016) eBird: an online database of bird distribution and abundance. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca [URL: <http://www.ebird.org>] (Accessed: mayo de 2016)
- KOVACS C, KOVACS O, KOVACS Z & KOVACS CM (2005). *Manual ilustrado de las aves de la Patagonia, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur*. Artes Gráficas Ronor SA, Buenos Aires
- LÓPEZ J & LÓPEZ L (2014) Aves de la tundra ártica en Chos Malal. Diario Río Negro, edición 26 de octubre de 2014, Chos Malal
- LUCERO F & SCHMIDT C (2014) Observaciones de Macá Plateado (*Podiceps occipitalis occipitalis*) y Golondrina Zapadora (*Riparia riparia*) en la Laguna Seca, Guayata (*Chloephaga melanoptera*) y Cauquén Común (*Chloephaga picta*) en la Laguna Larga, provincias de San Juan y Mendoza, Argentina. *EcoRegistros Revista* 4:21-28
- NAROSKY T & YZURIETA D (2010) *Aves de Argentina y Uruguay: guía de identificación*. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires
- OLROG CC (1974) Notas ornitológicas X. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo, Tucumán. *Acta Zoológica Lilloana* 31:69-76
- PÉREZ CHF, DEHELY K & PETRACCI PF (2006) Aves nuevas o pocos frecuentes del norte de la Patagonia Argentina. *Nuestras Aves* 52:25-29
- ROMITI DG & MARTÍNEZ MG (1999) *Aves del Parque Nacional Laguna Blanca. Información actualizada 1993-98*. Boletín Técnico editado por el Parque Nacional Laguna Blanca, Zapala
- VEIGA JO & DUPUY G (2009) Nuevas especies y registros de aves para la provincia de Neuquén, Argentina. *Nuestras Aves* 54:79-81
- VEIGA JO, FILIBERTO F, BABARSKAS M & SAVIGNY C (2005) *Aves de la provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución*. R y C Editora, Buenos Aires
- YZURIETA D (1982) *Aves del Parque Nacional Laguna Blanca, Provincia del Neuquén, República Argentina. Informe no publicado*. Administración Parques Nacionales

Recibido: septiembre 2015 / Aceptado: septiembre 2016 / Publicado: diciembre 2016

Nuestras Aves 61: 49-53, 2016

## PRIMEROS REGISTROS Y APORTES A LA DISTRIBUCIÓN DE LA AVIFAUNA DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA

**Oscar Bernardo Quiroga<sup>1</sup>, Patricia Capllonch<sup>1,2</sup>, Walter Emanuel Pérez Bogado<sup>1,3</sup> y Karina Soria<sup>1,2</sup>**

<sup>1</sup>Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán (4000), Tucumán, Argentina. Correo electrónico: oscarqui595@hotmail.com

<sup>2</sup>Cátedra de Biornitología Argentina, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán (4000), Tucumán, Argentina

<sup>3</sup>Museo de Ciencias Naturales Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 241, San Miguel de Tucumán (4000), Tucumán, Argentina

Uno de los primeros trabajos que compiló la avifauna de la provincia de Santiago del Estero apareció publicado como una lista sistemática donde se dio a conocer la distribución y estatus de residencia o migración de 330 especies (Nores et al. 1991). Trabajos posteriores incorporaron detalles y especies a la lista original. En este artículo presentamos observaciones propias y de terceros, incorporando cuatro nuevas especies de aves para la provincia: Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*), Picaflor de Cola Castaña (*Hylocharis sapphirina*), Loro Maitaca (*Pionus maximiliani*) y Capuchino Canela (*Sporophila hypoxantha*);

y ampliando el área de distribución conocida para otras 14 especies (Tabla 1). Todas las observaciones corresponden al distrito Chaqueño Occidental de la provincia fitogeográfica Chaqueña (Cabrera 1971), comprendiendo zonas chaqueñas semiáridas, chaqueñas serranas, campos agrícolas, ganaderos y zonas urbanas.

### **Picaflor de Cola Castaña (*Hylocharis sapphirina*)**

El 11 de enero de 2014 en Los Gallegos (28°11'S, 64°03'O) observamos un individuo con barba canela, vientre blanquecino, pecho verde con escasas y pequeñas