



- Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
- JARAMILLO AP (2000) Punta Rasa: South American's first vagrant tramp? *Cotinga* 14:33–38
- LÓPEZ-LANÚS B, GRILLI P, COCONIER E, DI GIACOMO A & BANCHS R (2010) *Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación*. Informe de Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata & Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires
- LUNA H & MANASSERO M (2010) Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte V. *Nuestras Aves* 55:30–33
- NARDI RA (2012) Registros documentados de aves amenazadas y raras de Santa Fe, Argentina. *Biológica* 15:101–106
- NAVAS JR (1995) Ciconiiformes: Threskiornithidae y Phoenicopteridae. Pp. 30–50 en: DE CASTELLANOS ZA (Dir) *Fauna de agua dulce de la república Argentina. Volumen 43 Aves*. Profadu (CONICET), Buenos Aires
- ROMANO M, PAGANO F & LUPPI M (2002) Registros de Parina Grande (*Phoenicoparrus andinus*) en la Laguna Melincué, Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves* 43:15–16
- ZOTTA AR (1944) *Lista sistemática de las aves argentinas*. Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires

Recibido: enero 2014 / Aceptado: febrero 2015

Nuestras Aves 60: 47–48, 2015

NUEVO REGISTRO DOCUMENTADO DE ÁGUILA CORONADA (*Buteogallus coronatus*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Fabrizio Piantanida

Reserva Natural Provincial Laguna Chasicó, Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Casilla de Correos 67 (B8160), Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: fabriziopiantanida@hotmail.com

El Águila Coronada (*Buteogallus coronatus*) es una de las aves rapaces de mayor tamaño que habitan en Argentina. Recientemente ha sido categorizada a nivel internacional como En Peligro, con una población estimada inferior a 1500 individuos y con tendencias poblacionales negativas (BirdLife International 2012). A pesar de su amplia distribución en el sur de América del Sur, aún se desconocen muchos aspectos de su biología y ecología (Maceda 2007). El sur de la provincia de Buenos Aires constituye el extremo sudeste de la distribución global de esta especie, siendo los registros muy escasos para esta provincia (Collar et al. 1992, Narosky & Di Giacomo 1993, Delhey & Carrete 1999, De Lucca & Morici 2012).

Desde el registro histórico de Hudson (1872) para el partido de Patagones, citado en Narosky & Di Giacomo (1993), pasó más de un siglo hasta que Delhey & Carrete (1999) reportaran la observación de un juvenil o subadulto en cercanías al sitio descrito en el presente trabajo. Posteriormente De Lucca & Morici (2012) registraron tres avistamientos para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

El 1 de noviembre de 2014 a las 11:35 h observé volar dos adultos de Águila Coronada sobre un grupo de árboles exóticos de gran altura, en la Reserva Natural Provincial Laguna Chasicó. Esta zona, ubicada entre los partidos de Puán y Villarino, pertenece al AICA-BA 18 (Di Giacomo 2007). Las águilas estaban dentro del predio perteneciente al ex vivero Alejandro Von Humboldt y en cercanías a la ribera del arroyo Chasicó. Al acercarme a ellas para foto-

grafiarlas, ambas presentaron un comportamiento arisco y desconfiado, coincidente con el descrito por Delhey & Carrete (1999), y ascendieron en vuelo espiral emitiendo un largo y agudo silbido, alejándose hasta que fueron casi imperceptibles. A las 13:00 h las vi regresar y posar en el ápice de los árboles donde las observara más temprano el mismo día, logrando entonces fotografiarlas (Fig. 1).

Regresé al mismo lugar el 22 de noviembre, a las 10:15 h, y constaté la presencia de un solo adulto, que se mostró inquieto, posado sobre un pino y vocalizando con insistencia fuertes y repetidos silbidos coincidentes a los registrados por F Tizianel (<http://www.xeno-canto.org/15734>). Después de 30 min el águila se desplazó y se posó brevemente sobre un nido de palos con forma de plato, ubicado en el ápice de un ciprés. Luego el águila se alejó del lugar. No pude confirmar que fuera un nido activo. En otros sitios se ha observado el uso de un mismo nido en años alternos para nidificar, además que a menudo también son utilizados como comederos o posaderos (Maceda 2007, Berkunsky et al. 2012). Revisité el mismo sector los días 25 de noviembre y el 2 de diciembre del mismo año, pero no detecté la presencia de Águilas Coronadas.

Es probable que el nido haya estado activo, ya que la fecha de observación coincide con la época reproductiva (Maceda 2007), se observó a los dos individuos de la pareja juntos, y el área estaba rodeada por una importante superficie de bosque de caldén (*Prosopis caldenia*) (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 2007), ambiente en que las Águilas Coronadas



Figura 1. Águilas Coronadas (*Buteogallus coronatus*) adultas (A y B) observadas el 1 de noviembre de 2014 en el ex vivero Alejandro Von Humboldt, Reserva Natural Laguna Chasicó, partido de Villarino, provincia de Buenos Aires, Argentina. Fotos: F Piantanida.

establecen comúnmente sus territorios reproductivos en el sur de su distribución geográfica (Maceda 2007, Sarasola et al. 2010).

Agradezco a los revisores anónimos y editores de Nuestras Aves por sus correcciones y sugerencias que hicieron posible esta publicación.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BERKUNSKY I, DANIELE G, KACOLIRIS FP, FAEGRE SI K & GANDOFY FA, GONZÁLEZ L & DÍAZ LUQUE JA (2012) Records of the Crowned Eagle (*Urubutinga coronata*) in Moxos plains of Bolivia and observations about breeding behavior. *Revista Brasileira de Ornitología* 4:447–450
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2012) Species factsheet: *Buteogallus coronatus*. BirdLife International, Cambridge [URL: <http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3496>]
- COLLAR NJ, GONZAGA LP, KRABBE N, MADROÑO A, NARAUJO LG, PARKER TA & WEGE DC (1992) *Threatened birds of the Americas. The ICBP/UICN red data book*, Smithsonian Institution Press, Washington DC
- DE LUCCA ER & MORICI A (2012) Nuevos registros del Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nótulas Faunísticas, Segunda Serie* 93:15
- DELHEY JKV & CARRETE M (1999) Aves nuevas o poco conocidas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 40:11–12
- DI GIACOMO AG (2007) Caldenal del Sudoeste de Buenos Aires. Pp 58–59 en: DI GIACOMO AG, DE FRANCESCO MV & COCONIER EG (eds). *Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad*. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
- MACEDA JJ (2007) Biología y conservación del Águila Coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) en Argentina. *Hornero* 22:159–171
- NAROSKY T & YZURIETA D (2010) *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez-Mazzini Editores y LOLA, Buenos Aires
- SARASOLA JH, SANTILLÁN MA & GALMES MA (2010) Crowned eagles rarely prey on livestock in central Argentina: persecution is not justified. *Endangered Species Research* 11:207–213
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2007) *Primer inventario nacional de bosques nativos, segunda etapa, inventario de campo de la región del espinal, Distritos Caldén y Ñandubay*. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Buenos Aires

Recibido: diciembre 2014 / Aceptado: abril 2015