



## NOVOS REGISTROS DE *Buteogallus coronatus* E *Spizaetus ornatus* PARA O ESTADO DE SANTA CATARINA, BRASIL

Jonas Claudiomar Kilpp

Rua Machado de Assis 251, Não-Me-Toque (99470-000), RS, Brasil. Correio eletrônico: jonekilpp@hotmail.com

*Buteogallus coronatus* é uma ave de rapina de grande porte, característica de áreas campestres da Bolívia à Argentina, sendo que no Brasil é mais frequente na região central (Rosário 1996, Sick 1997), sendo encontrada também em áreas florestais de regiões montanhosas (Collar et al. 1992). Mundialmente é considerada ameaçada de extinção na categoria “em perigo” (BirdLife International 2015), sendo considerada “vulnerável” no Brasil (MMA 2003), “criticamente em perigo” em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul (Bencke et al. 2003, FATMA 2011) e “vulnerável” no Paraná (Straube et al. 2004). Além dos registros históricos para os municípios de Lontra, Videira e Água Doce (Collar et al. 1992, Rosário 1996), recentemente foi encontrada nos municípios catarinenses de Lages (Collar et al. 1992), Urubici, Campo Belo do Sul e Anita Garibaldi (Albuquerque et al. 2006) e Anitápolis (Ghizoni-Jr & Azevedo 2010).

*Spizaetus ornatus* é um grande rapinante florestal, ocorrendo do México a Argentina e todo o Brasil

(Thiollay 1994, Rosário 1996, Sick 1997). É considerado “criticamente ameaçado” para Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Bencke et al. 2003, FATMA 2011) e “em perigo” no Paraná (Straube et al. 2004). Em Santa Catarina, além dos registros históricos de Rosário (1996), foi registrado em Abelardo Luz (Kajiwara 2000), Capão Alto (Mendonça-Lima et al. 2006), Campo Belo do Sul (Mendonça-Lima et al. 2006, Ghizoni-Jr & Azevedo 2010) e São Domingos (Ghizoni-Jr & Azevedo 2010).

Comunico neste trabalho três novos registros de *Buteogallus coronatus* e um registro de *Spizaetus ornatus* para o estado de Santa Catarina, com relatos de indivíduos jovens para a primeira espécie.

Observei um indivíduo adulto de *Buteogallus coronatus* pousado no alto de um paredão rochoso, no acesso a Base de Pesquisas Avançadas (BAP) do IBAMA (27°52'S, 50°11'O), no município de Paineal, no dia 17 de junho de 2013 às 10:00 h (Fig. 1A). Após 20 min ele partiu voando em círculos e não foi mais visto. Outro avistamento foi



**Figura 1.** A. Adulto de *Buteogallus coronatus*, Paineal, Santa Catarina, Brasil, 17 de junho de 2013. B. Adulto de *Spizaetus ornatus*, Abdon Batista, Santa Catarina, Brasil, 19 de novembro de 2013. Fotos: JC Kilpp.



realizado em 9 de março de 2014 às 13:25 h no mesmo local, provavelmente se tratando do mesmo espécime. Estava voando e vocalizando em círculos ascendentes, acompanhado de cinco indivíduos de *Coragyps atratus*. Nesta área já foi observado um indivíduo adulto voando acompanhado de um filhote, o que sugere que a espécie reproduz-se na região (Wilian Veronezi, com. pess.). Em 12 de agosto de 2013 às 08:30 h registrei um juvenil planando no município de Anita Garibaldi (27°41'S, 51°05'O). Este indivíduo foi acompanhado por poucos minutos até sumir do meu campo de visão. No mesmo município, a espécie já havia sido registrada por Albuquerque et al. (2006).

Registrei um indivíduo adulto de *Spizaetus ornatus* na localidade de Belópolis (27°32'S, 51°04'O), município de Abdon Batista, no dia 19 de novembro de 2013 às 09:02 h. Ele estava pousado no alto de uma árvore morta de aproximadamente 25 m de altura, onde permaneceu por aproximadamente 3 min (Fig. 1B). Posteriormente, voou não sendo mais localizado.

Os registros de *Buteogallus coronatus* demonstram duas áreas de grande importância para a espécie em Santa Catarina, pois em ambas foram verificados indivíduos jovens, o que sugere que estas áreas estejam sendo utilizadas para reprodução. O município de Pádua encontra-se inserido em uma região que ainda apresenta bons remanescentes de campos e florestas nativas, mas a pressão da substituição da cobertura vegetal original por florestamentos de *Pinus* sp. tem colocado toda a biodiversidade local sob ameaça. Os municípios de Anita Garibaldi e Abdon Batista (onde registrei *Spizaetus ornatus*), além das pressões dos florestamentos de *Pinus* sp., encontram-se na área de influência de grandes usinas hidrelétricas, que tem reduzido consideravelmente a cobertura original nas margens dos rios Pelotas e Canoas.

#### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ALBUQUERQUE JLB, GHIZONI-JR IR, SILVA ES, TRANNINI G, FRANZ I, BARCELLOS A, HASSDENTEUFEL CB, AREND FL & MARTINS-FERREIRA C (2006) Águia-cinzenta (*Harpyhaliaetus coronatus*) e o Gavião-real-falso (*Morphnus guianensis*) em Santa Catarina e Rio Grande do Sul: prioridades e desafios para sua conservação. *Revista Brasileira de Ornitologia* 14:411–415
- BENCKE GA, FONTANA CS, DIAS RA, MAURÍCIO GN & MÄHLER-JR JFK (2003) Aves. Pp. 189–479 en: FONTANA CS, BENCKE GA & REIS RE (eds) *Livro vermelho da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul*. EDIPUCRS, Porto Alegre
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2015) Species factsheet: *Buteogallus coronatus*. BirdLife International, Cambridge [URL: <http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3496>]
- COLLAR NJ, GONZAGA LP, KRABBE N, NIETO AM, NARANJO LG, PARKER TA & WEDGE DC (1992) *Threatened birds of the Americas. The ICBP/IUCN Red data book*. ICBP, Cambridge
- FATMA (2011) Lista das espécies da fauna ameaçada de extinção em Santa Catarina. Governo do Estado de Santa Catarina, Florianópolis [URL: [http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com\\_content&task=view&id=115&Itemid=291](http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=291)]
- GHIZONI-JR IR & AZEVEDO MAG (2010) Registros de algumas aves raras ou com distribuição pouco conhecida em Santa Catarina, sul do Brasil, e relatos de três novas espécies para o Estado. *Atualidades Ornitológicas* 154:33–46
- KAJIWARA D (2000) Relato sobre o encontro com o gavião-de-penacho *Spizaetus ornatus*. *Revista Paranaense de Ornitologia* 1 [URL: <http://www.ao.com.br/rop2.html>]
- MENDONÇA-LIMA A, ZILIO F, JOENCK CM & BARCELLOS A (2006) Novos registros de *Spizaetus ornatus* (Accipitridae) no sul do Brasil. *Revista Brasileira de Ornitologia* 14:279–280
- MMA (2003) Lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Ministério do Meio Ambiente do Brasil, Brasília [URL: <http://www.mma.gov.br/biodiversidade/especies-ameaçadas-de-extincao/fauna-ameaçada/>]
- ROSÁRIO LA (1996) *As aves em Santa Catarina: distribuição geográfica e meio ambiente*. FATMA, Florianópolis
- SICK H (1997) *Ornitologia brasileira*. Nova Fronteira, Rio de Janeiro
- STRAUBE FC, URBEN-FILHO A & KAJIWARA D (2004) Aves. Pp. 145–496 en: MIKICH SB & BERNILS RS (eds) *Livro Vermelho da Fauna ameaçada no Estado do Paraná*. Instituto Ambiental do Paraná, Curitiba
- THIOLLAY JM (1994) Family Accipitridae (Hawks and Eagles). Pp. 52–215 en: DEL HOYO J, ELLIOT A & SARGATAL J (eds) *Handbook of the birds of the world. Volume 2. New World Vultures to Guineafowl*. Lynx Edicions, Barcelona

Recibido: marzo 2014 / Aceptado: enero 2015